

Feuille d'exercices n°77

Exercice 1 (**)

On pose $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \quad f(x) = \sum_{i=1}^n x_i$ et $g(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$

Étudier les extremums de f sous la contrainte $g(x) \leq 1$.

Exercice 2 (***)

On pose $\forall (x, y) \in]0; +\infty[^2 \quad f(x, y) = \frac{1}{xy} + x^2 + y^2$

Étudier les extremums de f sur $]0; +\infty[^2$.

Exercice 3 (***)

On pose $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x, y) = x^2 - xy + y^2$

et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$

1. Justifier que f est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^2 puis étudier les extremums de f sur \mathbb{R}^2 .
2. Représenter le domaine D et préciser sa nature topologique.
3. Étudier les extremums de f sur D .

Exercice 4 (****)

On pose $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$

Étudier les extremums de f sur \mathbb{R}^2 .

Exercice 5 (***)

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. On dit que f est homogène de degré p entier si

$$\forall (t, x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^2 \quad f(tx, ty) = t^p f(x, y)$$

Montrer que f est homogène de degré p si et seulement si

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = pf$$

Exercice 6 (****)

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ dont la matrice jacobienne est, en tout point, orthogonale. On note

$$\forall (i, j, k) \in \llbracket 1; n \rrbracket^3 \quad \alpha_{i,j,k} = \sum_{p=1}^n \frac{\partial f_p}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial^2 f_p}{\partial x_j \partial x_k}$$

1. Montrer $\forall (i, j, k) \in \llbracket 1; n \rrbracket^3 \quad \alpha_{i,j,k} = \alpha_{i,k,j} = -\alpha_{k,j,i}$

2. En déduire qu'il existe $b \in \mathbb{R}^n$ et $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad f(x) = Ax + b$$

Exercice 7 (****)

Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne canonique, U ouvert borné non vide de E , $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$ et f continue sur \bar{U} . On définit le *laplacien* de f sur U noté Δf par

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in U \quad \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \quad \text{ou} \quad \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \partial_i^2 f(x)$$

1. Justifier que f admet un maximum en un point $x_0 \in \bar{U}$.

2. On suppose $\Delta f(x) > 0$ pour tout $x \in U$. Montrer

$$x_0 \in \partial U \quad \text{et} \quad \forall x \in U \quad f(x) < \sup_{y \in \partial U} f(y)$$

On pourra supposer par l'absurde que $x_0 \in U$, justifier l'existence d'un $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x_0) > 0$ et considérer $\varphi : t \mapsto f(x_0 + te_i)$ avec e_i le i -ème vecteur de la base canonique.

On suppose désormais que f est *harmonique* sur U , i.e. $\Delta f = 0$. On pose

$$\forall \varepsilon > 0 \quad g_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon \|x\|^2$$

3. Montrer que g_ε est continue sur \bar{U} , de classe \mathcal{C}^2 sur U et que

$$\forall x \in U \quad \Delta g_\varepsilon(x) > 0$$

4. En déduire

$$\forall x \in U \quad f(x) \leq \sup_{y \in \partial U} f(y)$$