

Préparation à l'interrogation n°12

1 Étude asymptotique

1. Équivalent en 1 de $x^\alpha - 1$;
2. Équivalent en 1 de $\ln(x)$;
3. Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$, alors $\ln(f(x)) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \ln(g(x))$.

En effet, on a $g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(x) + o(f(x)) = f(x)(1 + o(1))$

puis $\ln(g(x)) = \underbrace{\ln(f(x))}_{\rightarrow \infty} + \underbrace{\ln(1 + o(1))}_{\rightarrow 0} = \ln(f(x)) + o(\ln(f(x)))$

Le résultat suit.

2 Trigonométrie

Soient a, b, θ réels et $n \in \mathbb{Z}$.

1. $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$;
2. $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$;
3. $\sin(n\pi) = 0$;
4. $\cos(n\pi) = (-1)^n$.

3 Calcul intégral

1. $\int^x \ln(1+t^2) dt$ (IPP) ;
2. $\int^x \cos(t)^{2n+1} dt = \int^x (1-\sin(t)^2)^n \cos(t) dt \underset{u=\sin(t)}{=} \int^{\sin(x)} (1-u^2)^n du = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \frac{\sin(x)^{2k+1}}{2k+1}$

4 Formules

1. Inégalité de Taylor-Lagrange
2. $\sum_{k=n}^{+\infty} \alpha^k$ avec $|\alpha| < 1$

5 Séries numériques

1. Encadrement du reste d'une série par comparaison série/intégrale ;
2. Critère de d'Alembert ;
3. Critère des séries alternées ;
4. Contrôle du reste d'une série alternée.

6 Inégalités de convexité/concavité

1. $\forall t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \quad \frac{2}{\pi}t \leq \sin(t) \leq t;$
2. $\forall t > -1 \quad \ln(1+t) \leq t;$
3. $\forall t \in \mathbb{R} \quad 1+t \leq e^t;$
4. $\forall u \geq -1 \quad (1+u)^\alpha \geq 1 + \alpha u \quad \text{avec } \alpha \geq 1;$
5. $\forall u \geq 0 \quad 1-u^\alpha \leq \alpha(1-u) \quad \text{avec } \alpha \geq 1.$

7 Dérivation

Dérivée simple de f définie par

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad f(t) = 2 \operatorname{Arctan} \left(\sqrt{1+t^2} - t \right)$$

8 Probabilités

1. Soit X variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0;1]$. On a $\mathbb{P}(X=1) = p$, $\mathbb{P}(X=0) = 1-p$, $\mathbb{E}(X) = p$ et $\mathbb{V}(X) = p(1-p)$;
2. Soit X variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètre n entier et $p \in [0;1]$. Pour X_1, \dots, X_n variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli de paramètre p , les variables X et $\sum_{i=1}^n X_i$ ont même loi. Par linéarité de l'espérance, il s'ensuit $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = np$ et par indépendance, on a $\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) = np(1-p)$.

9 Exercice type

Rayon de convergence de $\sum a^n z^n$ avec $a \in \mathbb{C}^*$ (voir cours).

10 Exercice type

Continuité de la fonction somme sur $]-1;1]$ (fermé en 1) de la série entière $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ (voir cours).

11 Exercice type

Montrer que $x \mapsto \ln(1+x)$ est développable en série entière sur un intervalle à préciser et donner son développement.

Corrigé : On a $\forall x \in]-1;1[\quad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$

Par intégration de série entière, on obtient

$$\boxed{\forall x \in]-1;1[\quad \ln(1+x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}}$$

12 Questions de cours

Séries entières, espaces préhilbertiens, graphes usuels.