

## Feuille d'exercices n°68

### Exercice 1 (\*\*)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et un complexe  $\alpha$  avec  $\operatorname{Re}(\alpha) > 0$  tel que

$$f'(x) + \alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Montrer

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

### Exercice 2 (\*\*)

Soit  $f : ]0; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable telles que

$$\forall t > 0 \quad f'(t) = f\left(\frac{1}{t}\right) \quad (\text{E})$$

Montrer que  $f$  est solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2, utiliser le changement de variables  $t = e^u$  puis déterminer l'ensemble des solutions de (E).

### Exercice 3 (\*\*\*)

Soit  $q : [0; +\infty[ \rightarrow ]0; +\infty[$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $q'(x) \geq 0$  pour tout  $x \geq 0$ . Montrer que toute solution de  $y'' + q(x)y = 0$  est bornée sur  $\mathbb{R}_+$ .

### Exercice 4 (\*\*\*)

Soient  $p, q$  dans  $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$  avec  $I$  intervalle non vide de  $\mathbb{R}$  et

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0 \quad (\text{H})$$

1. Montrer qu'une solution non nulle de (H) admet un nombre fini de zéros sur tout segment de  $I$ .
2. Soit  $(f, g)$  une base de solutions de (H) et  $\alpha < \beta$  deux zéros consécutifs de  $f$ . Montrer que  $g$  admet un unique zéro dans  $] \alpha; \beta [$ .

### Exercice 5 (\*\*\*)

Soient  $f, g$  continues sur  $\mathbb{R}_+$  avec  $g$  positive et vérifiant

$$\forall x \geq 0 \quad f(x) \leq A + \int_0^x f(t)g(t) dt \quad \text{avec} \quad A \geq 0$$

Montrer

$$\forall x \geq 0 \quad f(x) \leq A \exp\left(\int_0^x g(t) dt\right)$$

### Exercice 6 (\*\*\*)

Soit  $z$  solution de  $z'' - a(t)z = 0$  avec  $a \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, ]0; +\infty[)$ . Montrer que  $z = 0$  ou bien que  $z$  s'annule au plus une fois sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 7 (\*\*\*)

Soient  $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  continues avec  $f$  positive. On s'intéresse au *problème aux limites* (P) :

$$\begin{cases} y'' = f(t)y + g(t) & \text{(L)} \\ y(a) = y(b) = 0 & \text{(B)} \end{cases}$$

1. Soit  $y \in S_H$  avec (H) homogène associée à (L). Montrer que  $y^2$  est convexe.

2. On pose

$$\Phi : \begin{cases} S_H \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ y \longmapsto (y(a), y(b)) \end{cases}$$

Montrer que  $\Phi$  est un isomorphisme.

3. Conclure que le problème aux limites (P) admet une unique solution.

### Exercice 8 (\*\*\*)

Soit  $\alpha \in \mathbb{C}$  et  $b \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$  fonction  $T$ -périodique avec  $T > 0$ . On considère l'équation

$$y' + \alpha y = b(x) \quad (\text{L})$$

1. Montrer que si  $f$  est solution de (L), alors  $f_T : x \mapsto f(x + T)$  est aussi solution de (L).
2. En déduire que  $f$  solution de (L) est  $T$ -périodique si et seulement si  $f(0) = f(T)$ .
3. Montrer que, sauf pour certaines valeurs de  $\alpha$ , l'équation (L) admet une unique solution  $T$ -périodique.

### Exercice 9 (\*\*\*\*)

Soit  $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ ,  $b$  réel et  $a > 0$ .

1. Montrer que pour tout  $f \in E$ , il existe une unique fonction  $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$  vérifiant

$$(\text{C}) : \begin{cases} g' + ag = f(x) \\ g(0) = b \end{cases}$$

2. Montrer que si  $f$  est intégrable sur  $\mathbb{R}_+$ , alors  $g$  l'est également et déterminer une relation entre  $\int_0^{+\infty} f(t) dt$  et  $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ .