

## Feuille d'exercices n°75

### Exercice 1 (\*\*\*)

Soit  $E = \mathbb{R}_n[X]$ . Soit  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ . On définit  $F : E \rightarrow \mathbb{R}$  par

$$\forall P \in E \quad F(P) = \int_0^1 f(t, P(t)) dt$$

Montrer que  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et déterminer sa différentielle.

**Corrigé :** Soit  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in E$ . Montrons que pour tout  $j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ , l'application  $a_j \mapsto \int_0^1 f\left(t, \sum_{k=0}^n a_k t^k\right) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ . On fixe  $j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$  et on pose

$$\forall (t, a_j) \in [0 ; 1] \times \mathbb{R} \quad g(t, a_j) = f\left(t, \sum_{k=0}^n a_k t^k\right)$$

- Pour  $a_j$  réel, on a  $t \mapsto g(t, a_j)$  continue et intégrale sur le segment  $[0 ; 1]$ .
- Pour  $t \in [0 ; 1]$ , on a  $a_j \mapsto g(t, a_j) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  par composition. Par dérivation composée, on trouve

$$\forall (t, a_j) \in [0 ; 1] \times \mathbb{R} \quad \frac{\partial g}{\partial a_j}(t, a_j) = t^j \partial_2 f\left(t, \sum_{k=0}^n a_k t^k\right)$$

- Pour  $a_j$  réel, on a  $t \mapsto \frac{\partial g}{\partial a_j}(t, a_j)$  continue sur  $[0 ; 1]$  par théorèmes généraux.
- **Domination :** Soit  $[a ; b] \subset \mathbb{R}$ . L'application  $(t, a_j) \mapsto \frac{\partial g}{\partial a_j}(t, a_j)$  est continue par composition et continuité des dérivées partielles de  $f$ . Sur le compact  $[0 ; 1] \times [a ; b]$ , l'application  $(t, a_j) \mapsto \frac{\partial g}{\partial a_j}(t, a_j)$  est bornée donc dominée.

D'après le théorème de régularité  $\mathcal{C}^1$  sous l'intégrale, l'application  $a_j \mapsto \int_0^1 g(t, a_j) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur tout segment de  $\mathbb{R}$  et donc sur  $\mathbb{R}$  tout entier. On a

$$\forall P \in E \quad \forall j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket \quad \frac{\partial F}{\partial a_j}(P) = \int_0^1 t^j \partial_2 f(t, P(t)) dt$$

Il reste à montrer la continuité des dérivées partielles sur  $E$ . Soit  $j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ .

- Pour  $P \in E$ , l'application  $t \mapsto t^j \partial_2 f(t, P(t))$  est continue (par morceaux) sur  $[0 ; 1]$ .
- Pour  $t \in [0 ; 1]$ , l'application  $P \mapsto t^j \partial_2 f(t, P(t))$  est continue sur  $E$  puisque le morphisme d'évaluation  $P \mapsto P(t)$  est continu (linéaire en dimension finie) composé avec  $y \mapsto t^j \partial_2 f(t, y)$  continue puisque  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .
- **Domination :** Soit  $K$  un compact de  $E$ . L'application  $(t, P) \mapsto t^j \partial_2 f(t, P(t))$  est continue car composée de fonctions continues et est bornée donc dominée sur le compact  $[0 ; 1] \times K$  (produit

de compacts).

D'après le théorème de continuité sous l'intégrale, on a  $P \mapsto \frac{\partial F}{\partial a_j}(P)$  continue sur  $E$  pour tout  $j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ . On en déduit le caractère  $\mathcal{C}^1$  de  $F$  puis

$$\forall H = \sum_{j=0}^n h_j X^j \in E \quad dF(P) \cdot H = \sum_{j=0}^n h_j \frac{\partial F}{\partial a_j}(P) = \sum_{j=0}^n h_j \int_0^1 t^j \partial_2 f(t, P(t)) dt$$

Par linéarité de l'intégrale, on conclut

$$F \in \mathcal{C}^1(E, \mathbb{R}) \quad \text{avec} \quad \forall (P, H) \in E^2 \quad dF(P) \cdot H = \int_0^1 H(t) \partial_2 f(t, P(t)) dt$$

## Exercice 2 (\*\*\*)

On pose  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{(x^4 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Étudier la continuité puis le caractère  $\mathcal{C}^1$  de  $f$ .

**Corrigé :** La fonction  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  en tant que fonction rationnelle bien définie sur ce domaine. Avec l'équivalence

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad (x^2 - |y|)^2 \geq 0 \iff x^4 + y^2 \geq 2x^2 |y|$$

il vient

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \quad |f(x, y) - f(0, 0)| = \underbrace{\frac{x^2 |y|}{x^4 + y^2}}_{\leq 1/2} \frac{|x| y^2}{x^4 + y^2} \leq \frac{|x|}{2} \frac{y^2}{x^4 + y^2} \leq \frac{|x|}{2}$$

Il en résulte

$$f(x, y) \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(0, 0)$$

D'où la continuité de  $f$ .




FIGURE 1 – Graphe de  $z = f(x, y)$

Puis, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Et après calcul, on complète avec

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3 (3y^2 - 5x^4)}{(x^4 + y^2)^3} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{En particulier} \quad \forall x \in \mathbb{R}^* \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, x^2) = -\frac{1}{4} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$$

On conclut

$$f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \setminus \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$$




FIGURE 2 – Graphe de  $z = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$

### Exercice 3 (\*\*\*)

On munit  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  d'une norme vérifiant  $\|I_n\| = 1$  et  $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$  pour  $(A, B) \in E^2$ .

- Montrer  $\forall (A, B) \in E^2 \quad e^B - e^A = \int_0^1 e^{tB}(B - A)e^{(1-t)A} dt$

2. Soit  $R > 0$ . Montrer

$$\forall (X, Y) \in B_f(0, R)^2 \quad \|e^X - e^Y\| \leq e^R \|X - Y\|$$

3. En déduire que l'exponentielle est différentiable sur  $E$  avec

$$\forall (A, H) \in E^2 \quad d \exp(A) \cdot H = \int_0^1 e^{tA} H e^{(1-t)A} dt$$

**Corrigé :** 1. Soit  $(A, B) \in E^2$ . On observe

$$\frac{d}{dt} [e^{tB} e^{(1-t)A}] = e^{tB} B e^{(1-t)A} + e^{tB} (-A) e^{(1-t)A} = e^{tB} (B - A) e^{(1-t)A}$$

Ainsi

$$\forall (A, B) \in E^2 \quad e^B - e^A = \int_0^1 e^{tB} (B - A) e^{(1-t)A} dt$$

2. Soit  $(X, Y) \in B_f(0, R)^2$ . D'après l'égalité précédente, on a

$$e^X - e^Y = \int_0^1 e^{tX}(X - Y)e^{(1-t)Y} dt$$

Puis, par inégalité triangulaire

$$\|e^X - e^Y\| \leq \int_0^1 \|e^{tX}(X - Y)e^{(1-t)Y}\| dt$$

D'après le caractère sous-multiplicatif de la norme, on a

$$\forall t \in [0; 1] \quad \|e^{tX}(X - Y)e^{(1-t)Y}\| \leq \|e^{tX}\| \|X - Y\| \|e^{(1-t)Y}\|$$

Soit  $M \in E$ . On a  $\|M^k\| \leq \|M\|^k$  pour tout  $k$  entier par récurrence immédiate puis, par convergence de  $\sum \frac{\|M\|^k}{k!}$ , on obtient la convergence absolue de  $\sum \frac{M^k}{k!}$  et par inégalité triangulaire

$$\|e^M\| = \left\| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{M^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|M\|^k}{k!} = e^{\|M\|}$$

Ainsi  $\forall t \in [0; 1] \quad \|e^{tX}(X - Y)e^{(1-t)Y}\| \leq e^{tR} \|X - Y\| e^{(1-t)R} = e^R \|X - Y\|$

On conclut

$$\boxed{\forall (X, Y) \in B_f(0, R)^2 \quad \|e^X - e^Y\| \leq e^R \|X - Y\|}$$

3. Soit  $(A, H) \in E^2$ . Par linéarité de l'intégrale, il vient

$$\begin{aligned} e^{A+H} - e^A - \int_0^1 e^{tA} H e^{(1-t)A} dt &= \int_0^1 e^{t(A+H)} H e^{(1-t)A} dt - \int_0^1 e^{tA} H e^{(1-t)A} dt \\ &= \int_0^1 (e^{t(A+H)} - e^{tA}) H e^{(1-t)A} dt \end{aligned}$$

Par inégalité triangulaire, il vient

$$\left\| e^{A+H} - e^A - \int_0^1 e^{tA} H e^{(1-t)A} dt \right\| \leq \int_0^1 \left\| (e^{t(A+H)} - e^{tA}) H e^{(1-t)A} \right\| dt$$

Avec le caractère sous-multiplicatif et l'inégalité établie à la question précédente, on obtient

$$\begin{aligned} \left\| e^{A+H} - e^A - \int_0^1 e^{tA} H e^{(1-t)A} dt \right\| &\leq \int_0^1 \|e^{t(A+H)} - e^{tA}\| \|H\| \|e^{(1-t)A}\| dt \\ &\leq e^{\|A\| + \|H\|} \|H\|^2 e^{\|A\|} = o(H) \end{aligned}$$

Enfin, l'application  $H \mapsto \int_0^1 e^{tA} H e^{(1-t)A} dt$  est linéaire par linéarité du produit à droite et à gauche et de l'intégrale et on conclut

$$\boxed{\text{L'exponentielle est différentiable sur } E \text{ et } \forall (A, H) \in E^2 \quad d\exp(A) \cdot H = \int_0^1 e^{tA} H e^{(1-t)A} dt}$$

**Variantes :** (a) On peut procéder différemment. Pour  $(A, H) \in E^2$ , on a

$$e^{A+H} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(A+H)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left[ A^k + \sum_{\ell=0}^{k-1} A^\ell H A^{k-1-\ell} + R_k(A, H) \right]$$

La série  $\sum \frac{A^k}{k!}$  converge absolument. Puis, on a avec la norme d'algèbre

$$\forall k \in \mathbb{N}^* \quad \left\| \frac{1}{k!} \sum_{\ell=0}^{k-1} A^\ell H A^{k-1-\ell} \right\| \leq \frac{k}{k!} \|A\|^{k-1} \|H\| = \frac{\|A\|^{k-1}}{(k-1)!} \|H\|$$

d'où la convergence absolue de  $\sum \frac{1}{k!} \left[ \sum_{\ell=0}^{k-1} A^\ell H A^{k-1-\ell} \right]$ . Par linéarité du symbole somme, on obtient

$$e^{A+H} - e^A - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left[ \sum_{\ell=0}^{k-1} A^\ell H A^{k-1-\ell} \right] = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{R_k(A, H)}{k!} \quad \text{avec} \quad R_k(A, H) = \sum_{\ell=0}^{k-1} A^\ell H A^{k-1-\ell}$$

qui converge absolument. En utilisant à nouveau le caractère de norme d'algèbre, on trouve

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \|R_k(A, H)\| \leq R_k(\|A\|, \|H\|)$$

et

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad R_k(\|A\|, \|H\|) = (\|A\| + \|H\|)^k - \|A\|^k - k\|A\|^{k-1}\|H\|$$

d'où

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{R_k(\|A\|, \|H\|)}{k!} = e^{\|A\| + \|H\|} - e^{\|A\|} - \|H\|e^{\|A\|} = o(H)$$

Enfin, l'application  $H \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left[ \sum_{\ell=0}^{k-1} A^\ell H A^{k-1-\ell} \right]$  est linéaire et on obtient

La fonction exponentielle est différentiable sur  $E$  et

$$\forall (A, H) \in E^2 \quad d \exp(A) \cdot H = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left[ \sum_{\ell=0}^{k-1} A^\ell H A^{k-1-\ell} \right]$$

(b) Pour les questions 2 et 3, on peut encore faire autrement. On a établi pour  $(A, B) \in E^2$

$$e^B - e^A = \int_0^1 e^{tB} (B - A) e^{(1-t)A} dt$$

d'où

$$e^B - e^A = \int_0^1 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k B^k}{k!} (B - A) \sum_{\ell=0}^{+\infty} \frac{(1-t)^\ell A^\ell}{\ell!} dt$$

On peut justifier la permutation des symboles sommes et intégrale. On peut également généraliser les résultats des familles sommables pour des familles à valeurs vectorielles (hors-programme !) et invoquer le théorème de Fubini pour obtenir

$$e^B - e^A = \sum_{(k, \ell) \in \mathbb{N}^2} B^k (B - A) A^\ell \frac{1}{k! \ell!} \int_0^1 t^k (1-t)^\ell dt$$

D'après un résultat d'intégration classique, on a

$$\forall (k, \ell) \in \mathbb{N}^2 \quad \int_0^1 t^k (1-t)^\ell dt = \frac{k! \ell!}{(k + \ell + 1)!}$$

d'où

$$e^B - e^A = \sum_{(k, \ell) \in \mathbb{N}^2} \frac{1}{(k + \ell + 1)!} B^k (B - A) A^\ell$$

Avec de la sommation par paquets en posant  $p = k + \ell$  puis  $p = k + \ell + 1$ , on retrouve les résultats des questions 2 et 3.

## Exercice 4 (\*\*\*)

Soit  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On pose

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad g(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_x^{xy} f(t) dt & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \\ f(0)(y - 1) & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

**Corrigé :** On pose

$$\varphi(t) = \begin{cases} \frac{F(t) - F(0)}{t - 0} & \text{si } t \neq 0 \\ f(0) & \text{sinon} \end{cases}$$

avec  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  pour  $x$  réel. On a

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad g(x, y) = y\varphi(xy) - \varphi(x)$$

Par construction, on a  $\varphi \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^*, \mathbb{R})$ . La fonction  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  comme primitive de  $f$  fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . D'après le théorème de Taylor-Young, on a

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + F''(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) = f(0)t + f'(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

Puis

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}^* \quad \varphi'(t) &= \frac{1}{t^2} [tf(t) - F(t)] \\ &= \frac{1}{t^2} \left[ tf(0) + f'(0)t^2 - f(0)t - f'(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \right] = \frac{f'(0)}{2} + o(1) \end{aligned}$$

Ainsi, d'après le théorème de classe  $\mathcal{C}^1$  par prolongement, on a  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Par composition, on conclut

$$g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$$

### Exercice 5 (\*\*\*\*)

Soit  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ . On pose

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) = \int_0^x f(x, t) dt$$

Montrer que  $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  et déterminer  $g'(x)$  pour  $x$  réel.

**Corrigé :** Soit  $x \in \mathbb{R}^*$ . Avec le changement de variable  $t = xu$  de classe  $\mathcal{C}^1$ , il vient

$$g(x) = \int_0^1 f(x, xu)x du = x \int_0^1 f(x, xu) du$$

La relation vaut aussi clairement pour  $x = 0$ . On note  $\varphi(x, u) = f(x, xu)$  pour  $(x, u) \in \mathbb{R}^2$ . D'après la règle de la chaîne, on a  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  et

$$\forall (x, u) \in \mathbb{R}^2 \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, u) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, xu) + u \frac{\partial f}{\partial y}(x, xu)$$

Vérifions les hypothèses du théorème de dérivation sous l'intégrale pour  $x \mapsto \int_0^1 \varphi(x, u) du$ .

- Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $u \mapsto \varphi(x, u)$  intégrable sur  $[0 ; 1]$  (fonction continue sur un segment).
- D'après ce qui précède, on a pour  $u \in [0 ; 1]$ ,  $x \mapsto \varphi(x, u)$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .
- Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $u \mapsto \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, u)$  continue sur  $[0 ; 1]$ .
- **Domination :** On s'oriente vers une domination locale puisque rien ne permet d'envisager une domination globale. Pour  $(x, u) \in [a ; b] \times [0 ; 1]$ , la fonction  $(x, u) \mapsto \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, u)$  est continue sur le compact  $[a ; b] \times [0 ; 1]$  donc borné sur cet ensemble ce qui prouve la domination.

Ainsi, par théorème, on a  $\Phi : x \mapsto \int_0^1 \varphi(x, u) du$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur tout segment  $[a ; b]$  donc sur  $\mathbb{R}$  et par dérivation sous l'intégrale

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \Phi'(x) = \int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, u) du = \int_0^1 \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(x, xu) + u \frac{\partial f}{\partial y}(x, xu) \right] du$$

Par suite, on a  $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  avec

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g'(x) = x \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, xu) du + \int_0^1 f(x, xu) du + x \int_0^1 u \frac{\partial f}{\partial y}(x, xu) du$$

Avec le changement de variable  $t = xu$  (en distinguant  $x$  nul et non nul), on trouve

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad x \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, xu) du = \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

En intégrant par parties, on trouve

$$\int_0^1 f(x, xu) du = [uf(x, xu)]_{u=0}^{u=1} - \int_0^1 xu \frac{\partial f}{\partial y}(x, xu) du$$

$$\text{D'où} \quad \int_0^1 f(x, xu) du + x \int_0^1 u \frac{\partial f}{\partial y}(x, xu) du = f(x, x)$$

On conclut

$$\boxed{g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad g'(x) = f(x, x) + \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt}$$

## Exercice 6 (\*\*\*\*)

Soit  $n$  entier non nul et  $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^n$  définie par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad f(M) = (\text{Tr}(M) \quad \text{Tr}(M^2) \quad \dots \quad \text{Tr}(M^n))$$

1. Montrer que  $f$  est différentiable et déterminer  $df(M)$  pour  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
2. Comparer le rang de  $df(M)$  et le degré du polynôme minimal  $\pi_M$ .
3. Montrer que l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont le polynôme minimal est de degré  $n$  est une partie ouverte de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

**Corrigé :** 1. Notons  $\varphi_k : M \rightarrow \text{Tr}(M^k)$  pour  $k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ . L'application  $\varphi_k$  est polynomiale en les coefficients de la matrice d'où  $\varphi_k \in \mathcal{C}^1(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R})$ . Pour  $(M, H) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ , on a

$$\varphi_k(M + H) = \text{Tr}(M^k + M^{k-1}H + M^{k-2}HM + \dots + HM^{k-1} + o(H))$$

d'où  $\forall (M, H) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2 \quad d(\varphi_k)(M) \cdot H = k \text{Tr}(M^{k-1}H)$

Par suite

$$\boxed{\forall (M, H) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2 \quad df(M) \cdot H = (\text{Tr}(H) \quad 2\text{Tr}(MH) \quad \dots \quad n\text{Tr}(M^{n-1}H))}$$

**Remarque :** Pour le détail de  $(M+H)^k$  avec  $k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , étant donné qu'il n'y a pas commutation *a priori*, on peut établir par récurrence sur  $k$  la relation

$$(M + H)^k = \sum_{j=0}^k \sum_{(i_0, \dots, i_j) \in \mathbb{N}^{j+1} : \sum_{\ell=0}^j i_{\ell} = k-j} M^{i_0} H M^{i_1} \dots H M^{i_j}$$

et on en déduit

$$(M + H)^k = M^k + M^{k-1}H + M^{k-2}HM + \dots + HM^{k-1} + o(H)$$

2. On note  $\mathcal{C} = (E_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$  la base canonique de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Notons  $\psi_k : H \mapsto (k+1) \operatorname{Tr}(M^k H)$  pour  $k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$ . On a

$$\begin{aligned} \operatorname{rg} df(M) &= \operatorname{rg} df(M)(\mathcal{C}) = \operatorname{rg} (\psi_0(\mathcal{C}), \dots, \psi_{n-1}(\mathcal{C})) \\ &= \dim \operatorname{Vect} (\psi_0(\mathcal{C}), \dots, \psi_{n-1}(\mathcal{C})) = \dim \operatorname{Vect} (\psi_0, \dots, \psi_{n-1}) \end{aligned}$$

puisque  $\psi_k \mapsto \psi_k(\mathcal{C})$  est un isomorphisme. Notons  $m = \deg \pi_M$ . On a  $\mathbb{R}[M] = \mathbb{R}_{m-1}[M]$  d'où

$$\operatorname{Vect} (\psi_0, \dots, \psi_{n-1}) = \operatorname{Vect} (\psi_0, \dots, \psi_{m-1})$$

Supposons  $(\psi_0, \dots, \psi_{m-1})$  liée. Soit  $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 0 ; m-1 \rrbracket} \in \mathbb{R}^m \setminus \{0_{\mathbb{R}^m}\}$  tel que  $\sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i \psi_i = 0$ . Il s'ensuit

$$\forall H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad \operatorname{Tr} \left( \left( \sum_{i=0}^{m-1} (i+1) \alpha_i M^i \right) H \right) = 0$$

En particulier, en choisissant  $H = \left( \sum_{i=0}^{m-1} (i+1) \alpha_i M^i \right)^\top$ , on obtient  $\sum_{i=0}^{m-1} (i+1) \alpha_i M^i = 0$  ce qui contredit  $\deg \pi_M = m$ . Donc la famille est libre et on conclut

$$\boxed{\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad \operatorname{rg} df(M) = \deg \pi_M}$$

3. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $\deg \pi_A = n$ . D'après ce qui précède, on a  $\operatorname{rg} df(A) = n$ . Notant  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$  les bases canoniques de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $\mathbb{R}^n$ , il existe une matrice de  $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$  extraite de  $\operatorname{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} df(A)$ . Notons  $I \times J$  les plages d'indices de cette extraction et on considère  $\Phi : M \mapsto \det(\operatorname{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} df(M))_{(i,j) \in I \times J}$ . L'ensemble  $U = \Phi^{-1}(\mathbb{R}^*)$  est un ouvert comme image réciproque d'un ouvert par une application continue avec  $A \in U$  et tout élément de  $U$  est de rang supérieur ou égal à  $n$  et donc égal à  $n$ . On conclut

L'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont le polynôme minimal est de degré  $n$  est un ouvert.