

– Programme de colle n° 9 : du 24 au 28/11 –

Les questions de cours et les exercices portent sur tout ce qui suit : algèbre linéaire, matrices (sans réduction).

CHAPITRE 8 - RÉVISIONS D'ALGÈBRE LINÉAIRE
APPLICATIONS LINÉAIRES. DIMENSION FINIE.

Rang d'une famille finie de vecteurs.

Majoration du rang par la dim de l'espace et par le nb de vecteurs de la famille. Cas d'égalités. 

Majoration du rang de u la dimension de E et par la dimension de F . Cas d'égalités.

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels tel que E soit de dimension finie. Alors :

$$E \text{ et } F \text{ sont isomorphes} \Leftrightarrow \begin{cases} F \text{ est de dimension finie} \\ \dim E = \dim F. \end{cases} \quad \text{img alt="pencil icon" data-bbox="708 396 726 407}$$

Forme géométrique du théorème du rang : si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et si E_0 est un supplémentaire de $\text{Ker } u$ dans E , alors u induit un isomorphisme de E_0 dans $\text{Im } u$. 

Existence et unicité du polynôme d'interpolation de Lagrange. 

△ Le polynôme d'interpolation de Lagrange associé à $n + 1$ points est de degré inférieur ou égal à n .

Formes linéaires d'un espace vectoriel de dimension finie.

△ Bien connaître la notion de base duale. Équation d'un hyperplan dans une base.

Si $\dim E = n$, l'intersection de m hyperplans est de dimension au moins $n - m$. 

Réciproquement, tout sous-espace de E de dimension $n - m$ est l'intersection de m hyperplans. 

CHAPITRE 9 - RÉVISIONS SUR LES MATRICES.

Soit $x \in E$ et soit $(x_1, \dots, x_p)$ ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}_1$.

En notant $y = u(x)$ et $(y_1, \dots, y_n)$ ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}_2$, on obtient :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, y_i = \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j \quad \text{img alt="pencil icon" data-bbox="601 675 619 686}$$

Si $v \in \mathcal{L}(F, G)$ et $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors :

$$M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_3}(v \circ u) = M_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3}(v) \times M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(u) \quad \text{img alt="pencil icon" data-bbox="648 741 666 752}$$

Formule de changement de bases : $M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(u) = P_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}'_2} \cdot M_{\mathcal{B}'_1, \mathcal{B}'_2}(u) \cdot P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}'_1}^{-1}$ 

Cas particulier des endomorphismes : $M_{\mathcal{B}}(u) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot M_{\mathcal{B}'}(u) \cdot P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1}$

Une matrice est de rang r si, et seulement si, elle est équivalente à J_r .

Deux matrices semblables ont même trace.

⚠ Connaître des exemples de matrices carrées équivalentes mais pas semblables ; de matrices carrées de même trace et même rang mais pas semblables.

Formule sommatoire du déterminant : $\det A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$