

1. Diffusion thermique en entier. Cours et exercices.
2. Enthalpie libre et potentiel chimique en cours et exercices.
3. Thermochimie : premier et second principe en question de cours uniquement. **Cependant un exercice sur la température de flamme pourra être posé.**

ENTHALPIE LIBRE ET POTENTIEL CHIMIQUE

I. Une nouvelle fonction d'état : enthalpie libre G

- $G = U + PV - TS$ et pour une transformation monotherme (source de température T_s) et monobare avec un échange de travail autre que les forces de pression :

$$G_F - G_I = W_{\text{autre}}(I \rightarrow F) - T_s S_c(I \rightarrow F) \leq W_{\text{autre}}(I \rightarrow F)$$

- Si $W_{\text{autre}}(I \rightarrow F) = 0$ ou $W_{\text{autre}}(I \rightarrow F) < 0$, G ne peut que diminuer. Dans ce cas on admet que G est minimale à l'équilibre et joue le rôle d'un potentiel thermodynamique.

II. Enthalpie libre d'un système monophasé homogène

- G est une fonction d'état : $G = G(T, P, n_1, \dots, n_K)$. Identité thermodynamique : $dG = -S dT + V dP + \sum_{k=1}^K \mu_k dn_k$
- Homogénéité (de degré 1) d'une grandeur extensive : $X(T, P, \lambda n_1, \dots, \lambda n_K) = \lambda X(T, P, n_1, \dots, n_K)$. Théorème d'Euler et définition des grandeurs molaires partielles :

$$X = \sum_{k=1}^K n_k \tilde{X} \quad \text{avec} \quad \tilde{X} = \left(\frac{\partial X}{\partial n_k} \right)_{T, P, n_{\ell} \neq n_k}$$

En particulier : $G = \sum_{k=1}^K n_k \mu_k$

- Cas particulier d'un corps pur monophasé : $X(T, P, n) = n X_m(T, P)$ (X_m = grandeur molaire associée à X). $\tilde{X} = X_m(T, P)$. Identité thermodynamique :

$$dG = -S dT + V dP + \mu dn$$

et

$$\mu = G_m(T, P) \quad \text{avec} \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_P = -S_m \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_T = V_m$$

III. Étude du potentiel chimique. Activité

- Potentiel chimique d'un corps pur gazeux ; d'un corps pur en phase condensée idéale.
- Expression général du potentiel chimique, potentiel chimique standard : $\mu_k = \mu_k^{\circ}(T) + RT \ln(a(B_k))$. Les expressions des activités sont à connaître.
- Grandeur molaires standard : $G_{m,k}^{\circ}$, $S_{m,k}^{\circ}$ et $H_{m,k}^{\circ}$

THERMOCHIMIE

I. Enthalpie libre d'une réaction. Sens d'évolution et équilibre chimique

- Avancement d'une réaction. Variables de De Donder.
- Expressions de l'enthalpie libre de réaction :

$$\Delta_r G = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i \quad \text{et} \quad \Delta_r G = \Delta_r G^{\circ}(T) + RT \ln(Q_r)$$

- Critère d'équilibre chimique : loi d'action des masses ou loi de Guldberg et Waage.
- Sens d'évolution de la réaction.
- Application à l'étude du corps pur diphasé.

II. Grandeurs standard de la réaction. Loi de Van't Hoff

- Définition et relations entre grandeurs standards.
- Évolution de K° avec T : loi de Van't Hoff.
- Approximation d'Ellingham.

III. Transferts thermiques au cours d'une réaction chimique

- Cas d'une réaction monobare et monotherme
- Cas d'une réaction monobare et adiabatique. Température de flamme.

Questions de cours :

1. Définition et propriétés de $\vec{j_Q}$. Loi de Fourier. Donner quelques ordres de grandeur de conductivités thermiques. Discuter la présence du signe “-” dans la loi de Fourier.
2. Établir l'équation de diffusion thermique dans un des trois systèmes de coordonnées (au choix du collé) en appliquant le premier principe à des tranches ou des coquilles élémentaires.
3. Établir l'équation vérifiée par $T(x, t)$ dans une ailette de refroidissement cylindrique de rayon R en raisonnant sur une tranche élémentaire comprise entre x et $x + dx$.

4. Définir un champ vectoriel à flux conservatif. Énoncer le théorème d'Ostrogradski. Faire le lien avec le flux sortant à travers une surface fermée.
5. Calculer la résistance thermique d'une tige isolée thermiquement sur sa surface latérale dans un modèle où $T = T(x)$.
6. Énoncer les lois d'association série et parallèle des résistances thermiques. Les démontrer dans le cas d'une association série ou parallèle de barres (au choix du collé).
7. Donner les expressions possibles de l'activité chimique d'une espèce B .
8.
 - Donner sans démonstration l'expression de $\Delta_r G$ en fonction des potentiels chimique puis montrer la relation entre $\Delta_r G$ et le quotient réactionnel Q_r .
 - Énoncer le critère d'équilibre chimique et en déduire la loi de Guldberg et Waage. Définir la constante d'équilibre K° .
 - Donner les deux formes du critère d'évolution d'une réaction chimique.
9.
 - Donner sans démonstration les trois relations liant $\Delta_r G^\circ, \Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r H^\circ$.
 - Démontrer la loi d'évolution de la constante d'équilibre K° en fonction de la température (loi de Van't Hoff).
 - Énoncer l'approximation d'Ellingham.