

FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

I. Définitions

On considère un triangle rectangle ABC, rectangle en B. Soit θ l'angle en A. On a :

$$\cos \theta = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$$


$$\sin \theta = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$$


$$\cotan \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{côté opposé}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$$

On peut aussi utiliser le cercle trigonométrique pour se représenter ces grandeurs : Soit M un point du cercle de centre O et de rayon 1. Alors l'abscisse de M est $\cos \theta$ et son ordonnée est $\sin \theta$. Si on prolonge la droite (OM), son intersection avec la droite tangente à l'axe horizontal en A donne le point T et $\overline{AT} = \tan \theta$, pour $\theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Non définie	0	0




2) Fonction cosinus




C'est une fonction définie sur \mathbb{R} , elle est paire et périodique de période 2π . Elle est dérivable et $(\cos x)' = -\sin x$

3) Fonction sinus




C'est une fonction définie sur \mathbb{R} , elle est impaire et périodique de période 2π .
Elle est dérivable et $(\sin x)' = \cos x$

Vous devez être capable de les reconnaître du premier coup d'œil, ainsi que leurs opposées.



4) Fonction tangente



Elle est définie sur des intervalles de longueur π de la forme $\left] -\frac{\pi}{2} + n\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi \right[$ avec n entier.

Elle est impaire et périodique de période π .

Elle est dérivable et $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

5) Formulaire de trigonométrie à apprendre par cœur

$$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$1 + \cos(2a) = 2 \cos^2 a$$

$$1 - \cos(2a) = 2 \sin^2 a$$

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

Moins courantes, mais utiles en Math pour les changements de variable :

$$\cos(2a) = \frac{1 - \tan^2 a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\sin(2a) = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$