TD 3 – Modèles de quelques dispositifs optiques

Ce qu'il faut savoir et savoir faire

- Même chose qu'au TD2.
- Modéliser l'œil comme l'association d'une lentille de vergence variable et d'un capteur fixe.
- Citer les ordres de grandeurs de la limite de résolution angulaire et de la plage d'accommodation.
- Représenter le schéma d'une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes ; identifier l'objectif et l'oculaire.
- Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale.
- Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale.

J'apprends mon cours : Questions de cours, QCM, exercices 1, 2, 5

Questions de cours

- Q1.** Préciser quel organe de l'œil joue le rôle de lentille, de diaphragme, d'écran et faire un schéma.
- Q2.** Qu'est-ce que l'accommodation ?
- Q3.** Qu'appelle-t-on punctum proximum et punctum remotum ?
- Q4.** Qu'appelle-t-on œil "normal" ? Quel autre adjectif peut-on utiliser ?
- Q5.** Définir et donner les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la plage d'accommodation d'un œil emmétrope.
- Q6.** Définir le terme afocal.
- Q7.** Modéliser la lunette astronomique.
- Q8.** Établir l'expression du grossissement d'une lunette astronomique.

QCM

1) L'œil peut être modélisé par :

- a. Une lentille convergente, un écran, une source de lumière.
- b. Une lentille convergente, un écran, un diaphragme.
- c. Une lentille divergente, un écran, une fente.
- d. Une lentille divergente, un écran, un diaphragme.

2) L'ensemble cornée cristallin :

- a. Peut-être assimilé à une lentille convergente d'indice variable.
- b. Peut-être assimilé à une lentille convergente de focale variable.
- c. Peut être assimilé à une lentille convergente mobile.

3) Quand l'œil accommode :

- a. L'iris modifie son ouverture.
- b. La courbure du cristallin est modifiée.
- c. La rétine se déplace.

4) Quand l'œil est au repos :

- a. Sa distance focale est maximale.
- b. Sa distance focale est minimale.

5) L'image d'un objet sur la rétine est :

- a. Toujours réelle.
- b. Toujours virtuelle.
- c. Réelle ou virtuelle suivant la position de l'objet.

6) Un œil de diamètre 15 mm voit net un objet situé à l'infini.

- a. Sa distance focale est infinie.
- b. Sa distance focale est $f' = 15$ mm.

7) Pour voir nettement un objet situé au punctum proximum :

- a. La distance focale du cristallin doit être maximale.
- b. La distance focale du cristallin doit être minimale.
- c. L'œil doit être au repos.

8) Parmi les affirmations suivantes lesquelles sont exactes ?

- a. Lorsque l'œil accommode, le système optique de l'œil devient moins convergent.
- b. Pour observer un objet très éloigné, l'œil emmétrope n'a pas besoin d'accommoder.
- c. Si un œil emmétrope n'accommode pas, l'image d'un objet proche se forme derrière la rétine.

Exercices

Exercice 1 : Presbytie

★★★
Ref. 0022

- ✓ *Lentilles minces*
- ✓ *Relation de conjugaison*
- ✓ *Modélisation de l'œil*
- ✓ *Défauts de l'œil*

Un œil normal est assimilable à une lentille mince convergente de centre optique O , de distance focale f' . La rétine est assimilée à un plan perpendiculaire à l'axe optique et situé à une distance invariable de 17 mm.

- 1) L'œil n'accommode pas. Que vaut f_1' ?
- 2) L'œil accommode maintenant au maximum. L'observateur voit nettement des objets situés à la distance minimale distincte, c'est-à-dire à 25 cm de O . Calculer la nouvelle distance focale f_2' .
- 3) On définit l'amplitude d'accommodation par la relation $\Delta = V_1 - V_2$. V_1 et V_2 étant les vergences associées aux distances focales calculées précédemment. Calculer l'amplitude d'accommodation.

- 4) Avec l'âge, l'œil devient presbyte, le cristallin devenant moins souple. La faculté d'accommodation diminue. La personne continue à voir nettement à l'infini sans accommoder. Calculer la nouvelle distance minimale de vision distincte dans le cas d'une amplitude d'accommodation réduite d'un facteur 4.

Exercice 2 : Correction d'un œil myope ♥

★★★
Ref. 0023

- ✓ *Lentilles minces*
- ✓ *Relation de conjugaison*
- ✓ *Modélisation de l'œil*
- ✓ *Défauts de l'œil*

Un œil myope possède un punctum proximum situé à 12 cm et un punctum remotum situé à 1.2 m. Le centre optique de la lentille équivalente à l'œil est à 15.2 mm de la rétine.

- 1) Entre quelles valeurs la distance focale de cet œil peut-elle varier ?
- 2) Déterminer la distance focale des lentilles de contact correctrices permettant une bonne vision de loin.
- 3) Où se situe le punctum proximum de l'œil corrigé ?

Exercice 3 : Etude d'une loupe

★★★
Ref. 0024

- ✓ *Lentilles minces*
- ✓ *Pouvoir de résolution*
- ✓ *Grossissement*

Une loupe est une lentille convergente de distance focale image f' . On l'utilise pour observer une image agrandie d'un objet à travers la lentille.

- 1) De quelle nature est l'image donnée par la loupe ?
- 2) Pour observer l'image de l'objet sans fatigue, où doit-elle se former ? Où doit être placé l'objet par rapport à la lentille pour qu'il en soit ainsi ? Faire un schéma dans cette situation.
- 3) On définit le grossissement commercial par $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$, où α est l'angle sous lequel est vu l'objet à l'œil nu (sans loupe) observé au punctum proximum ($d_m = 25$ cm), et α' l'angle sous lequel est vue l'image observée à travers la loupe. Exprimer le grossissement commercial de la loupe en fonction de f' et d_m .
- 4) Calculer la valeur du grossissement commercial d'une loupe de vergence $V = 10$ δ.
- 5) Quel est le pouvoir de résolution de l'œil dans de bonnes conditions d'éclairement ? Donner la taille du plus petit objet que peut distinguer un œil normal en accommodant au maximum.
- 6) Donner la taille du plus petit objet que peut distinguer un œil normal en utilisant la loupe sans accommoder. Conclure.

Exercice 4 : Profondeur de champ d'un appareil photo numérique ♥

☒ | ★★★
Ref. 0025

- ✓ *Lentilles minces*
- ✓ *Relation de conjugaison*
- ✓ *Stigmatisme approché*

On modélise l'objectif d'un appareil photographique par une seule lentille, de distance focale $|f'| = 50$ mm, limitée par un diaphragme de rayon R accolé à la lentille. On place le capteur CCD de sorte que l'image d'un objet réel AB , de hauteur $h = 20$ cm et situé à une distance d_0 du foyer objet F , soit réelle, nette et de hauteur $h' = 35$ mm.

- 1) Quel type de lentille doit-on utiliser pour obtenir une image réelle d'un objet réel ? En déduire le signe de f' . Où doit-on placer l'objet par rapport à F ?
- 2) Placer l'objet AB sur un schéma, et tracer les 3 rayons de construction de l'image.
- 3) A l'aide du schéma précédent, exprimer la distance d'_0 qui sépare la pellicule du foyer image F' en fonction de f' , h et h' . Faire l'application numérique.
- 4) De même, exprimer la distance d_0 qui sépare l'objet du foyer objet en fonction de f' , h et h' . Faire l'application numérique.

Un objet A_1B_1 identique à AB est placé sur l'axe optique à une distance $d > d_0$ du foyer objet.

- 5) Construire l'image A'_1 de A_1 sur un autre schéma, on fera apparaître le diaphragme ainsi que les rayons extrêmes passant par la lentille et convergeant en A'_1 .

- 6) Montrer que le rayon r de la tâche image obtenue sur la matrice CCD vérifie $r = R \frac{d'_0 - \frac{f'^2}{d}}{f' + \frac{f'^2}{d}}$

On considère que la netteté de l'image est acceptable si le rayon de la tâche image d'un objet ponctuel n'excède pas 0,05 mm. On donne le nombre d'ouverture $N = \frac{f'}{2R} = 10$.

- 7) L'image d'un objet à l'infini est-elle nette ?
- 8) Déterminer la valeur maximale de d pour laquelle l'image est nette.

Exercice 5 : Lunette de Galilée (D'après CCP MP 2007) ♥

★★★
Ref. 0026

- ✓ Lentilles minces
- ✓ Système afocal
- ✓ Pouvoir de résolution de l'œil

Une lunette de Galilée comprend un objectif, assimilable à une lentille mince L_1 de centre O_1 et de vergence $V_1 = +5,0 \delta$ et un oculaire, assimilable à une lentille mince L_2 de centre O_2 et de vergence $V_2 = -20 \delta$.

Quelle que soit la configuration, la lumière traverse toujours la lunette en passant d'abord par l'objectif puis par l'oculaire.

- 1) Déterminer la nature des lentilles et les valeurs de leurs distances focales images.
- 2) La lunette est du type « afocale ». Rappeler l'intérêt d'un tel système.
- 3) Préciser la position relative des deux lentilles et la distance entre les deux lentilles.
- 4) Réaliser alors un schéma de la lunette de Galilée en choisissant intelligemment les rayons lumineux construits.
- 5) Définir puis exprimer les grossissements G de la lunette de Galilée en fonction des distances focales.
- 6) Faire l'application numérique.
- 7) La lunette de Galilée est, contrairement à la lunette astronomique, adaptée à la vision d'objets terrestres ? Justifier.

- 8) Un astronome amateur utilise cette lunette pour observer deux cratères lunaires : Copernic (de diamètre 96 km) et Clavius (de diamètre 240 km). L'astronome voit-il ces cratères à l'œil nu ? à l'aide de la lunette ?

Donnée : Distance Terre-Lune : $d_{TL} = 384.10^3$ km,

Exercice 6 : Oculaires

★★★
Ref. 0027

- ✓ Doublet de lentilles
- ✓ Constructions géométriques
- ✓ Relation de conjugaison

Les oculaires utilisés dans les instruments d'optique (microscope par exemple) sont constitués d'un doublet de deux lentilles. On note f'_1 et f'_2 les distances focales des lentilles et on pose $\Delta = \overline{F'_1 F_2}$.

Le doublet est tel que : $f'_1 = 3a$, $f'_2 = a$, et $\overline{O_1 O_2} = 2a$. La constante a est positive.

- 1) Déterminer graphiquement les positions des foyers objet et image, F et F' , de l'ensemble du dispositif.
- 2) Montrer que $\overline{F_1 F} = \frac{9a}{2}$ et $\overline{F'_2 F'} = -\frac{a}{2}$. Vérifier l'accord avec la construction graphique.

Exercice 7 : Microscope (D'après Banque PT 2017) ♥

★★★
Ref. 0028

- ✓ Lentille mince
- ✓ Constructions
- ✓ Relation de conjugaison
- ✓ Grandissement transversal
- ✓ Grossissement
- ✓ Lois de Descartes

Le microscope est modélisé sur la figure 1, par un système de deux lentilles minces convergentes, l'objectif (lentille L_1 de centre O_1 et de distance focale image $f'_1 = 5$ mm), et l'autre constituant l'oculaire (lentille L_2 de centre O_2 et de distance focale image $f'_2 = 15$ mm). On fixe $O_1 O_2 = D_0 = 120$ mm. On choisit le sens positif dans le sens de propagation de la lumière.

- 1) Si F'_1 est le foyer image de L_1 et F_2 le foyer objet de L_2 , on définit l'intervalle optique par la grandeur algébrique $\Delta = \overline{F'_1 F_2}$. Exprimer Δ en fonction de f'_1, f'_2, D_0 , puis calculer sa valeur.

Un objet réel AB perpendiculaire à l'axe optique est éclairé et placé à une distance d de L_1 , à sa gauche, de façon à ce que l'image $A'B'$ donnée par l'objectif, appelée image intermédiaire se trouve dans le plan focal objet de l'oculaire. L'observation se fait à l'œil placé au contact de l'oculaire.

- 2) Exprimer d en fonction de f'_1 et Δ , puis calculer sa valeur.
- 3) Exprimer le grandissement transversal γ_1 induit par l'objectif en fonction de f'_1 et Δ , puis calculer sa valeur.
- 4) Quel est l'intérêt pour l'observateur de cette position de l'objet ?
- 5) Faire une construction géométrique faisant apparaître l'objet, l'image intermédiaire, ainsi que l'angle α' sous lequel est observée l'image finale à travers le microscope.
- 6) Le grossissement commercial du microscope est défini par $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ où α est l'angle sous lequel serait vu l'objet à l'œil nu placé à une distance $D = 250$ mm. On n'orientera pas les angles. L'objet étant de très petite taille, ces deux angles seront bien sûr très faibles. Exprimer G en fonction de Δ , D , f'_1 et f'_2 , puis calculer sa valeur.

On utilise ce microscope pour mesurer l'épaisseur e d'une mince lame de verre à faces parallèles, d'indice $n = 1,5$. On colle une petite pastille bleue (B) sur la face gauche de la lame et une petite pastille rouge (R) sur sa face droite. On positionne d'abord la lunette (ensemble objectif + oculaire) du microscope de façon à faire la mise au point sur la pastille rouge (Figure 2, Position 1). Puis, grâce à une vis micrométrique, on translate la lunette d'une distance ε , de façon à faire la mise au point sur l'image de la pastille bleue (Figure 2, Position 2) :

La figure ci-dessous montre la position 2 de la vis micrométrique, la position 1 correspondant à la graduation 40 de la partie mobile.

- 7) Déterminer la valeur mesurée de ε en mm, avec une estimation de l'incertitude de mesure.
- 8) En tenant compte du phénomène de réfraction et en considérant les rayons lumineux très peu inclinés par rapport à l'axe optique, exprimer e en fonction de n et ε , puis calculer sa valeur.

Résolution de problème

Exercice 8 : Loupe

★★★
Ref. 0029

L'objet dont on forme l'image, est situé à 8,0 cm de la loupe. Déterminer la distance focale de la loupe.