

Programme de colles n°27

semaine du 18 au 22 mai

Séries numériques

Reprise du programme précédent.

Intégration

Cette semaine : uniquement des exercices pratiques de calculs et majoration d'intégrales (cours de début d'année) En particulier, pas de somme de Riemann ni d'inégalité de Taylor-Lagrange.

- Continuité uniforme. Exemple des fonctions lipschitziennes.
- Théorème de Heine.
- Subdivision d'un segment ; pas d'une subdivision.
- Fonctions en escalier, fonctions continues par morceaux.
- Structure de sous-espace vectoriel et de sous-anneau de l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur un segment.
- Construction de l'intégrale des fonctions continues par morceaux sur un segment par la borne supérieure des intégrales des fonctions en escalier inférieure à la fonction et par la borne inférieure de celles supérieures à la fonction. Interprétation géométrique.
- Sommes de Riemann (et en particulier les sommes de Riemann régulières à gauche/droite) : définition, propriétés.
- Propriétés de l'intégrale : linéarité, croissance, positivité, relation de Chasles.
- Majoration de la valeur absolue d'une intégrale par l'intégrale des valeurs absolue (inégalité triangulaire).
- Si f est continue sur un segment et de signe constant, l'intégrale de f est nulle si et seulement si f est la fonction nulle.
- Soit f une fonction continue, la fonction $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f s'annulant en x_0 . Les primitives diffèrent d'une constante.
- Calculs d'intégrales au moyen de primitives, d'intégrations par parties ou de changements de variables.
- Intégrale d'une fonction paire ou impaire sur un segment centré en 0.
- Intégrale d'une fonction périodique sur un intervalle de période.
- Inégalité de Taylor-Lagrange.
- Extension au cas des fonctions continues par morceaux sur un segment à valeurs complexes. En particulier majoration du module d'une intégrale et inégalité de Taylor-Lagrange.
- $\forall z \in \mathbb{C}, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$.

Reprendre également les calculs pratiques d'intégrales (cours du début d'année)

Les démonstrations suivantes sont à connaître (les autres démonstrations ne sont pas censées être ignorées totalement) :

- Si f est continue sur un segment et de signe constant, l'intégrale de f est nulle si et seulement si f est la fonction nulle.
- Soit f une fonction continue, la fonction $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f s'annulant en x_0 .
- Intégrale d'une fonction continue paire ou impaire sur un segment centré en 0.
- Intégrale d'une fonction continue périodique sur un intervalle de période.
- $\forall z \in \mathbb{C}, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$.