

D.S. N° 6 DE MATHÉMATIQUES

Durée : 4 heures.

Cet énoncé contient 3 exercices extraits de problèmes de concours.
Les calculatrices sont interdites.

11

Exercice 1 (tiré de CCP MATHS PC 2015).

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ un espace probabilisé et, pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, une variable aléatoire S_n qui suit une loi de Poisson de paramètre n : $S_n(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\mathbf{P}(X = k) = e^{-n} \frac{n^k}{k!}$ pour tout entier $k \in \mathbb{N}$.

1) Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n définie sur \mathbb{R}_+ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad f_n(t) = \frac{e^{-t} t^n}{n!}.$$

0,5

a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dresser le tableau des variations de la fonction f_n .

fn dérivable et f'_n(t) = ... , tableau

0,5

b) Déterminer un équivalent de $f_n(n)$ quand n tend vers ∞ .

*~ 1 / sqrt(2*pi*n)*

1

2) Rappeler l'espérance $\mathbf{E}(S_n)$ et la variance $\mathbf{V}(S_n)$ de la variable aléatoire S_n et déterminer celles de la variable aléatoire $S_n^* = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}$.

E(S_n) = n, V(S_n) = n, E(S_n^) = 0, V(S_n^*) = 1*

3) a) Rappeler l'hypothèse et l'expression du reste $R_n(a, b)$ de la formule de Taylor avec reste intégral

0,5

$$f(b) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a) \frac{(b-a)^k}{k!} + R_n(a, b)$$

0,5

pour une fonction f sur un intervalle $[a, b]$.

2

b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbf{P}(S_n^* \leq 0) = 1 - \int_0^n e^{-t} \frac{t^n}{n!} dt$.

Et (S_n^ <= 0) = U disjointe*

P(S_n^ <= 0) = sum_{k=0}^n ...*

1

c) Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

COV

1

$$\mathbf{P}(S_n^* \leq 0) - \mathbf{P}(S_{n+1}^* \leq 0) = \int_n^{n+1} e^{-t} \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} dt - e^{-n} \frac{n^{n+1}}{(n+1)!}.$$

1

d) En déduire que la suite $(\mathbf{P}(S_n^* \leq 0))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

4) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note \mathbf{G}_{S_n} la fonction génératrice de la variable aléatoire S_n .

1

a) Montrer que la fonction \mathbf{G}_{S_n} est définie sur \mathbb{R} et calculer $\mathbf{G}_{S_n}(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

1

b) En déduire que, pour tout $t > 0$, la variable aléatoire $t^{S_n^*}$ admet une espérance et que :

$$\mathbf{E}(t^{S_n^*}) = \frac{\mathbf{G}_{S_n}(t^{1/\sqrt{n}})}{t^{\sqrt{n}}}.$$

1

c) Étudier, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}(t^{S_n^*})$.

19

Exercice 2 (tiré de MINES-PONTS MATHS 2 MPI 2023).

Soit $f(x) = \int_0^{\pi/2} (\sin t)^x dt$.

impropre en 0 si $x < 0 \sim \frac{1}{t^x}$ qui ne change pas de signe
c.v.m. $x > -1$
 $x \leq y \Rightarrow x \ln(\sin t) \geq y \ln(\sin t) \Rightarrow (\sin t)^x \geq (\sin t)^y$
 $\int (\sin t)^x dt > 0$

- 2 1) Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
- 1 2) Étudier le sens de variation de la fonction f .
- 1,5 3) Montrer que la fonction f est strictement positive.
- 1,5 4) Montrer que, pour tout réel $x > -1$,

$(x + 1)f(x) = (x + 2)f(x + 2)$.

- 1 5) Étudier la limite de $f(x)$ quand le réel x tend vers -1 .
- 1 6) Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$f(n)f(n + 1) = \frac{\pi}{2(n + 1)}$. $(n+1) \int (-1)^{n+1} = dt = \frac{\pi}{2}$

- 1 7) Montrer que $f(n) \sim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

- 1 8) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale généralisée $D_n = \int_0^{\pi/2} (\ln(\sin t))^n dt$ est convergente.

- 2 9) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$(-1)^n D_n = \int_0^{+\infty} \frac{u^n}{\sqrt{e^{2u} - 1}} du$. c.v. $u = -\ln(\sin t)$
calcul 1,5

- 1 10) Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, montrer que l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} u^n e^{-u} du$ converge et calculer sa valeur.

- 2 11) Montrer que $(-1)^n D_n - n! = o(n!)$ et en déduire un équivalent de D_n .

- 1 12) Soient $x > -1$ et, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $t \in]0, \frac{\pi}{2}]$,

$f_n(t) = \frac{(\ln(\sin t))^n}{n!} x^n$.

Montrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ et calculer sa somme $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$.

- 3 13) En utilisant un théorème d'intégration terme à terme sur l'intervalle $]0, \frac{\pi}{2}]$, prouver que

$\forall x \in]-1, +1[, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{D_n}{n!} x^n$.

10

Exercice 3 (tiré de CCP MATHS 1 MP 2015).

Soient $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, n un entier naturel non nul et x un réel de $[0, 1]$. On pose le polynôme :

$$B_n(X) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) X^k (1-X)^{n-k}.$$

1.5 1) Soit S_n une variable aléatoire réelle suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$. Montrer que : $S_n(\Omega) = [0, n]$ 0.5

$$B_n(x) - f(x) = \sum_{k=0}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) \mathbf{P}(S_n = k).$$

$\forall k \in [0, n], \mathbf{P}(S_n = k) > 0$ 0.5
calcul 0.5

1.5 2) Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que, pour tout $(u, v) \in [0, 1]^2$:

$$|v - u| < \alpha \implies |f(v) - f(u)| < \varepsilon.$$

f continue sur un segment 0.5
donc uniformément continue 0.5

Soit un tel α . On note désormais I_α et J_α les parties de $\llbracket 0, n \rrbracket$ définies par :

$$k \in I_\alpha \iff \left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \alpha \quad \text{et} \quad k \in J_\alpha \iff \left| \frac{k}{n} - x \right| < \alpha.$$

0.5 3) Montrer que : $\sum_{k \in J_\alpha} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \mathbf{P}(S_n = k) \leq \varepsilon.$

1 4) Montrer que : $\sum_{k \in I_\alpha} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \mathbf{P}(S_n = k) \leq 2 \|f\|_\infty \mathbf{P}\left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \alpha\right).$

0.5 5) Rappeler l'espérance $\mathbf{E}(S_n)$ et la variance $\mathbf{V}(S_n)$ de la variable aléatoire S_n . 0.5

2 6) Prouver que : $\mathbf{P}(|S_n - nx| \geq n\alpha) \leq \frac{1}{4n\alpha^2}.$

Biensymétrie de Chebyshev : hyp et inégalité

2 7) Montrer que :

$$x(1-x) \leq \frac{1}{4} \quad 0.5$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \forall n \geq N, \forall x \in [0, 1], |B_n(x) - f(x)| \leq 2\varepsilon.$$

1 8) Conclure.