

## CORRIGÉ DE LA FEUILLE DE T. D. N° 14

## Couples de variables aléatoires

6 MARS 2025

**Exercice 1.** Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois géométriques de paramètres respectifs  $p_1$  et  $p_2$ . Montrer que la probabilité de l'événement  $(X = Y)$  vaut  $\frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$ .

$X$  et  $Y$  suivent des lois géométriques de paramètres  $p_1$  et  $p_2$ , d'où  $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N}^*$  et :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad P(X = k) = (1 - p_1)^{k-1} p_1 \quad \text{et} \quad P(Y = k) = (1 - p_2)^{k-1} p_2.$$

L'événement  $(X = Y)$  est égal à  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} (X = k \cap Y = k)$  et cette union est disjointe, donc

$$\begin{aligned} P(X = Y) &= \sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k, Y = k) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} p_1 p_2 [(1 - p_1)(1 - p_2)]^{k-1} \quad \text{car les v.a. } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes par hypothèse} \\ &= p_1 p_2 \cdot \frac{1}{1 - [(1 - p_1)(1 - p_2)]} = \frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - p_1 p_2} \end{aligned}$$

**Exercice 2** (Oral Mines Ponts PC 2016). Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $U_1, \dots, U_n$  des urnes. On suppose que l'urne  $U_k$  contient  $k$  boules numérotées de 1 à  $k$ . On choisit une urne au hasard et on pioche une boule de l'urne. On note  $X$  la variable aléatoire donnant le numéro de l'urne,  $Y$  la variable aléatoire donnant le numéro de la boule choisie.

- Déterminer la loi du couple de variables aléatoires  $(X, Y)$  et montrer que l'espérance de  $Y$  vaut  $\frac{n+3}{4}$ .
- Les variables  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?

- L'ensemble des valeurs prises par  $(X, Y)$  est  $(X, Y)(\Omega) = \{(k, i) \in (\mathbb{N}^*)^2, 1 \leq i \leq k \leq n\}$  et, pour  $1 \leq i \leq k \leq n$  :

$$\mathbb{P}(X = k, Y = i) = \mathbb{P}(X = k) \times \mathbb{P}_{(X=k)}(Y = i) = \frac{1}{n} \times \frac{1}{k}$$

car, par équiprobabilité,  $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$  et  $\mathbb{P}_{(X=k)}(Y = i) = \frac{1}{k}$ . On en déduit la loi marginale de  $Y$  : pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $(Y = i) = \bigcup_{k \in \llbracket i, n \rrbracket} (X = k \cap Y = i)$  et cette union est disjointe, d'où

$$\mathbb{P}(Y = i) = \sum_{k=i}^n \mathbb{P}(X = k, Y = i) = \frac{1}{n} \sum_{k=i}^n \frac{1}{k}$$

et la variable aléatoire  $Y$  est d'espérance finie car  $Y(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$  est un ensemble fini  $\triangleright$  **Remarque X.18**. De plus,

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n i \times \mathbb{P}(Y = i) = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \sum_{k=i}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \left( \sum_{i=1}^k \frac{i}{nk} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{nk} \times \frac{k(k+1)}{2} = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n (k+1) = \frac{n+3}{4}.$$

- Si  $n = 1$ , alors les variables aléatoires réelles  $X$  et  $Y$  sont indépendantes. Sinon, elles ne le sont pas car

$$\mathbb{P}(X = n, Y = 1) = \frac{1}{n^2} \quad \text{diffère de} \quad \mathbb{P}(X = n) \times \mathbb{P}(Y = 1) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

**Exercice 3** (d'après Banque PT, 2015 A). Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires à valeurs dans  $\mathbb{N}$ . On suppose que la loi de probabilité du couple  $(X, Y)$  est :

$$P(X = i, Y = j) = \begin{cases} \frac{\lambda^i e^{-\lambda} \alpha^j (1 - \alpha)^{i-j}}{j!(i-j)!} & \text{si } 0 \leq j \leq i \\ 0 & \text{si } 0 \leq i < j \end{cases}$$

où  $\alpha$  et  $\lambda$  sont des constantes fixées telles que  $0 < \alpha < 1$  et  $\lambda > 0$ .

1. Montrer que  $X$  suit une loi de Poisson dont on précisera le paramètre.
2. Montrer que  $Y$  suit une loi de Poisson dont on précisera le paramètre.
3. Montrer que les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.
4. Soit  $Z = X - Y$ . Montrer que la variable aléatoire  $Z$  suit une loi de Poisson dont on précisera le paramètre.
5. Montrer que les variables aléatoires  $Y$  et  $Z$  sont indépendantes.

1.  $X(\Omega) = \mathbb{N}$  et, pour tout  $i \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} P(X = i) &= \sum_{j=0}^i P(X = i, Y = j) \quad \text{car } P(X = i, Y = j) = 0 \text{ si } i < j \\ &= \sum_{j=0}^i \frac{\lambda^i e^{-\lambda} \alpha^j (1 - \alpha)^{i-j}}{j!(i-j)!} \\ &= \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \sum_{j=0}^i \frac{i! \alpha^j (1 - \alpha)^{i-j}}{j!(i-j)!} \\ &= \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \quad \text{car } [\alpha + (1 - \alpha)]^i = 1. \end{aligned}$$

Donc  $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$ .

2.  $Y(\Omega) = \mathbb{N}$  et, pour tout  $j \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} P(Y = j) &= \sum_{i=j}^{\infty} P(X = i, Y = j) \quad \text{car } P(X = i, Y = j) = 0 \text{ si } i < j \\ &= \frac{\alpha^j e^{-\lambda}}{j!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+j} (1 - \alpha)^k}{k!} \\ &= \frac{\alpha^j e^{-\lambda} \lambda^j}{j!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1 - \alpha)]^k}{k!} \\ &= \frac{\alpha^j e^{-\lambda} \lambda^j}{j!} e^{\lambda(1-\alpha)} \\ &= e^{-\alpha\lambda} \frac{(\alpha\lambda)^j}{j!}. \end{aligned}$$

Donc  $Y \hookrightarrow \mathcal{P}(\alpha\lambda)$ .

3. Les v.a.  $X$  et  $Y$  sont indépendantes si, et seulement si,  $\forall i, \forall j, P(X = i, Y = j) = P(X = i) \times P(Y = j)$ . Un contre-exemple suffit pour montrer qu'elles ne sont pas indépendantes, le voici :

$$P(X = 0, Y = 0) = e^{-\lambda} \quad , \quad P(X = 0) = e^{-\lambda} \quad \text{et} \quad P(Y = 0) = e^{-\alpha\lambda},$$

d'où  $P(X = 0, Y = 0) \neq P(X = 0) \times P(Y = 0)$ .

4.  $Z(\Omega) = \mathbb{N}$  et, pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned}
 P(Z = k) &= \sum_{i-j=k} P(X = i, Y = j) \\
 &= \frac{(1-\alpha)^k}{k!} \sum_{i-j=k} \frac{\lambda^i e^{-\lambda} \alpha^j (1-\alpha)^{i-j}}{j!(i-j)!} \\
 &= \frac{(1-\alpha)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{i-j=k} \frac{\lambda^i \alpha^j}{j!} \\
 &= \frac{(1-\alpha)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^{j+k} \alpha^j}{j!} \\
 &= \frac{(1-\alpha)^k \lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda \alpha)^j}{j!} \\
 &= \frac{[(1-\alpha)\lambda]^k}{k!} e^{-(1-\alpha)\lambda}
 \end{aligned}$$

Donc  $Z \hookrightarrow \mathcal{P}((1-\alpha)\lambda)$ .

5. Soit  $(j, k) \in \mathbb{N}^2$  : l'événement  $(Y = j) \cap (Z = k)$  est égal à  $(X = j+k) \cap (Y = j)$ ,

d'où  $P(Y = j, Z = k) = P(X = j+k, Y = j) = \frac{\lambda^{j+k} e^{-\lambda} \alpha^j (1-\alpha)^k}{j!k!}$  par définition de la loi conjointe car  $j \leq j+k$ .

Par ailleurs,  $\begin{cases} P(Y = j) = e^{-\alpha\lambda} \frac{(\alpha\lambda)^j}{j!} & \text{d'après la question 2} \\ P(Z = k) = \frac{[(1-\alpha)\lambda]^k}{k!} e^{-(1-\alpha)\lambda} & \text{d'après la question 4} \end{cases}$

D'où  $P(Y = j, Z = k) = P(Y = j) \times P(Z = k)$  et c'est vrai pour tout  $(j, k) \in \mathbb{N}^2$ , donc les variables aléatoires  $Y$  et  $Z$  sont indépendantes.

#### Exercice 4.

Soient, pour chaque  $n \in \mathbb{N}^*$ , un réel  $p_n \in ]0, 1[$  et une variable aléatoire  $X_n$  telle que  $P(X_n = 1) = p_n$  et  $P(X_n = 0) = 1 - p_n$ . On suppose que ces variables aléatoires sont deux à deux indépendantes.

1. Calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire  $Z_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$  et montrer que cette variance est inférieure ou égale à  $\frac{1}{4n}$ .

2. En déduire que :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{p_1 + \dots + p_n}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

1. Les variables aléatoires  $X_n$  sont bornées et il en est donc de même de la variable aléatoire  $Z_n^2$  qui possède donc une espérance  $\triangleright$  **Remarque X.18**. La v.a.  $Z_n$  possède donc une espérance et une variance  $\triangleright$  **Proposition-définition X.26**. Pour chaque  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ,  $E(X_k) = 0 \times P(X_k = 0) + 1 \times P(X_k = 1) = p_k$  et  $V(X_k) = E(X_k^2) - [E(X_k)]^2 = 0^2 \times P(X_k = 0) + 1^2 \times P(X_k = 1) - [E(X_k)]^2 = p_k - p_k^2 = p_k \cdot (1 - p_k)$ . D'où

$$\begin{aligned}
 E(Z_n) &= \frac{E(X_1) + \dots + E(X_n)}{n} && \text{par linéarité de l'espérance} \\
 &= \frac{p_1 + \dots + p_n}{n}
 \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}
 V(Z_n) &= \frac{V(X_1 + \dots + X_n)}{n^2} \\
 &= \frac{V(X_1) + \dots + V(X_n)}{n^2} && \text{car les v.a. } X_1, \dots, X_n \text{ sont deux à deux indépendantes} \\
 &= \frac{p_1(1-p_1) + \dots + p_n(1-p_n)}{n^2} \\
 &\leq \frac{\frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{4}}{n^2} \\
 &\leq \frac{1}{4n}.
 \end{aligned}$$

2. Soit  $\varepsilon > 0$  : d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,  $P(|Z_n - E(Z_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(Z_n)}{\varepsilon^2}$ , d'où

$$1 \geq 1 - P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{p_1 + \dots + p_n}{n}\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

Donc, d'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{p_1 + \dots + p_n}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

**Exercice 5.** Soient un entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , un réel  $p \in ]0, 1[$  et une variable aléatoire  $X$  qui suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$ . Les valeurs prises par la v.a.  $X$  sont affichées par un compteur un tantinet dérégulé :

- si la v.a.  $X$  prend une valeur non nulle, alors il affiche correctement cette valeur ;
- si la v.a.  $X$  prend la valeur 0, alors il affiche au hasard et de manière équiprobable une valeur de  $\llbracket 1, n \rrbracket$ .

Soit  $Y$  la v.a. prenant la valeur affichée par le compteur.

1. Quelle est la loi de probabilité de  $Y$  ?
2. Montrer que les v.a.  $X$  et  $Y$  sont indépendantes si, et seulement si,  $n = 1$
3. Déterminer l'espérance de  $Y$  et l'espérance de  $XY$ .
4. En déduire la covariance de  $(X, Y)$ . Déterminer, pour chaque  $n \in \mathbb{N}^*$ , les valeurs de  $p \in ]0, 1[$  qui la rendent nulle.

1. Pour connaître la loi marginale de  $Y$ , on peut calculer la loi conjointe du couple  $(X, Y)$ , c'est-à-dire  $P(X = j, Y = k)$  pour chaque  $(j, k) \in \llbracket 0, n \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$ . Pour simplifier, on peut se contenter de calculer d'une part :

$$P(X = 0, Y = k) = P((X = 0) \cap (Y = k)) = P(X = 0) \cdot P_{(X=0)}(Y = k) = (1-p)^n \cdot \frac{1}{n}$$

d'après la formule des probabilités composées. Et de remarquer d'autre part que l'événement  $(X \neq 0) \cap (Y = k)$  est égal à  $(X = k)$ , d'où :

$$P((X \neq 0) \cap (Y = k)) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

car  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ . Enfin l'événement  $(Y = k)$  est l'union disjointe des événements  $(X = 0) \cap (Y = k)$  et  $(X \neq 0) \cap (Y = k)$ , donc :

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P(Y = k) &= P((X = 0) \cap (Y = k)) + P((X \neq 0) \cap (Y = k)) \\ &= (1-p)^n \cdot \frac{1}{n} + \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

2. Si  $n \geq 2$ , alors on veut montrer que :

$$\exists (j, k) \in \llbracket 0, n \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P(X = i, Y = j) \neq P(X = i) \cdot P(Y = j).$$

Effectivement :  $P(X = n, Y = 1) = 0$  (car l'événement est impossible) tandis que ni  $P(X = n)$  ni  $P(Y = 0)$  n'est nul. Donc les v.a.  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.

Par contre, si  $n = 1$ , alors on vérifie d'une part que :

$$1 - p = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0) \cdot P(Y = 0) \text{ car } P(X = 0) = 1 - p \text{ et } P(Y = 1) = 1.$$

Et d'autre part que :

$$p = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) \cdot P(Y = 1) \text{ car } P(X = 1) = p \text{ et } P(Y = 1) = 1.$$

3. La v.a.  $Y$  possède une espérance car  $Y(\Omega)$  est fini :

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{k=1}^n k P(Y = k) \\ &= \sum_{k=1}^n k (1-p)^n \cdot \frac{1}{n} + \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (1-p)^n \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{car le terme } k = 0 \text{ ne contribue pas à la somme} \\ &= \frac{n+1}{2} \cdot (1-p)^n + E(X) \quad \text{car la deuxième somme est l'espérance de } X \\ &= \frac{n+1}{2} \cdot (1-p)^n + np \quad \text{car } X \text{ suit une loi binomiale.} \end{aligned}$$

De même, la v.a.  $XY$  possède une espérance car  $XY(\Omega)$  est fini :

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \sum_{j=0}^n \sum_{k=1}^n jkP(X=j, Y=k) \\
 &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n jkP(X=j, Y=k) \quad \text{car le terme } j=0 \text{ ne contribue pas à la somme} \\
 &= \sum_{k=1}^n k^2 P(X=k) \quad \text{car, pour tout } j \neq 0, (X=j) \cap (Y=k) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } j \neq k \\ (X=k) & \text{si } j = k \end{cases} \\
 &= \sum_{k=0}^n k^2 P(X=k) \quad \text{car le terme } k=0 \text{ ne contribue pas à la somme} \\
 &= E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2 = np(1-p) + (np)^2 \quad \text{car } X \text{ suit une loi binomiale.}
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\
 &= V(X) + [E(X)]^2 - E(X) \cdot \left[ \frac{n+1}{2} \cdot (1-p)^n + E(X) \right] \\
 &= np(1-p) - np \frac{n+1}{2} \cdot (1-p)^n.
 \end{aligned}$$

Si  $n = 1$ , alors les v.a. sont indépendantes, ce qui implique qu'elles sont décorrélées  $\triangleright$  **Théorème XV.11**. Donc  $\text{Cov}(X, Y) = 0$  pour tout  $p \in ]0, 1[$ . L'expression de la covariance trouvée à la question précédente le confirme.

Si  $n > 1$ , alors les v.a.  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes mais ça n'implique pas qu'elles sont décorrélées :

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \iff 1-p = \exp \frac{\ln(2) - \ln(n+1)}{n-1} \quad \text{qui est bien dans } ]0, 1[.$$