

CORRIGÉ DU T.D. N° 1

Suites & séries numériques

4 septembre 2025

Exercice 1. Les séries suivantes sont-elles convergentes ou divergentes?

- | | |
|--|--|
| 1. $\sum \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ | 6. $\sum \frac{1}{\ln(n!)}$ |
| 2. $\sum \frac{1}{n \cdot n^{1/n}}$ | 7. $\sum e^{-\sqrt{\ln n}}$ |
| 3. $\sum \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ | 8. $\sum \frac{n}{(\ln n)^n}$ |
| 4. $\sum \frac{n^{100}}{e^n}$ | 9. $\sum \left(\frac{1}{n} - 1\right)^n$ |
| 5. $\sum \frac{1}{n \ln(n)}$ | 10. $\sum \left(n \sin \frac{1}{n}\right)^n$ |
| | 11. $\sum \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$ |

Exercice 2 (*Discuter suivant les valeurs d'un paramètre*). Pour quelles valeurs du réel a la série $\sum \frac{a^n}{n + a^{2n}}$ est-elle convergente?Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{a^n}{n + a^{2n}}$. On disjoint les cas :

- si $|a| > 1$, alors $|u_n| \sim \frac{|a|^n}{a^{2n}} \sim \left(\frac{1}{|a|}\right)^n$. Or la série géométrique $\sum \left(\frac{1}{|a|}\right)^n$ converge, donc la série $\sum u_n$ converge absolument.
- si $|a| < 1$, alors $|u_n| \sim \frac{|a|^n}{n} \leq |a|^n$. Or la série géométrique $\sum |a|^n$ converge, donc la série $\sum u_n$ converge absolument.
- si $a = 1$, alors $u_n = \frac{1}{n+1}$ et la série harmonique $\sum \frac{1}{n+1}$ diverge.
- si $a = -1$, alors $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ et la série harmonique alternée $\sum \frac{(-1)^n}{n+1}$ converge.

Exercice 3 (*Séries géométriques*). 1. Calculer $\int_0^1 t^{2k} dt$ et $\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k}$.2. Montrer que la série $\sum \frac{(-1)^k}{2k+1}$ converge et montrer que $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$.3. De même, après avoir décomposé en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{(4x+1)(4x+3)}$, montrer que la série $\sum \frac{1}{(4n+1)(4n+3)}$ converge et que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(4n+1)(4n+3)} = \frac{\pi}{8}$.1. $\int_0^1 t^{2k} dt = \left[\frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right]_0^1 = \frac{1}{2k+1}$ et, en reconnaissant une somme géométrique :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} = \sum_{k=0}^n (-t^2)^k = \frac{1 - (-t^2)^{n+1}}{1 - (-t^2)} = \frac{1 + (-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1 + t^2}.$$

2. On peut affirmer, grâce au théorème des séries alternées, que la série $\sum \frac{(-1)^k}{2k+1}$ converge car la suite $\frac{1}{2k+1}$ tend vers zéro en décroissant.

(Mais cela ne donne pas la valeur de la limite.) Autre méthode, on calcule la somme partielle $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$ grâce à la question

précédente : $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 t^{2k} dt = \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} \right) dt$ par linéarité de l'intégrale. D'où

$$S_n = \int_0^1 \frac{1 + (-1)^n t^{2n+2}}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

Puis on montre que la dernière intégrale tend vers 0 quand n tend vers ∞ :

$$\forall t \in [0, 1], 0 \leq \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} \leq t^{2n+2}, \text{ d'où } 0 \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \frac{1}{2n+3} \text{ par croissance de l'intégrale.}$$

D'après le théorème des gendarmes, quand n tend vers l'infini, la suite des réels $\int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$ tend vers zéro et aussi le produit $(-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$ car la suite des réels $(-1)^n$ est bornée.

D'où la suite des réels $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$ tend vers $\int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = [\arctan t]_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

Donc la série $\sum \frac{(-1)^k}{2k+1}$ converge et sa somme vaut $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$.

3. $\frac{1}{(4n+1)(4n+3)} \sim \frac{1}{16n^2}$ d'où (par comparaison de séries à termes positifs) la série $\sum \frac{1}{(4n+1)(4n+3)}$ converge.
4. On commence par décomposer la fraction. On cherche α et β tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{4}, -\frac{3}{4} \right\}, \quad \frac{1}{(4x+1)(4x+3)} = \frac{\alpha}{4x+1} + \frac{\beta}{4x+3}.$$

En multipliant l'égalité par $4x+1$ et en prenant $x = -\frac{1}{4}$, on trouve $\alpha = \frac{1}{2}$. De même, en multipliant l'égalité par $4x+3$ et en prenant $x = -\frac{3}{4}$, on trouve $\beta = -\frac{1}{2}$.

Pour calculer la somme de la série, on étudie la limite des sommes partielles :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{1}{(4k+1)(4k+3)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4k+1} - \frac{1}{4k+3} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \int_0^1 (x^{4k} - x^{4k+2}) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2) \sum_{k=0}^n (x^4)^k dx. \end{aligned}$$

Or $(1-x^2) \sum_{k=0}^n (x^4)^k = (1-x^2) \frac{1-x^{4n+4}}{1-x^4}$ pour tout $x \in [0, 1[$. D'où $(1-x^2) \sum_{k=0}^n (x^4)^k = \frac{1-x^{4n+4}}{1+x^2}$ et on constate que cette formule reste vraie si $x = 1$. D'où

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{(4k+1)(4k+3)} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^{4n+4}}{1+x^2} dx.$$

$$\text{Or } 0 \leq \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^{4n+4}}{1+x^2} dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 x^{4n+4} dx \leq \frac{1}{2(4n+5)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{D'où } \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(4k+1)(4k+3)} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} [\arctan(1) - \arctan(0)] = \frac{\pi}{8}.$$

Exercice 4 (Télescope et D.L.). 1. Montrer que la série $\sum \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} \right)$ converge et calculer sa somme

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} \right).$$

2. Soit $u_n = \sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2}$. Montrer qu'il existe des réels a et b uniques tels que la série $\sum u_n$ soit convergente. Calculer alors sa somme $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$.

1. **Première méthode : avec un DL de la suite, on va trouver la nature mais pas la somme de la série.** Les trois termes de la somme $\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}}$ ont pour terme dominant $\frac{1}{\sqrt{n}}$, qu'on met en facteur pour calculer un D.L. :

$$\frac{1}{\sqrt{n-1}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot (1+u)^\alpha \text{ avec } u = -\frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ et } \alpha = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{D'où } \frac{1}{\sqrt{n-1}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2n} + \frac{3}{8n^2} + \frac{1}{n^2} \varepsilon_n\right) = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n\sqrt{n}} + \frac{3}{8n^2\sqrt{n}} + \frac{1}{n^2\sqrt{n}} \varepsilon_n.$$

$$\text{De même, } \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{3}{8n^2} + \frac{1}{n^2} \varepsilon_n\right) = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n\sqrt{n}} + \frac{3}{8n^2\sqrt{n}} + \frac{1}{n^2\sqrt{n}} \varepsilon_n.$$

Donc $\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} = \frac{3}{4n^2\sqrt{n}} + \frac{1}{n^2\sqrt{n}} \varepsilon_n \sim \frac{3}{4n^{5/2}}$ qui ne change pas de signe. D'où la série $\sum \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}}\right)$ est de même nature que la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{5/2}}$, donc convergente.

Deuxième méthode, meilleure : grâce à un télescope, on va trouver la nature et la somme de la série. Pour tout $N \geq 2$, $\sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}} - \frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{2}{\sqrt{4}}\right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{N-1}} + \frac{1}{\sqrt{N+1}} - \frac{2}{\sqrt{N}}\right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{N+1}} - \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}.$ Donc la série $\sum \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}}\right)$ converge et sa somme vaut $1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$.

2. **D'abord, avec un DL, on détermine la nature de la série :** $u_n = \sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2} = \sqrt{n} + a\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{1}{n}} + b\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{2}{n}} = \sqrt{n} + a\sqrt{n}\left(1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + \frac{1}{n^2} \varepsilon_n\right) + b\sqrt{n}\left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{n^2} \varepsilon_n\right).$

$$\text{On ordonne les termes : } u_n = (1+a+b)\sqrt{n} + \left(\frac{a}{2} + b\right)\frac{1}{\sqrt{n}} - \left(\frac{a}{8} + \frac{b}{2}\right)\frac{1}{n^{3/2}} + \frac{1}{n^{3/2}} \varepsilon_n.$$

On discute :

- si $1+a+b \neq 0$, alors $u_n \sim (1+a+b)\sqrt{n}$ qui ne change pas de signe, or la série $\sum \sqrt{n}$ diverge grossièrement, donc la série $\sum u_n$ aussi ;
- si $a+b = -1$ et $\frac{a}{2} + b \neq 0$, alors $u_n \sim \left(\frac{a}{2} + b\right)\frac{1}{\sqrt{n}}$ qui ne change pas de signe, or la série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge (Riemann avec $\alpha = \frac{1}{2}$), donc la série $\sum u_n$ aussi ;
- si $a+b = -1$ et $b = -\frac{a}{2}$, alors $a = -2$ et $b = 1$, d'où $u_n \sim -\left(\frac{-2}{8} + \frac{1}{2}\right)\frac{1}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{3/2}}$ qui ne change pas de signe, or la série $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ est une série de Riemann convergente, donc la série $\sum u_n$ converge.

Finalement : la série converge si, et seulement si, $a = -2$ et $b = 1$.

Ensuite, grâce à un télescope, on calcule la somme de la série, dans le cas où elle converge : pour tout $N \geq 0$, $\sum_{n=0}^N u_n = \left(\sqrt{0} - 2\sqrt{1} + \sqrt{2}\right) + \left(\sqrt{1} - 2\sqrt{2} + \sqrt{3}\right) + \left(\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + \sqrt{4}\right) + \dots + \left(\sqrt{N} - 2\sqrt{N+1} + \sqrt{N+2}\right) = -1 - \sqrt{N+1} + \sqrt{N+2}.$ Or $\sqrt{N+2} - \sqrt{N+1} = \frac{1}{\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1}} \rightarrow 0.$ Donc $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = -1.$

Exercice 5 (Discuter suivant les valeurs d'un paramètre). Pour quelles valeurs du réel $a \neq 0$ la série $\sum \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n}$ est-elle convergente ?

Soit $u_n = \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n}$. Si $a < 0$, alors la suite u_n ne tend pas vers zéro, donc la série $\sum u_n$ diverge.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n} = \frac{(-1)^n}{n^a} - \frac{1}{n^{2a}}(1 + \varepsilon_n).$$

Or la série $\sum \frac{(-1)^n}{n^a}$ converge d'après le TSA car la suite $\frac{1}{n^a}$ tend vers zéro en décroissant. Et les séries $\sum \frac{1}{n^{2a}}(1 + \varepsilon_n)$ et $\sum \frac{1}{n^{2a}}$ sont de même nature car $\frac{1}{n^{2a}}$ ne change pas de signe, donc convergent si, et seulement si, $2a > 1$.

Donc la série $\sum u_n$ converge si, et seulement si, $a > \frac{1}{2}$.

Exercice 6 (Convergence non absolue). Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que la série $\sum u_n$ converge mais la série $\sum |u_n|$ diverge. Soient P_n et M_n les suites définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P_n = \max(0, u_n) \quad \text{et} \quad M_n = \min(0, u_n).$$

Montrer que les séries $\sum P_n$ et $\sum M_n$ divergent.

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, $u_n = P_n + M_n$. Or la série $\sum u_n$ converge, d'où les séries $\sum P_n$ et $\sum M_n$ sont de même nature.

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| = P_n - M_n$. Or la série $\sum |u_n|$ diverge, d'où les séries $\sum P_n$ et $\sum M_n$ divergent.

Exercice 7 (La fonction zêta de Riemann).




FIGURE 1 – LA FONCTION ζ DE RIEMANN.

1. Soit

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}.$$

Montrer que l'ensemble de définition de la fonction ζ est l'intervalle $I =]1, +\infty[$.

2. Montrer que la fonction ζ est décroissante sur l'intervalle I .

3. Montrer que, pour tout $x \in I$, $1 + \frac{1}{(x-1)2^{x-1}} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$.

4. Etudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x)$. Proposer un équivalent de $\zeta(x)$ quand x tend vers 1^+ .

1. Le réel $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ est défini si, et seulement si, la série $\sum \frac{1}{n^x}$ converge. C'est le cas si, et seulement si, $x > 1$ d'après le critère de Riemann.

2. Soient deux réels a et b tels que $1 < a \leq b$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^a} \geq \frac{1}{n^b}$, d'où $\zeta(a) \geq \zeta(b)$. Donc la fonction ζ est décroissante sur I .

3. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^x} = e^{-x \ln t}$ est décroissante et continue. D'où (en comparant série et intégrale) :

$$\left[\frac{t^{-x+1}}{-x+1} \right]_2^{N+1} = \int_2^{N+1} \frac{1}{t^x} dt \leq \sum_{n=2}^N \frac{1}{n^x} \leq \int_1^N \frac{1}{t^x} dt = \left[\frac{t^{-x+1}}{-x+1} \right]_1^N.$$

Et les inégalités larges passent à la limite $N \rightarrow \infty$ ($\triangle$ ce n'est pas le théorème des gendarmes qu'on utilise) :

$$\frac{1}{(x-1)2^{x-1}} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{x-1}.$$

Enfin, on ajoute 1 à chaque membre :

$$1 + \frac{1}{(x-1)2^{x-1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \leq 1 + \frac{1}{x-1}.$$

4. En $+\infty$, on utilise le théorème des gendarmes : $\frac{1}{(x-1)2^{x-1}}$ et $\frac{1}{x-1}$ tendent vers 0 quand x tend vers $+\infty$, donc $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Quand x tend vers 1^+ , $\frac{1}{(x-1)2^{x-1}}$ tend vers $+\infty$. Donc $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$. Plus précisément, quand x tend vers 1^+ : $\zeta(x) \sim \frac{1}{x-1}$. Pour le prouver, on divise par $\frac{1}{x-1}$ chaque membre de l'encadrement :

$$(x-1) + \frac{1}{2^{x-1}} \leq \frac{\zeta(x)}{\frac{1}{x-1}} \leq (x-1) + 1$$

Les deux gendarmes tendent vers 1 quand x tend vers 1^+ , d'où $\frac{\zeta(x)}{\frac{1}{x-1}} \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 1$.

Exercice 8 (Série télescopique, comparaison série-intégrale & théorème de sommation des équivalents). Soit la suite (u_n) définie, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, par

$$u_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} + \cdots + \frac{1}{4n-1} = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{2k+1}.$$

1. Montrer que $u_{n+1} - u_n \sim \frac{1}{32n^3}$. En déduire que la suite (u_n) converge.
2. Montrer que sa limite vaut $\ell = \frac{\ln(2)}{2}$.
3. Montrer que $\ell - u_n \sim \frac{1}{64n^2}$.

1. $u_n = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{2k+1}$, d'où : $u_{n+1} = \sum_{k=n+1}^{2(n+1)-1} \frac{1}{2k+1} = \frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+5} + \cdots + \frac{1}{4n-1} + \frac{1}{4n+1} + \frac{1}{4n+3}$ et

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{4n+1} + \frac{1}{4n+3} - \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{(4n+1)(4n+3)(2n+1)}$$

après calcul pour tout mettre sur le même dénominateur. Donc $u_{n+1} - u_n \sim \frac{1}{32n^3}$.

La série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ est de même nature que la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^3}$, donc convergente.

Or $u_n = u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (u_{k+1} - u_k)$ (c'est une somme télescopique), donc la suite (u_n) converge.

2. La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2x+1}$ est continue et décroissante sur $[n; 2n]$, d'où (en comparant série et intégrale, voir figure) :




FIGURE 2 – COMPARAISON SÉRIE-INTÉGRALE.

$$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{4n+1}{2n+1} \right) = \int_n^{2n} \frac{1}{2x+1} dx \leq u_n \leq \int_{n-1}^{2n-1} \frac{1}{2x+1} dx = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{4n-1}{2n-1} \right).$$

Les deux gendarmes convergent et ont la même limite $\frac{1}{2} \ln 2$, donc u_n converge et sa limite vaut $\frac{1}{2} \ln 2$.

3. $u_n = \sum_{k=1}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) + u_1$, d'où $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sum_{k=1}^{\infty} (u_{k+1} - u_k) + u_1$, donc $\ell - u_n = \sum_{k=n}^{\infty} (u_{k+1} - u_k)$ est le reste de la série convergente

$\sum (u_{k+1} - u_k)$. Or $u_{k+1} - u_k \sim \frac{1}{32k^3}$, d'où $\ell - u_n \sim \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{32k^3}$ d'après le théorème de sommation des $\sim$.

Or, en comparant série et intégrale, on obtient l'encadrement $\frac{1}{2n^2} \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2(n-1)^2}$, d'où $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^3} \sim \frac{1}{2n^2}$, donc $\ell - u_n \sim \frac{1}{64n^2}$.

Exercice 9 (Série télescopique & théorème de sommation des équivalents). Soit la suite définie par $u_0 \in]0, 1]$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin u_n$.

1. Montrer que la suite (u_n) est convergente et que sa limite est nulle.
2. Étudier la limite de $\frac{u_{n+1}-u_n}{u_n^3}$. En déduire la nature de la série de terme général u_n^3 .
3. En étudiant $\ln(\frac{u_{n+1}}{u_n})$, montrer que la série de terme général u_n^2 diverge.
4. À l'aide d'un D.L., déterminer un réel α tel que $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$ converge vers une limite non nulle. En déduire un équivalent de u_n .

1. Par récurrence, $u_n \in]0, 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. D'une part, la suite (u_n) est donc minorée (par 0). D'autre part, elle est décroissante : $u_{n+1} = \sin u_n \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ car $\sin x \leq x$ pour tout $x \geq 0$. La suite (u_n) est donc convergente car décroissante et minorée. Soit $\ell \in \mathbb{R}$ sa limite.

La fonction $\sin$ est continue, donc ℓ est un point fixe : $\ell = \sin \ell$. Or 0 est l'unique point fixe de la fonction $\sin$ (pour le prouver, étudier la fonction $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x - \sin x$). La suite (u_n) tend donc vers 0.

2. Un développement limité fournit $\frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{3!} + o(1)$ donc $\frac{u_{n+1}-u_n}{u_n^3} \rightarrow -\frac{1}{6}$ quand $n \rightarrow \infty$, car $u_n \rightarrow 0$.

On en déduit l'équivalence $u_n^3 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -6(u_{n+1} - u_n)$ qui ne change pas de signe. Or la série télescopique $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge car la suite (u_n) converge. Donc la série de terme général u_n^3 converge aussi.

3. $\ln(\frac{u_{n+1}}{u_n}) = \ln(\frac{\sin u_n}{u_n}) \sim \frac{\sin u_n}{u_n} - 1 = \frac{\sin u_n - u_n}{u_n} \sim -\frac{1}{6}u_n^2$ qui ne change pas de signe. La série de terme général u_n^2 a la même nature que la série de terme général $\ln(\frac{u_{n+1}}{u_n}) = \ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$. Celle-ci est télescopique et a donc la même nature que la suite $(\ln u_n)$ qui diverge car $\ln(u_n) \rightarrow -\infty$ car u_n tend vers 0..

4. De $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, on déduit le D.L. $u_{n+1} = \sin u_n = u_n - \frac{u_n^3}{3!} + o(u_n^3) = u_n \cdot \left(1 - \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2)\right)$. Par suite $u_{n+1}^\alpha = u_n^\alpha \cdot \left(1 - \alpha \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2)\right)$. (À noter que u_n^α est bien défini car $u_n > 0$.) Donc $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha = -\alpha \frac{u_n^{2+\alpha}}{6} + o(u_n^{2+\alpha})$ tend vers une limite finie et non nulle si $\alpha = -2$. Cette limite vaut $\frac{1}{3}$.

On a montré que $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$ est équivalent à $\frac{1}{3}$, qui ne change pas de signe. Or la série $\sum \frac{1}{3}$ diverge, donc les sommes partielles sont équivalentes (d'après le théorème de sommation des équivalents) : $\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1}^{-2} - u_k^{-2}) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{n}{3}$. Cette somme est télescopique, d'où $u_n^{-2} - u_0^{-2} \sim \frac{n}{3}$. En divisant par n , $\frac{u_n^{-2}}{n}$ tend vers $\frac{1}{3}$. Or u_n est positif, d'où $\frac{u_n^{-1}}{\sqrt{n}}$ tend vers $\frac{1}{\sqrt{3}}$. Donc $u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Exercice 10 (Formule de Stirling). Montrer que la série $\sum (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ est convergente et que, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=1}^{2p+1} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 2 \ln u_p, \text{ où } u_p = \frac{(2p+1)!}{2^{2p} p!^2 \sqrt{2p+2}}.$$

En utilisant la formule de Stirling, déterminer un équivalent de u_p et en déduire que $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln 2 - \ln \pi$.

La suite $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ tend vers 0 en décroissant, donc la série $\sum (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ converge d'après le TSA. En séparant les termes positifs et négatifs :

$$\sum_{n=1}^{2p+1} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \sum_{q=1}^p \ln\left(\frac{2q+1}{2q}\right) - \sum_{q=0}^p \ln\left(\frac{2q+2}{2q+1}\right) = \ln\left(\frac{3^2 \times 5^2 \times \dots \times (2p+1)^2}{2^2 \times 4^2 \times \dots \times (2p)^2 \times (2p+2)}\right) = 2 \ln u_p$$

$$\text{en notant } u_p = \frac{3 \times 5 \times \dots \times (2p+1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2p) \times \sqrt{2p+2}} = \frac{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \dots \times (2p) \times (2p+1)}{[2 \times 4 \times \dots \times (2p)]^2 \times \sqrt{2p+2}} = \frac{(2p+1)!}{p!^2 \cdot 2^{2p} \cdot \sqrt{2p+2}}.$$

En utilisant la formule de Stirling $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$:

$$u_p \sim \frac{(2p+1)^{2p+1} \sqrt{2\pi(2p+1)}}{e^{2p+1}} \times \left(\frac{e^p}{p^p \sqrt{2\pi p}}\right)^2 \times \frac{1}{2^{2p} \sqrt{2p+2}} \sim \frac{2}{e\sqrt{2\pi}} \times \left(\frac{2p+1}{2p}\right)^{2p+1}.$$

On lève la forme indéterminée : $\left(\frac{2p+1}{2p}\right)^{2p+1} = e^{(2p+1)\ln\left(1+\frac{1}{2p}\right)} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} e$. D'où $u_p \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{2\pi}}$. D'où $\sum_{n=1}^{2p+1} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 2 \ln u_p \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \ln 2 - \ln \pi$.

Donc $\sum_{n=1}^{2p+1} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \ln 2 - \ln \pi$. C'est la limite de la sous-suite des sommes partielles de rang impair. Or la suite des sommes partielles converge car on a montré que la série converge. D'où la suite des sommes partielles tend vers $\ln 2 - \ln \pi$. Donc $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln 2 - \ln \pi$.