

## FEUILLE DE T.D. N° 18

Fonctions de deux variables

**Exercice 1.** Les fonctions suivantes définies par

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + 2y^2} , \quad g(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4} , \quad h(x, y) = \frac{x^3 + y^4}{|x| + y^2}$$

pour tout  $(x, y) \neq (0, 0)$  et par  $f(0, 0) = g(0, 0) = h(0, 0) = 0$  sont-elles continues en  $(0, 0)$  ?**Exercice 2.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par  $f(x, y) = \frac{y^4}{x^2 + y^2}$  pour tout  $(x, y) \neq (0, 0)$  et  $f(0, 0) = 0$ . Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .**Exercice 3.** Soit  $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|}$  pour tout  $(x, y) \neq (0, 0)$  et  $f(0, 0) = 0$ . Montrer que la fonction  $f$  est continue en  $(0, 0)$ , que  $\partial_1 f(0, 0)$  existe mais que  $\partial_1 f$  n'est pas continue en  $(0, 0)$ .**Exercice 4** (Dériver suivant un vecteur). Soient un ouvert  $U$  de  $\mathbb{R}^2$ , un point  $a = (a_1, a_2) \in U$  et un vecteur  $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ . On dit qu'une fonction  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  est **dérivable en le point  $a$  suivant le vecteur  $v$**  si la limite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

existe et est finie. On note alors  $D_v f(a)$  cette limite et on l'appelle la dérivée de  $f$  en  $a$  suivant  $v$ .

1. Montrer que : si  $f$  est dérivable en  $a$  suivant tout vecteur  $v$ , alors  $f$  admet des dérivées partielles en  $a$ .
2. Soit  $g(x, y) = \frac{x^2 \cdot y}{x^4 + y^2}$  si  $(x, y) \neq (0, 0)$  et  $g(0, 0) = 0$ .
  - (a) Montrer que la fonction  $g$  n'est pas continue en  $(0, 0)$ .
  - (b) Montrer que  $g$  est dérivable en  $(0, 0)$  suivant tout vecteur  $(x, y)$ .
3. Montrer que : si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$ , alors  $f$  est dérivable en tout point  $a \in U$  suivant tout vecteur  $v$  et exprimer  $D_v f(a)$  à l'aide des dérivées partielles de  $f$  en  $a$ .

La réciproque est-elle vraie ?

**Exercice 5.** Soit  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ .

1. Soit la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto \varphi(x^2 + y^2)$ .

Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et calculer  $x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x}$ . Interpréter géométriquement le résultat.

2. Soit la fonction  $g : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto \varphi(\frac{y}{x})$ .

Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et calculer  $x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y}$ . Interpréter géométriquement le résultat.

**Exercice 6.** On dit qu'une fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x = (x_1, x_2) \mapsto f(x)$  est **homogène de degré  $\alpha \in \mathbb{R}$**  si

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, \forall x \in \mathbb{R}^2, \quad f(tx) = t^\alpha f(x).$$

Montrer que, si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et homogène de degré  $\alpha$ , alors

1. les dérivées partielles  $\partial_1 f$  et  $\partial_2 f$  sont homogènes de degré  $\alpha - 1$  ;
2. pour tout  $x \in \mathbb{R}^2$ ,  $x_1 \partial_1 f(x) + x_2 \partial_2 f(x) = \alpha f(x)$ .

**Exercice 7** (Une équation aux dérivées partielles). En passant en coordonnées polaires, déterminer toutes les fonctions  $f$  de  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  vers  $\mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telles que :

$$\forall (x, y) \neq (0, 0), \quad x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = 0.$$

**Exercice 8.** 1. Déterminer le(s) point(s) critique(s) de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y.$$

En chaque point critique, préciser s'il y a un extremum local, si c'est un minimum ou un maximum et s'il est global.

2. Déterminer l'ensemble de définition de

$$f(x, y) = x \ln^2 x + xy^2.$$

Étudier les points critiques de la fonction  $f$ , ses extrema locaux et ses extrema globaux.

**Exercice 9.** Déterminer tous les extrema locaux de la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \sin(xy).$$

Pour chacun d'entre eux, préciser si c'est un minimum ou un maximum et s'il est global.

**Exercice 10.** On souhaite déterminer les fonctions  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , de classe  $\mathcal{C}^1$ , vérifiant l'équation suivante :

$$\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x + t, y + t) = f(x, y) \quad (\star)$$

1. Démontrer que, si  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  vérifie  $(\star)$ , alors :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

2. Résoudre l'équation aux dérivées partielles précédente et en déduire l'ensemble des solutions de  $(\star)$ .