

## CORRIGÉ DE LA FEUILLE DE T.D. N° 18

Fonctions de deux variables

6 février 2026

**Exercice 1.** Les fonctions suivantes définies par

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + 2y^2} , \quad g(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4} , \quad h(x, y) = \frac{x^3 + y^4}{|x| + y^2}$$

pour tout  $(x, y) \neq (0, 0)$  et par  $f(0, 0) = g(0, 0) = h(0, 0) = 0$  sont-elles continues en  $(0, 0)$  ?**Exercice 2.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par  $f(x, y) = \frac{y^4}{x^2 + y^2}$  pour tout  $(x, y) \neq (0, 0)$  et  $f(0, 0) = 0$ . Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

- En chaque point  $(x, y) \neq (0, 0)$ , les deux dérivées partielles

$$\partial_1 f(x, y) = \frac{-2xy^4}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \partial_2 f(x, y) = \frac{4y^3x^2 + 2y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

existent (car  $f$  est un quotient de fonctions dérивables dont le dénominateur ne s'annule pas) et sont continues (car les fonctions  $\partial_1 f$  et  $\partial_2 f$  sont des quotients de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas).

- En  $(0, 0)$ , la dérivée partielle  $\partial_1 f$  existe et vaut 0 car

$$\frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{0 - 0}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} 0.$$

Et la fonction  $\partial_1 f$  est continue en  $(0, 0)$  car  $\partial_1 f(x, y) \xrightarrow[(x, y) \rightarrow (0, 0)]{} 0 = \partial_1 f(0, 0)$ . En effet :

$$0 \leq |\partial_1 f(x, y)| \leq \frac{2|x| \cdot |y|^4}{(x^2 + y^2)^2} \leq 2 \frac{\|(x, y)\|^5}{\|(x, y)\|^4} \leq 2\|(x, y)\|$$

car  $|x| = \sqrt{y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\|$  et  $|y| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\|$ . D'où  $\partial_1 f(x, y) \xrightarrow[(x, y) \rightarrow (0, 0)]{} 0$  d'après le théorème des gendarmes.

- De même,  $\partial_2 f(0, 0)$  existe et vaut 0 car

$$\frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \frac{k^2 - 0}{k} = k \xrightarrow[k \rightarrow 0]{} 0$$

Et la fonction  $\partial_2 f$  est continue en  $(0, 0)$  car  $\partial_2 f(x, y) \xrightarrow[(x, y) \rightarrow (0, 0)]{} 0 = \partial_2 f(0, 0)$ . En effet

$$0 \leq |\partial_2 f(x, y)| \leq \frac{4|y|^3|x|^2 + 2|y|^5}{(x^2 + y^2)^2} \leq 6\|(x, y)\|$$

Donc la fonction  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

**Exercice 3.** Soit  $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|}$  pour tout  $(x, y) \neq (0, 0)$  et  $f(0, 0) = 0$ . Montrer que la fonction  $f$  est continue en  $(0, 0)$ , que  $\partial_1 f(0, 0)$  existe mais que  $\partial_1 f$  n'est pas continue en  $(0, 0)$ .

$|\sin(u)| \leq |u|$  pour tout  $u \in \mathbb{R}$ , d'où  $|f(x, y)| \leq \frac{|xy|}{|x| + |y|}$ . Or  $|xy| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x^2 + y^2} \leq \|(x, y)\|^2$ . Et  $(|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|xy| \geq x^2 + y^2$ , d'où  $|x| + |y| \geq \|(x, y)\|$ . Donc

$$0 \leq |f(x, y)| \leq \frac{|xy|}{|x| + |y|} \leq \frac{\|(x, y)\|^2}{\|(x, y)\|} \leq \|(x, y)\| \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0.$$

D'où (gendarmes) :  $f(x, y) \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$ . Or  $f(0, 0) = 0$  par définition. Donc  $f$  est continue en  $(0, 0)$ .

$$\frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{\frac{\sin(h \cdot 0)}{|h|+0} - 0}{h} = 0 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0, \text{ donc } \partial_1 f(0, 0) \text{ existe et } \partial_1 f(0, 0) = 0.$$

Soient  $x > 0$  et  $y > 0$  : alors  $|x| = x$ ,  $|y| = y$ , d'où  $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{x+y}$  et  $\partial_1 f(x, y) = \frac{y \cos(xy)(x+y) - \sin(xy)}{(x+y)^2}$ .

En particulier,  $\partial_1 f(x, x) = \frac{2x^2 \cos(x^2) - \sin(x^2)}{(2x)^2} = \frac{2x^2(1 + \varepsilon(x)) - (x^2 + x^2 \varepsilon(x))}{(2x)^2} = \frac{x^2 + x^2 \varepsilon(x)}{4x^2} = \frac{1}{4} + \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{4}$ . Or  $\frac{1}{4} \neq \partial_1 f(0, 0)$ . D'où la fonction  $\partial_1 f$  n'est pas continue en  $(0, 0)$ .

**Exercice 4** (Dériver suivant un vecteur). Soient un ouvert  $U$  de  $\mathbb{R}^2$ , un point  $a = (a_1, a_2) \in U$  et un vecteur  $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ . On dit qu'une fonction  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  est **dérivable en le point  $a$  suivant le vecteur  $v$**  si la limite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

existe et est finie. On note alors  $D_v f(a)$  cette limite et on l'appelle la dérivée de  $f$  en  $a$  suivant  $v$ .

1. Montrer que : si  $f$  est dérivable en  $a$  suivant tout vecteur  $v$ , alors  $f$  admet des dérivées partielles en  $a$ .
2. Soit  $g(x, y) = \frac{x^2 \cdot y}{x^4 + y^2}$  si  $(x, y) \neq (0, 0)$  et  $g(0, 0) = 0$ .
  - (a) Montrer que la fonction  $g$  n'est pas continue en  $(0, 0)$ .
  - (b) Montrer que  $g$  est dérivable en  $(0, 0)$  suivant tout vecteur  $(x, y)$ .
3. Montrer que : si  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $U$ , alors  $f$  est dérivable en tout point  $a \in U$  suivant tout vecteur  $v$  et exprimer  $D_v f(a)$  à l'aide des dérivées partielles de  $f$  en  $a$ .

La réciproque est-elle vraie ?

1. La fonction  $f$  est dérivable en  $a$  suivant chaque vecteur de la base  $(e_1, e_2)$ . D'où  $\frac{f(a + te_1) - f(a)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} D_{e_1} f(a)$ . Or  $\frac{f(a + te_1) - f(a)}{t} = \frac{f(a_1 + t, a_2) - f(a_1, a_2)}{t}$ , qui a donc une limite finie, égale à  $D_{e_1} f(a)$ . Donc  $\partial_1 f(a)$  existe et est égal à  $D_{e_1} f(a)$ . De même,  $\partial_2 f(a)$  existe et est égal à  $D_{e_2} f(a)$ .

2. (a) La fonction  $g$  n'est pas continue en  $(0, 0)$  car  $(x, x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} (0, 0)$  mais  $g(x, x^2) = \frac{1}{2}$  ne tend pas vers  $g(0, 0) = 0$ .

(b) Soient  $a = (0, 0)$  et  $v = (x, y) \neq (0, 0)$ . Alors  $\frac{g(a+tv)-g(a)}{t} = \frac{g(tx, ty)}{t} = \frac{t^3 x^2 y}{t^4 x^4 + t^2 y^2}$ , d'où :

— (premier cas) si  $y \neq 0$ , alors  $\frac{g(tx, ty)}{t} = \frac{x^2 y}{t^2 x^4 + y^2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{x^2}{y}$  ;

— (second cas) si  $y = 0$ , alors  $\frac{g(tx, ty)}{t} = 0 \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$ .

Donc  $g$  est dérivable en  $(0, 0)$  suivant tout vecteur et  $D_{(x,y)} g(0, 0)$  est égal à  $\frac{x^2}{y}$  si  $y \neq 0$  et est égal à 0 si  $y = 0$ .

3. Soit  $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ . Si la fonction  $f$  est de classe  $C^1$ , alors  $f(a + tv) = f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2) = f(a_1, a_2) + tv_1 \partial_1 f(a_1, a_2) + tv_2 \partial_2 f(a_1, a_2) + \|tv\| \varepsilon(tv)$  d'après la formule de Taylor & Young. D'où, pour tout  $t \in \mathbb{R}^*$  :  $\frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = v_1 \partial_1 f(a) + v_2 \partial_2 f(a) + \|v\| \varepsilon(tv) \xrightarrow{t \rightarrow 0} v_1 \partial_1 f(a) + v_2 \partial_2 f(a)$ . Donc  $f$  est dérivable en  $a$  suivant  $v$  et  $D_v f(a) = v_1 \partial_1 f(a) + v_2 \partial_2 f(a)$ .

La réciproque est fausse : la question précédente exhibe un contre-exemple. En effet, elle est dérivable en  $(0, 0)$  suivant tout vecteur. Et aussi en tout autre point  $(x, y)$  car elle est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ . Mais elle n'est pas continue en  $(0, 0)$ , donc a fortiori pas de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$  **corollaire 14 du chapitre XX**.

**Exercice 5.** Soit  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ .

1. Soit la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto \varphi(x^2 + y^2)$ .

Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et calculer  $x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x}$ . Interpréter géométriquement le résultat.

2. Soit la fonction  $g : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto \varphi(\frac{y}{x})$ .

Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et calculer  $x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y}$ . Interpréter géométriquement le résultat.

---

1. Soit la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto \varphi(x^2 + y^2)$ .

$\varphi$  est dérivable, d'où :  $\partial_1 f(x, y) = 2x\varphi'(x^2 + y^2)$  et  $\partial_2 f(x, y) = 2y\varphi'(x^2 + y^2)$ . Or  $\varphi'$  est continue, d'où  $\partial_1 f$  et  $\partial_2 f$  sont continues (car ce sont des produits et composées de fonctions continues). Donc  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

De plus  $x \cdot \partial_2 f(x, y) - y \cdot \partial_1 f(x, y) = x \cdot 2y\varphi'(x^2 + y^2) - y \cdot 2x\varphi'(x^2 + y^2) = 0$ .

Or  $x \cdot \partial_2 f(x, y) - y \cdot \partial_1 f(x, y) = \begin{vmatrix} x & \partial_1 f(x, y) \\ y & \partial_2 f(x, y) \end{vmatrix} = \det(\vec{x}, \nabla f(\vec{x}))$ . D'où le vecteur  $\vec{x} = (x, y)$  et le gradient  $\nabla f(\vec{x})$  sont colinéaires. Pourquoi ? Car le cercle d'équation  $x^2 + y^2 = \text{cte}$  est une courbe de niveau de la fonction  $f$  et le gradient est orthogonal à cette courbe de niveau.

2. Soit la fonction  $g : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto \varphi(\frac{y}{x})$ .

La fonction  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  car  $\partial_1 g(x, y) = \frac{-y}{x^2} \varphi'(\frac{y}{x})$  et  $\partial_2 g(x, y) = \frac{1}{x} \varphi'(\frac{y}{x})$  et  $\varphi'$  est continue. De plus  $x \cdot \partial_1 g(x, y) + y \cdot \partial_2 g(x, y) = 0$ . Or  $x \cdot \partial_1 g(x, y) + y \cdot \partial_2 g(x, y)$  est égal au produit scalaire  $\langle \vec{x}, \nabla g(\vec{x}) \rangle$ . D'où le vecteur  $\vec{x} = (x, y)$  et le gradient  $\nabla g(\vec{x})$  sont orthogonaux. Pourquoi ? Car la droite (privée de l'origine) d'équation  $\frac{y}{x} = \text{cte}$  est une courbe de niveau de la fonction  $g$  et le gradient est orthogonal à cette courbe de niveau.

**Exercice 6.** On dit qu'une fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x = (x_1, x_2) \mapsto f(x)$  est **homogène de degré**  $\alpha \in \mathbb{R}$  si

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, \quad \forall x \in \mathbb{R}^2, \quad f(tx) = t^\alpha f(x).$$

Montrer que, si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et homogène de degré  $\alpha$ , alors

1. les dérivées partielles  $\partial_1 f$  et  $\partial_2 f$  sont homogènes de degré  $\alpha - 1$  ;
  2. pour tout  $x \in \mathbb{R}^2$ ,  $x_1 \partial_1 f(x) + x_2 \partial_2 f(x) = \alpha f(x)$ .
- 

1. Soit  $t \in \mathbb{R}^*$ . Les deux fonctions définies par  $g(x) = f(tx)$  et  $h(x) = t^\alpha f(x)$  sont égales et de classe  $\mathcal{C}^1$ . Leurs dérivées partielles :

$$\partial_i g(x) = t \partial_i f(tx) \quad \text{et} \quad \partial_i h(x) = t^\alpha \partial_i f(x)$$

sont égales pour tout  $t \in \mathbb{R}^*$ , d'où (en divisant par  $t$ ) :

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, \quad \forall x \in \mathbb{R}^2, \quad \partial_i f(tx) = t^{\alpha-1} \partial_i f(x).$$

Chaque dérivée partielle est donc homogène de degré  $\alpha - 1$ .

2. Soit  $x \in \mathbb{R}^2$ . Les deux fonctions définies par  $G(t) = f(tx)$  et  $H(t) = t^\alpha f(x)$  sont égales et dérивables. Leurs dérivées

$$G'(t) = \sum_{i=1}^2 \frac{d(tx_i)}{dt} \partial_i f(tx) = \sum_{i=1}^2 x_i \partial_i f(tx) \quad \text{et} \quad H'(t) = \alpha t^{\alpha-1} f(x)$$

sont égales pour tout  $t \in \mathbb{R}^*$ , donc en particulier pour  $t = 1$  :

$$\sum_{i=1}^2 x_i \partial_i f(x) = \alpha f(x).$$

**Exercice 7** (Une équation aux dérivées partielles). En passant en coordonnées polaires, déterminer toutes les fonctions  $f$  de  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  vers  $\mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telles que :

$$\forall (x, y) \neq (0, 0), \quad x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = 0.$$

Soit, pour tout  $r > 0$  et tout  $\varphi \in \mathbb{R}$ ,  $F(r, \varphi) = f(r \cos \varphi, r \sin \varphi)$ . La fonction  $F$  est de classe  $C^1$  sur  $]0, +\infty[ \times \mathbb{R}$  car c'est la composée  $f \circ M$  de deux fonctions de classe  $C^1$  : la fonction  $f$  et la fonction  $M : (r, \varphi) \mapsto (x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$ . De plus,

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} = -r \sin(\varphi) \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos(\varphi) \frac{\partial f}{\partial y} = -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}$$

grâce à la règle de la chaîne.

$$\text{D'où } x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \iff \frac{\partial F}{\partial \varphi} = 0 \iff F(r, \varphi) = k(r), \text{ où } k \text{ est une fonction de classe } C^1 \text{ sur } ]0, +\infty[.$$

**Exercice 8.** 1. Déterminer le(s) point(s) critique(s) de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y.$$

En chaque point critique, préciser s'il y a un extremum local, si c'est un minimum ou un maximum et s'il est global.

2. Déterminer l'ensemble de définition de

$$f(x, y) = x \ln^2 x + xy^2.$$

Étudier les points critiques de la fonction  $f$ , ses extrema locaux et ses extrema globaux.

**Exercice 9.** Déterminer tous les extrema locaux de la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \sin(xy).$$

Pour chacun d'entre eux, préciser si c'est un minimum ou un maximum et s'il est global.

---

ANALYSE :  $\mathbb{R}^2$  est un ouvert et la fonction  $f$  est de classe  $C^1$ , d'où, s'il y a un extremum local en point  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , alors  $(x, y)$  est un point critique de  $f$  :

$$\nabla f(x, y)(0, 0) \iff \begin{cases} \partial_1 f(x, y) = y \cos(xy) = 0 \\ \partial_2 f(x, y) = x \cos(xy) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos(xy) = 0 \\ x = y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \exists p \in \mathbb{Z}, xy = \frac{\pi}{2} + p\pi \\ (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Les points critiques de  $f$  sont donc :

- l'origine  $(0, 0)$  ;
- les points de la réunion  $\bigcup_{p \in \mathbb{Z}} H_p$  des hyperboles  $H_p$  d'équation  $xy = \frac{\pi}{2} + p\pi$ .

SYNTHESE :  $f(0, 0) = 0$  et, au voisinage de  $(0, 0)$  :  $f(0 + h, 0 + k) = \sin(hk)$  est strictement positif si  $hk > 0$  ou strictement négatif si  $hk < 0$ . Il n'y a donc pas d'extremum local en  $(0, 0)$ .

Sur chaque hyperbole  $H_p$ ,  $f(x, y) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + p\pi\right) = (-1)^p$  :

- si  $p$  est pair, alors  $f(x, y) = 1$  qui est un maximum global car  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\sin(xy) \leq 1$  ;
- si  $p$  est impair, alors  $f(x, y) = -1$  qui est un minimum global car  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\sin(xy) \geq -1$ .

**Exercice 10.** On souhaite déterminer les fonctions  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , de classe  $C^1$ , vérifiant l'équation suivante :

$$\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x + t, y + t) = f(x, y) \quad (\star)$$

1. Démontrer que, si  $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  vérifie  $(\star)$ , alors :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

2. Résoudre l'équation aux dérivées partielles précédente et en déduire l'ensemble des solutions de  $(\star)$ .

---

- Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . La fonction  $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $t \mapsto M(t) = (x + t, y + t)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ . La fonction  $f \circ M$  est donc aussi  $\mathcal{C}^1$  par composition de fonctions  $\mathcal{C}^1$ . Or cette fonction  $f \circ M$  est constante d'après  $(\star)$ , donc sa dérivée en 0 est nulle :

$$0 = (f \circ M)'(t) = \frac{d(x+t)}{dt}(t) \frac{\partial f}{\partial x}(x+t, y+t) + \frac{d(y+t)}{dt}(t) \frac{\partial f}{\partial y}(x+t, y+t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x+t, y+t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x+t, y+t)$$

pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , d'après la règle de la chaîne. En particulier, si  $t = 0$ , alors  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ .

- On effectue le changement de coordonnées  $(u, v) = (x+y, x-y)$  équivalent à  $(x, y) = (\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2})$ . On pose  $F(u, v) = f(x, y)$ . La fonction  $F$  est  $\mathcal{C}^1$  car c'est la composée de deux fonctions  $\mathcal{C}^1$ . On calcule les dérivées partielles de  $f$  en fonction de celles de  $F$  grâce à la règle de la chaîne :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial F}{\partial v} \end{cases} .$$

On résout l'équation aux dérivées partielles (EDP) :

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0 &\iff \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial F}{\partial u} = 0 \\ &\iff \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad F(u, v) = C(v), \text{ où } C \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \\ &\iff \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = C(x - y) \end{aligned}$$

Si une fonction  $f$  vérifie  $(\star)$ , alors elle est une solution de l'EDP, d'où  $f(x, y) = C(x - y)$ . Réciproquement, toute fonction de cette forme vérifie  $(\star)$  car

$$\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x+t, y+t) = C(x+t-(y+t)) = C(x-y) = f(x, y).$$