COLLE 2 – QUESTIONS DE COURS

QUESTION DE COURS N°1 — Formule du binôme de Newton : $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, \forall n \in \mathbb{N}, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

Soient a et b deux nombres complexes. Notons, pour tout n entier naturel, $P(n) : (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

► **Initialisation** : pour $n = 0$, on a $(a + b)^0 = 1$ et $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^k b^{0-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$, ce qui assure que $P(0)$ est vraie.

► **Hérédité** : on suppose $P(n)$ vraie pour un certain entier naturel n . Alors :

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= (a + b)(a + b)^n = (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \\ &= \sum_{K=1}^{n+1} \binom{n}{K-1} a^K b^{n+1-K} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} = a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} \end{aligned}$$

La relation obtenue $(a + b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k}$ signifie exactement que la propriété $P(n+1)$ est vraie, ce qui établit l'hérédité de la propriété.

Conclusion : $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, \forall n \in \mathbb{N}, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

QUESTION DE COURS N°2 — **Exercice.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $\cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) = 0$

$$\begin{aligned} \text{Pour tout réel } x, \text{ on a : } \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) &= [\cos(x) + \cos(3x)] + \cos(2x) = 2 \cos\left(\frac{x+3x}{2}\right) \cos\left(\frac{x-3x}{2}\right) + \cos(2x) \\ &= 2 \cos(2x) \cos(x) + \cos(2x) = \cos(2x) [2 \cos(x) + 1] \end{aligned}$$

Ainsi, un réel x est solution de (E) SSI : $\cos(2x) = 0$ ou $\cos(x) = -1/2$, c'est à dire SSI : $2x \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$ ou $x \equiv \pm \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.

On en déduit que x est solution de (E) SSI $x \equiv \frac{\pi}{4} \left[\frac{\pi}{2} \right]$ ou $x \equiv \pm \frac{2\pi}{3} [2\pi]$

Conclusion. L'ensemble des solutions de (E) est $\left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

QUESTION DE COURS N^o3 — **Propriétés des congruences.** Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$.

1/ **Réflexivité** : $\forall x \in \mathbb{R}, x \equiv x[A]$

2/ **Symétrie** : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (y \equiv x[A]) \iff (x \equiv y[A])$

3/ **Transitivité** : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (y \equiv x[A] \wedge z \equiv y[A]) \implies (z \equiv x[A])$

1/ Pour tout réel x , on a : $x = x + 0 \times A$, d'où : $x \equiv x[A]$.

2/ Soient x et y deux réels tels que : $y \equiv x[A]$. Alors : $\exists k \in \mathbb{Z}, y = x + kA$. D'où : $x = y + (-k)A$, soit encore : $x = y + k'A$ avec $k' = -k \in \mathbb{Z}$. D'où : $x \equiv y[A]$.

On a ainsi établi l'implication : $(y \equiv x[A]) \implies (x \equiv y[A])$. L'implication réciproque (et donc l'équivalence) provient de ce que les réels x et y jouent des rôles symétriques dans cet énoncé.

3/ Soient x, y et z trois réels tels que : $y \equiv x[A]$ et $z \equiv y[A]$. Alors : $\exists k \in \mathbb{Z}, y = x + kA$ et $\exists k' \in \mathbb{Z}, z = y + k'A$.

D'où : $z = x + (k + k')A$. Puisque $(k + k') \in \mathbb{Z}$, cette égalité signifie que : $z \equiv x[A]$.

Par suite : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (y \equiv x[A] \wedge z \equiv y[A]) \implies (z \equiv x[A])$.

Remarque : les trois énoncés de la propriété ci-dessus signifient que la relation "être congru à" (ou relation de congruence) est ce que l'on appelle une **relation d'équivalence**. Nous aurons de nombreuses occasions de revoir cette notion en cours d'année.

QUESTION DE COURS N^o4 — **Maths / Physique.** Pour tout couple de réels (a, b) , il existe un couple de réels (K, φ) tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, a \cos(x) + b \sin(x) = K \cos(x - \varphi)$

Soient a et b deux nombres réels. On distingue deux cas.

► **Premier cas** : $(a, b) = (0, 0)$. Dans ce cas : $\forall x \in \mathbb{R}, a \cos(x) + b \sin(x) = 0$. Le couple $(0, \varphi)$ (φ étant un réel quelconque) convient.

► **Second cas** : $(a, b) \neq (0, 0)$. Dans ce cas : $\sqrt{a^2 + b^2} > 0$. On peut donc écrire pour tout réel x :

$$a \cos(x) + b \sin(x) = \underbrace{\sqrt{a^2 + b^2}}_K \left(\underbrace{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_A \cos(x) + \underbrace{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_B \sin(x) \right)$$

Il résulte de la définition des réels A et B que : $A^2 + B^2 = 1$.

Par conséquent : $\exists \varphi \in \mathbb{R}, A = \cos(\varphi) \wedge B = \sin(\varphi)$.

D'où pour tout réel x :

$$a \cos(x) + b \sin(x) = K [\cos(\varphi) \cos(x) + \sin(\varphi) \sin(x)] = K \cos(x - \varphi)$$

On a ainsi établi que :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exists (K, \varphi), \forall x \in \mathbb{R}, a \cos(x) + b \sin(x) = K \cos(x - \varphi)$$

Remarque : la condition $A^2 + B^2 = 1$ signifie que le point M de coordonnées (A, B) est tel que $OM = 1$.

Autrement dit, la condition $A^2 + B^2 = 1$ signifie que (A, B) est le couple des coordonnées d'un point situé sur le cercle trigonométrique.

A ce titre, il existe un réel φ tel que $A = \cos(\varphi)$ et $B = \sin(\varphi)$.

Observation : un tel réel φ n'est pas unique, car n'est défini qu'à un multiple de 2π près.