COLLE 10 – QUESTIONS DE COURS

QUESTION DE COURS N°1 — Théorème (solution générale d’une EDL1 homogène). Soient $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues, a ne s’annulant pas sur I . Les solutions de l’EDL $a(x)y' + b(x)y = 0$ sont les fonctions $f_k : I \rightarrow \mathbb{K}$ définies sur I par $f_k(x) = ke^{-A(x)}$ ($k \in \mathbb{K}$), où A désigne une primitive sur I de la fonction $\frac{b}{a}$.

Preuve. Notons (E) l’EDL : $a(x)y' + b(x)y = 0$. La fonction b/a est continue sur I , en tant que quotient de fonctions continues sur I dont le dénominateur ne s’annule pas sur I . A ce titre, b/a admet des primitives sur I ; notons A l’une d’entre elles.

Soit φ une solution de (E). Introduisons alors une fonction auxiliaire g en posant : $\forall x \in I, g(x) = \varphi(x)e^{A(x)}$.

La fonction g est dérivable (et même de classe $\mathcal{C}^1$) sur I , et :

$$\forall x \in I, g'(x) = \varphi'(x)e^{A(x)} + \frac{b(x)}{a(x)}\varphi(x)e^{A(x)} \iff \iff \forall x \in I, g'(x) = e^{A(x)} \left(\varphi'(x) + \frac{b(x)}{a(x)}\varphi(x) \right)$$

Et la fonction a ne s’annulant pas sur I , cette dernière assertion est encore équivalente à la suivante :

$$\forall x \in I, a(x)g'(x) = e^{A(x)} \underbrace{(a(x)\varphi'(x) + b(x)\varphi(x))}_{=0}$$

la nullité de la parenthèse du terme de droite provenant de ce que φ est solution de (E).

Par suite : $\forall x \in I, a(x)g'(x) = 0$ d’où $\forall x \in I, g'(x) = 0$ (puisque a ne...). Il s’ensuit que g est constante sur I , explicitement :

$$\exists k \in \mathbb{K}, g(x) = k \iff \exists k \in \mathbb{K}, \varphi(x)e^{A(x)} = k \iff \exists k \in \mathbb{K}, \varphi(x) = ke^{-A(x)}$$

On vient donc d’établir que toute solution de (E) est “de la forme $ke^{-A(x)}$ ”.

La réciproque (toute fonction “de la forme $ke^{-A(x)}$ ” est solution de (E)) est une vérification aisée qui permet de conclure :

Les solutions de l’EDL $a(x)y' + b(x)y = 0$ sont les fonctions $f_k : I \rightarrow \mathbb{K}$ définies sur I par $f_k(x) = ke^{-A(x)}$ ($k \in \mathbb{K}$).

QUESTION DE COURS N°2 — Physique-Maths. Oscillateur harmonique libre, sans frottements (résolution de $y'' + \omega_0^2 y = 0$). Solution g^{ale} peut s’écrire $f_{K,\varphi}(t) = K \cos(\omega_0 t - \varphi)$

On suppose que $\omega_0 \in \mathbb{R}_+^*$, et on note (H) l’équation différentielle linéaire du second ordre : $y'' + \omega_0^2 y = 0$. L’équation caractéristique associée possède deux racines complexes conjuguées $\pm i\omega_0$.*

On en déduit que la solution générale[†] est : $\forall (t, \lambda, \mu) \in \mathbb{R}^3, f_{\lambda,\mu}(t) = \lambda \cos(\omega_0 t) + \mu \sin(\omega_0 t)$.

Fixons à présent les réels t, λ et μ , avec $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$. On écrit :

$$f_{\lambda,\mu}(t) = \sqrt{\lambda^2 + \mu^2} \left(\frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \cos(\omega_0 t) + \frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \sin(\omega_0 t) \right) \quad \text{puis on pose : } X = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \text{ et } Y = \frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}}$$

Le couple de réels (X, Y) vérifie clairement la relation $X^2 + Y^2 = 1$. Par suite, le complexe $X + iY$ est un élément de $\mathbb{U}$, et il existe donc un unique réel $\varphi \in [0, 2\pi[$ tel que $X = \cos \varphi$ et $Y = \sin \varphi$. Par suite :

$$f_{\lambda,\mu}(t) = \sqrt{\lambda^2 + \mu^2} (\cos \varphi \cos(\omega_0 t) + \sin \varphi \sin(\omega_0 t)) \quad \text{d’où :}$$

$$f_{\lambda,\mu}(t) = \sqrt{\lambda^2 + \mu^2} \cos(\omega_0 t - \varphi)$$

Le cas $(\lambda, \mu) = (0, 0)$ est trivial (prendre $K = 0$ et φ arbitraire).

Conclusion. La solution générale de (H) est : $\forall (t, K, \varphi) \in \mathbb{R}^3, f_{K,\varphi}(t) = K \cos(\omega_0 t - \varphi)$ (**régime périodique**).

QUESTION DE COURS N°3 — Physique-Maths (2). Oscillateur harmonique libre, avec frottements (résolution de $y'' + 2my' + \omega_0^2 y = 0$). Solution générale dans les trois cas.

On considère l’EDL2 : (H) $y'' + 2my' + \omega_0^2 y = 0$ avec m et ω_0 strictement positifs. L’équation caractéristique associée est : (EC) $X^2 + 2mX + \omega_0^2 = 0$, dont le discriminant est $\Delta = 4(m^2 - \omega_0^2)$.

On distingue alors trois cas :

► Si $\Delta < 0$ (càd si : $m < \omega_0$) : alors l’équation (EC) possède deux racines complexes conjuguées $-m \pm i\sqrt{\omega_0^2 - m^2}$. Dans ce cas (“frottements faibles”), la solution générale de (H) est :

*. Qui sont effectivement distinctes puisque ω_0 est non nul par hypothèse.
 †. C’est l’ensemble des fonctions solutions de (H) à valeurs réelles.

$\forall (t, \lambda, \mu) \in \mathbb{R}^3, f_{\lambda, \mu}(t) = \left(\lambda \cos \left(\left(\sqrt{\omega_0^2 - m^2} \right) t \right) + \mu \sin \left(\left(\sqrt{\omega_0^2 - m^2} \right) t \right) \right) e^{-mt}$ (régime pseudo-périodique).

► Si $\Delta = 0$ (càd si : $m = \omega_0$) : alors l'équation (EC) possède une racine double (réelle) : $-m$. Dans ce cas, la solution générale de (H) est :

$\forall (t, \lambda, \mu) \in \mathbb{R}^3, f_{\lambda, \mu}(t) = (\lambda t + \mu) e^{-mt}$ (régime critique).

► Si $\Delta > 0$ (càd si : $m > \omega_0$) : alors l'équation (EC) possède deux racines réelles $X_{1,2} = -m \pm \sqrt{m^2 - \omega_0^2}$. Dans ce cas ("frottements importants"), la solution générale de (H) est :

$\forall (t, \lambda, \mu) \in \mathbb{R}^3, f_{\lambda, \mu}(t) = \lambda e^{X_1 t} + \mu e^{X_2 t}$ (régime apériodique).

QUESTION DE COURS N°4 — **Propriété.** Soient a, b et α trois scalaires. On note (E) l'EDL2 : $y'' + ay' + by = e^{\alpha x}$; et on note encore (EC) $X^2 + aX + b = 0$ l'équation caractéristique associée à (E).

Si α n'est pas racine de (EC), alors l'équation (E) possède une solution particulière f_P avec : $\forall x \in \mathbb{R}, f_P(x) = Ke^{\alpha x}$, pour un certain $K \in \mathbb{K}$.

Prouvons la propriété. Avec les notations et hypothèses de l'énoncé, α n'est pas racine de (EC). Alors : $\alpha^2 + a\alpha + b \neq 0$.

Soit K un scalaire[‡]. Posons : $\forall x \in \mathbb{R}, f_P(x) = Ke^{\alpha x}$. La fonction f_P est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x on a : $f_P'(x) = \alpha Ke^{\alpha x}$ et $f_P''(x) = \alpha^2 Ke^{\alpha x}$.

Ainsi, pour tout réel x on a : $f_P''(x) + af_P'(x) + bf_P(x) = Ke^{\alpha x} (\alpha^2 + a\alpha + b)$.

Puisque $e^{\alpha x}$ est non nul pour tout réel x , on en déduit que :

$$[f_P \text{ est solution de (E)}] \iff [K (\alpha^2 + a\alpha + b) = 1] \iff \left[K = \frac{1}{\alpha^2 + a\alpha + b} \right]$$

La dernière égalité étant rendue légitime par le fait que α n'est pas racine de (EC).

On peut alors conclure que la fonction f_P définie en posant : $\forall x \in \mathbb{R}, f_P(x) = \frac{1}{\alpha^2 + a\alpha + b} e^{\alpha x}$, est solution de (E).

QUESTION DE COURS N°5 — **Exo — Application du principe de superposition :** résolution de $y'' - 3y' + 2y = 2\text{ch}(x)$.

► Résolution de l'équation homogène associée : (H) $y'' - 3y' + 2y = 0$. L'équation caractéristique a 1 et 2 comme racines. Par suite, la solution générale de (H) (à valeurs réelles) est :

$$f_{\lambda, \mu} : x \in \mathbb{R} \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x} \quad (\text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ réels}) \quad (\heartsuit)$$

► Recherche d'une solution particulière. On introduit l'équation (E₁) : $y'' - 3y' + 2y = e^{-x}$.

Puisque -1 n'est pas racine de l'équation caractéristique, (E₁) admet une solution particulière de la forme Ke^{-x} (avec K réel). Posons donc : $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = Ke^{-x}$. La fonction φ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ (et même de classe $\mathcal{C}^\infty$), et on peut donc calculer ses dérivées successives. Pour tout réel x , on a clairement : $\varphi'(x) = -Ke^{-x}$ et $\varphi''(x) = Ke^{-x}$. Il s'ensuit que φ est solution de (E₁) si et seulement si :

$$\forall x \in \mathbb{R}, Ke^{-x} (1 + 3 + 2) = e^{-x} \iff K = \frac{1}{6}$$

On en déduit que la fonction : $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{6} e^{-x}$ est solution de (E₁) (♠).

On introduit à présent l'équation (E₂) : $y'' - 3y' + 2y = e^x$.

‡. Comme indiqué en cours, un scalaire est un élément de $\mathbb{K}$, càd un nombre réel ou complexe.

Puisque 1 est racine simple de l'équation caractéristique, (E_2) admet une solution particulière de la forme Kxe^x (avec K réel). Posons donc : $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = Kxe^x$. La fonction φ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$... Pour tout réel x , on a clairement : $\varphi'(x) = Ke^x(x+1)$ et $\varphi''(x) = Ke^x(x+2)$. Il s'ensuit que φ est solution de (E_2) si et seulement si :

$$\forall x \in \mathbb{R}, Ke^x(x+2-3x-3+2x) = e^x \iff K = -1$$

On en déduit que la fonction : $f : x \in \mathbb{R} \mapsto -xe^x$ est solution de (E_2) ($\clubsuit$).

► D'après ($\clubsuit$), ($\spadesuit$) et le principe de superposition, on peut affirmer que la fonction :

$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{6}e^{-x} - xe^x \text{ est solution de } (E) \ (\diamond)$$

► D'après ($\heartsuit$) et ($\diamond$), la solution générale de (E) est :

$$f_{\lambda,\mu} : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{6}e^{-x} - xe^x + \lambda e^x + \mu e^{2x} \quad (\text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ réels})$$

QUESTION DE COURS N°6 — **Exercice** — **Application du “pont $\mathbb{R} \longleftrightarrow \mathbb{C}$ ” pour les EDL** : résolution de $y'' - 4y' + 3y = e^x \sin(\omega x)$ (cas réel, avec $\omega > 0$).

► Résolution de l'équation homogène associée : $(H) y'' - 4y' + 3y = 0$. L'équation caractéristique a 1 et 3 comme racines. Par suite, la solution générale de (H) (à valeurs réelles) est :

$$f_{\lambda,\mu} : x \in \mathbb{R} \mapsto \lambda e^x + \mu e^{3x} \quad (\text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ réels})$$

► Recherche d'une solution particulière. On introduit l'équation (E') : $y'' - 4y' + 3y = e^{(1+i\omega)x}$.

Puisque $1+i\omega$ n'est pas racine de l'équation caractéristique, (E') admet une solution particulière de la forme $Ke^{(1+i\omega)x}$ (avec K complexe). Posons donc : $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = Ke^{(1+i\omega)x}$. La fonction φ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ (et même de classe $\mathcal{C}^\infty$), et on peut donc calculer les dérivées successives de φ . Pour tout réel x , on a clairement : $\varphi'(x) = (1+i\omega)Ke^{(1+i\omega)x}$ et $\varphi''(x) = (1-\omega^2+2i\omega)Ke^{(1+i\omega)x}$. Il s'ensuit que φ est solution de (E') si et seulement si :

$$\forall x \in \mathbb{R}, Ke^{(1+i\omega)x} [(1-\omega^2+2i\omega) - 4(1+i\omega) + 3] = e^{(1+i\omega)x} \iff \forall x \in \mathbb{R}, (-\omega^2 - 2i\omega)Ke^{ix} = e^{ix}$$

$$\iff -K(\omega^2 + 2i\omega) = 1 \iff K = -\frac{1}{\omega^2 + 2i} \iff K = -\frac{\omega^2}{\omega^4 + 4} + \frac{2i}{\omega^4 + 4}$$

On en déduit que la fonction $F : x \in \mathbb{R} \mapsto \left(-\frac{\omega^2}{\omega^4 + 4} + \frac{2i}{\omega^4 + 4}\right)e^{(1+i\omega)x}$ est solution de (E') . Il ne reste plus qu'à en déterminer la partie imaginaire pour avoir une solution de (E) . Explicitement, la fonction

$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{e^x}{\omega^4 + 4} (2 \cos(\omega x) - \omega^2 \sin(\omega x))$$

est une solution particulière de (E) .

Conclusion. La solution générale de l'équation $(E) y'' - 4y' + 3y = e^x \sin(\omega x)$ est

$$\varphi : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{e^x}{\omega^4 + 4} (2 \cos(\omega x) - \omega^2 \sin(\omega x)) + \lambda e^x + \mu e^{3x} \quad (\text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ réels})$$

COMPLÉMENT – GÉOMÉTRIE DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul du plan réel. L'ensemble des multiples de $\vec{u}$:

$$\mathbb{R} \vec{u} = \{\lambda \vec{u} / \lambda \in \mathbb{R}\}$$

est une droite qui passe par l'origine du plan (on parle alors de droite *vectorielle*).

Considérons un second vecteur $\vec{v}$, non colinéaire à $\vec{u}$. L'image de $\mathbb{R} \vec{u}$ par la translation de vecteur $\vec{v}$ est une droite :

$$\vec{v} + \mathbb{R} \vec{u} = \{\vec{v} + \lambda \vec{u} / \lambda \in \mathbb{R}\}$$

qui bien évidemment ne passe plus par l'origine du plan (on parle alors de droite *affine*).

Ces considérations sont illustrées par le graphique ci-dessous !

Fin du premier acte.

Sous les hypothèses que vous connaissez par cœur, l'ensemble des solutions d'une EDL1 homogène ($ay' + by = 0$) est l'ensemble des multiples de e^{-A} , où A désigne une primitive de b/a . On peut donc noter cet ensemble :

$$\mathbb{R} e^{-A} = \{\lambda e^{-A} / \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Par analogie avec la situation précédente, on dira que c'est une droite vectorielle (dans l'espace $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$).

Considérons à présent une solution particulière f_P de l'EDL1 $ay' + by = c$ (avec c non nulle). La fonction f_P est non colinéaire à e^{-A} (sinon elle serait solution de l'équation homogène). L'image de $\mathbb{R} e^{-A}$ par la translation de "vecteur" f_P

$$f_P + \mathbb{R} e^{-A} = \{f_P + \lambda e^{-A} / \lambda \in \mathbb{R}\}$$

est une droite affine (dans l'espace $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$).

Ces considérations sont illustrées par le graphique ci-dessous !

Remarque : de façon analogue, l'ensemble des solutions d'une EDL2 sans second membre est un plan vectoriel, et l'ensemble des solutions d'une EDL2 avec second membre est un plan affine.