

<b>LIMITES ET CONTINUITÉ — PROPRIÉTÉ DE LIMITE SÉQUENTIELLE</b>
---

**PROPRIÉTÉ DE LIMITE SÉQUENTIELLE** — Soient  $(x_n)_n$  une suite réelle convergeant vers  $a$  (avec  $a$  réel, ou  $a = \pm\infty$ ), et  $f$  une fonction définie au voisinage de  $a$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$  (avec  $\ell$  réel, ou  $\ell = \pm\infty$ ).

Alors :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell$ .

Preuve (dans les 9 cas).

➤ **Cas 1** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  et  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$  (avec  $a$  et  $\ell$  réels).

Fixons  $\varepsilon > 0$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ , on peut affirmer que :  $\exists \alpha > 0, |x - a| < \alpha \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |x_n - a| < \alpha$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $\varepsilon$  est un réel strictement positif arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |f(x_n) - \ell| < \varepsilon, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell$$

➤ **Cas 2** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$  (avec  $\ell$  réel).

Fixons  $\varepsilon > 0$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ , on peut affirmer que :  $\exists x_0 \in \mathbb{R}, x > x_0 \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies x_n > x_0$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $\varepsilon$  est un réel strictement positif arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |f(x_n) - \ell| < \varepsilon, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell$$

➤ **Cas 3** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$  (avec  $\ell$  réel).

Fixons  $\varepsilon > 0$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ , on peut affirmer que :  $\exists x_0 \in \mathbb{R}, x < x_0 \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies x_n < x_0$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $\varepsilon$  est un réel strictement positif arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |f(x_n) - \ell| < \varepsilon, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell$$

➤ **Cas 4** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  et  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  (avec  $a$  réel).

Fixons  $M \in \mathbb{R}$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists \alpha > 0, |x - a| < \alpha \implies f(x) > M$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |x_n - a| < \alpha$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $M$  est un réel arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies f(x_n) > M, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$$

➤ **Cas 5** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

Fixons  $M \in \mathbb{R}$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists x_0 \in \mathbb{R}, x > x_0 \implies f(x) > M$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies x_n > x_0$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $M$  est un réel arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies f(x_n) > M, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$$

➤ **Cas 6** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ .

Fixons  $M \in \mathbb{R}$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists x_0 \in \mathbb{R}, x < x_0 \implies f(x) > M$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies x_n < x_0$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $M$  est un réel arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies f(x_n) > M, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$$

➤ **Cas 7** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  et  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  (avec  $a$  réel).

Fixons  $M \in \mathbb{R}$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists \alpha > 0, |x - a| < \alpha \implies f(x) < M$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |x_n - a| < \alpha$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $M$  est un réel arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies f(x_n) < M, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = -\infty$$

➤ **Cas 8** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .

Fixons  $M \in \mathbb{R}$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists x_0 \in \mathbb{R}, x > x_0 \implies f(x) < M$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies x_n > x_0$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $M$  est un réel arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies f(x_n) < M, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = -\infty$$

➤ **Cas 9** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ .

Fixons  $M \in \mathbb{R}$ .

Puisque :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists x_0 \in \mathbb{R}, x < x_0 \implies f(x) < M$  (♠).

Comme par ailleurs :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$ , on peut affirmer que :  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies x_n < x_0$  (♣).

D'après (♠) et (♣), et puisque  $M$  est un réel arbitraire dans ce qui précède, on a établi que :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies f(x_n) < M, \text{ c'est-à-dire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = -\infty$$

**Conclusion** : dans tous les cas on a montré que :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$  (avec  $a$  ou  $\ell$  réel, ou  $a$  ou  $\ell = \pm\infty$ ).