

1. **Exercice 6 b :**

Supposons que  $E = A \cup B$  et  $A \cap C \subset B$  et  $B \cap C \subset A$ , et montrons que  $C \subset A \cap B$ .

Soit  $x \in C$ .

Alors  $x \in E$  (car  $C$  est une partie de  $E$ ).

Or  $E = A \cup B$ , d'où  $x \in A \cup B$ ,

c'est-à-dire  $x \in A$  ou  $x \in B$ .

**Cas 1 :  $x \in A$  :**

Alors  $x \in A \cap C$ .

Comme  $A \cap C \subset B$ , on en déduit que  $x \in B$ .

Par conséquent,  $x \in A \cap B$ .

**Cas 2 :  $x \in B$  :**

Alors  $x \in B \cap C$ .

Comme  $B \cap C \subset A$ , on en déduit que  $x \in A$ .

Par conséquent,  $x \in A \cap B$ .

Dans les deux cas, on a bien  $x \in A \cap B$ .

On a ainsi montré que tous les éléments de l'ensemble  $C$  appartiennent à  $A \cap B$ , c'est-à-dire  $C \subset A \cap B$ .

Si  $E = A \cup B$  et  $A \cap C \subset B$  et  $B \cap C \subset A$ , alors  $C \subset A \cap B$

2. **Exercice 10 b :**

*Commentaires et rappels sur la valeur absolue :*

$$\text{On a : } |x - a| = \begin{cases} x - a & \text{si } x \geq a \\ a - x & \text{sinon} \end{cases}$$

Afin de faire disparaître les valeurs absolues, on va distinguer plusieurs cas suivant les valeurs de  $x$ .

Pour chaque domaine d'étude considéré, on va résoudre l'équation en la transformant en une équation équivalente simple.

• **Cas 1 : on suppose que  $x \in [2, +\infty[$ .**

$$\begin{aligned} x \text{ est solution de l'équation} &\iff (x + 1) - x + 3(x - 1) - 2(x - 2) = x + 2 \\ &\iff 0 \cdot x = 0 \end{aligned}$$

Tous les réels  $x$  du domaine d'étude  $[2, +\infty[$  vérifient l'équation (très particulière)  $0 \cdot x = 0$ , et donc sont solutions de l'équation de départ.

On en déduit que :  $S \cap [2, +\infty[ = [2, +\infty[$ .

• **Cas 2 : on suppose que  $x \in [1, 2]$ .**

$$\begin{aligned} x \text{ est solution de l'équation} &\iff (x + 1) - x + 3(x - 1) - 2(2 - x) = x + 2 \\ &\iff 4x = 8 \\ &\iff x = 2 \end{aligned}$$

On en déduit que :  $S \cap [1, 2] = \{2\}$ .

• **Cas 3 : on suppose que  $x \in [0, 1]$ .**

$$\begin{aligned} x \text{ est solution de l'équation} &\iff (x + 1) - x + 3(1 - x) - 2(2 - x) = x + 2 \\ &\iff -2x = 2 \\ &\iff x = -1 \end{aligned}$$

La condition  $x = -1$  n'étant pas compatible avec l'hypothèse  $x \in [0, 1]$ , on en déduit que l'équation n'admet pas de solution dans l'intervalle  $[0, 1]$ .

Par conséquent :  $S \cap [0, 1] = \emptyset$ .

• **Cas 4 : on suppose que  $x \in [-1, 0]$ .**

$$\begin{aligned} x \text{ est solution de l'équation} &\iff (x+1) + x + 3(1-x) - 2(2-x) = x+2 \\ &\iff 0 \cdot x = 2 \end{aligned}$$

Par conséquent :  $S \cap [-1, 0] = \emptyset$ .

- **Cas 5 : on suppose que  $x \in ]-\infty, -1]$ .**

$$\begin{aligned} x \text{ est solution de l'équation} &\iff -(x+1) + x + 3(1-x) - 2(2-x) = x+2 \\ &\iff -2x = 4 \\ &\iff x = -2 \end{aligned}$$


Par conséquent :  $S \cap ]-\infty, -1] = \{-2\}$ .

On en déduit que  $S = \{-2\} \cup [2, +\infty[$

**Remarque :** on définit la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = |x+1| - |x| + 3|x-1| - 2|x-2| - x - 2$ .

On a alors :  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}$ .

On représente ci-dessous le graphe de la fonction  $f$ .



### 3. Exercice 10 c :

- **Analyse :** supposons  $x$  solution de l'équation :  $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = 2$ .

On a :  $\sqrt{x+1} = \sqrt{x} + 2$ , donc  $x+1 = (\sqrt{x}+2)^2$ .

Ce qui donne :  $x+1 = x+4\sqrt{x}+4$ .

On obtient alors :  $4\sqrt{x} = -3$ , ce qui est impossible.

On en déduit que l'équation n'a pas de solution : l'ensemble des solutions est vide

### 4. Exercice 10 d :

- **Analyse :** supposons  $x$  solution de l'équation :  $2\sqrt{x+5} + 10 = x$ .

On a :  $2\sqrt{x+5} = x-10$ , donc  $4(x+5) = (x-10)^2$ .

Ce qui donne :  $x^2 - 24x + 80 = 0$

$$(x-20)(x-4) = 0$$

$$x = 20 \text{ ou } x = 4$$

On a ainsi montré que si  $x$  est solution de l'équation, alors  $x = 20$  ou  $x = 4$ .

On a donc :  $S \subset \{4, 20\}$ .

- **Synthèse :**

Supposons  $x = 4$  :  $2\sqrt{x+5} + 10 = 16$ .

4 n'est pas solution de l'équation.

Supposons  $x = 20$  :  $2\sqrt{x+5} + 10 = 20$ .

20 est solution de l'équation.

L'équation admet donc une unique solution :  $x = 20$

## 5. Exercice 10 g :

- On remarque que l'inéquation est définie sur  $[-1, +\infty[$ .

Résoudre l'inéquation revient donc à déterminer l'ensemble  $S$  des éléments  $x$  appartenant à  $[-1, +\infty[$  qui vérifient l'inégalité  $\sqrt{x+1} \leq 2(x-2)$  :

$$S = \{x \in [-1, +\infty[ \mid \sqrt{x+1} \leq 2(x-2)\}$$

- **Analyse :** supposons  $x$  solution de l'inéquation :  $2(x-2) \geq \sqrt{x+1}$ .

Or comme  $\sqrt{x+1} \geq 0$ , on en déduit que  $2(x-2) \geq 0$ , d'où  $x \geq 2$ .

De plus, par croissance de la fonction carrée sur  $\mathbb{R}_+$ , on obtient  $4(x-2)^2 \geq x+1$ , ce qui donne  $4x^2 - 17x + 15 \geq 0$ .

On peut étudier le signe du polynôme  $P = 4X^2 - 17X + 15$ .

$P$  admet deux racines réelles :  $\frac{5}{4}$  et 3.

$P$  prend donc des valeurs positives sur l'ensemble  $]-\infty, \frac{5}{4}] \cup [3, +\infty[$  et prend des valeurs strictement négatives sur  $[\frac{5}{4}, 3[$ .

Comme on a établi précédemment que  $P(x) = 4x^2 - 17x + 15 \geq 0$ , on en déduit que  $x \in ]-\infty, \frac{5}{4}] \cup [3, +\infty[$ .

On a également prouvé que  $x \geq 2$ .

Par conséquent,  $x \in [3, +\infty[$ .

**On a ainsi montré que si  $x$  est solution de l'inéquation, alors  $x \in [3, +\infty[$ , d'où  $S \subset [3, +\infty[$ .**

- **Synthèse :** supposons  $x \in [3, +\infty[$ .

Alors, d'après ce qui précède (cf étude du polynôme  $P$ ),  $P(x) = 4x^2 - 17x + 15 \geq 0$ , ce qui donne  $4x^2 - 16x + 16 \geq x + 1$ .

Par croissance de la fonction racine carrée sur  $\mathbb{R}^+$ , on obtient alors :  $\sqrt{4x^2 - 16x + 16} \geq \sqrt{x+1}$ .

*Pour finir la synthèse et prouver que  $x$  est solution de l'inéquation, on va utiliser la relation :  $\sqrt{a^2} = |a|$ .*

*Lorsque  $a$  est positif, on obtient  $\sqrt{a^2} = a$ , et lorsque  $a$  est négatif, on a  $\sqrt{a^2} = -a$ .*

*Très souvent, les élèves oublient de préciser des arguments indiquant le signe de  $a$ .*

Or  $\sqrt{4x^2 - 16x + 16} = \sqrt{(2x-4)^2} = |2x-4|$ .

Comme  $x \in [3, +\infty[$ , alors  $2x-4 \geq 0$ , et ainsi  $\sqrt{4x^2 - 16x + 16} = 2x-4$ .

On obtient finalement :  $2(x-2) \geq \sqrt{x+1}$ .

**Ainsi, on a montré que si  $x \in [3, +\infty[$ , alors  $x$  est solution de l'inéquation, d'où  $[3, +\infty[ \subset S$ .**

• **Conclusion :**  $S = [3, +\infty[$

## 6. Exercice 11 :

a) Soit  $n$  un entier naturel.

Supposons que  $n$  ne soit pas pair.

$n$  est donc impair : il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $n = 2k+1$ .

Alors  $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2k' + 1$  avec  $k' = 2k^2 + 2k$ ,  $k' \in \mathbb{N}$ .

On en déduit que  $n^2$  est impair, donc n'est pas pair.

On a donc montré (par *contraposition*) que pour tout entier naturel  $n$ , si  $n^2$  est pair, alors  $n$  est pair.

b) Supposons par l'absurde que  $\sqrt{2}$  soit rationnel.

Il existe deux entiers  $p$  et  $q$  non tous les deux pairs tels que  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ .

On a alors  $2 = \frac{p^2}{q^2}$ , ou encore  $2q^2 = p^2$ .

$p^2$  est donc pair.

On en déduit (en utilisant le résultat de la question a) que  $p$  est pair.

Il existe donc  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $p = 2k$ .

On obtient :  $2q^2 = 4k^2$ , puis  $q^2 = 2k^2$ .

$q^2$  est donc pair, et ainsi  $q$  est pair (toujours d'après la question a).

$p$  et  $q$  sont donc tous les deux pairs, ce qui est **contradictoire** avec l'hypothèse de départ.

Ainsi,  $\sqrt{2}$  est irrationnel

7. **Exercice 15 b :**

- Soit  $P(n) : 2^n \geq n^2$ .
- $P(4)$  est vraie.
- Supposons  $P(n)$  vraie pour un entier naturel  $n \geq 4$ .

On a :  $2^n \geq n^2$ , donc  $2^{n+1} \geq 2n^2$ .

On va alors établir que  $2n^2$  est supérieur à  $(n+1)^2$  en montrant que la différence est positive.

$$\begin{aligned} \text{Or } 2n^2 - (n+1)^2 &= n^2 - 2n - 1 \\ &= (n-1)^2 + 1 \end{aligned}$$

Comme  $n \geq 4$ , alors  $(n-1)^2 \geq 9$ .

Par conséquent,  $2n^2 - (n+1)^2 \geq 0$ .

On a ainsi :  $2^{n+1} \geq 2n^2$  et  $2n^2 \geq (n+1)^2$ ,  
d'où  $2^{n+1} \geq (n+1)^2$ .  $P(n+1)$  est vraie.

Ainsi, d'après le principe de récurrence, pour tout entier  $n \geq 4$ ,  $2^n \geq n^2$

8. **Exercice 14 :** (lire le dernier paragraphe de la page 12 du chapitre 1)

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

Supposons que  $x^2 \leq 1$  et montrons que  $(2-x)^2 \geq 1$ .

Comme  $x^2 \leq 1$ , alors  $x \leq 1$ , puis  $-x \geq -1$ .

Par conséquent  $2-x \geq 1$ .

Par croissance de la fonction carrée sur  $\mathbb{R}_+$ , on obtient  $(2-x)^2 \geq 1$ .

On a ainsi montré que  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $x^2 > 1$  ou  $(2-x)^2 \geq 1$

9. **Exercice 18 :**

- Soit  $P(n) : u_n = n(n-1)$ .
- $P(0)$ ,  $P(1)$  et  $P(2)$  sont vraies.
- Supposons  $P(n)$ ,  $P(n+1)$  et  $P(n+2)$  vraies pour un entier naturel  $n \geq 0$ .

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_{n+3} &= 3u_{n+2} - 3u_{n+1} + u_n \\ &= 3(n+2)(n+1) - 3(n+1)n + n(n-1) \\ &= 3n^2 + 9n + 6 - 3n^2 - 3n + n^2 - n \\ &= n^2 + 5n + 6 \\ &= (n+3)(n+2) \end{aligned}$$

$P(n+3)$  est vraie.

Ainsi, d'après le principe de récurrence, pour tout entier  $n \geq 0$ ,  $u_n = n(n-1)$