

Chapitre 21 : Analyse asymptotique

A) Relation de domination, négligeabilité et équivalence

- Définitions, lien entre les différentes relations
- Notations $o, O, \sim$.
- Opérations sur la manipulation des relations
- Lien entre les différentes relations et le quotient des deux fonctions comparées.
- Traduction des croissances comparées à l'aide de ses relations
- Obtention d'un équivalent par encadrement
- Conservation du signe de la "non-annulation" et de la limite pour les équivalents.

B) Développements limités (en 0)

- Définition du développement limité en 0 à l'ordre $n \in \mathbb{N}$.
- Unicité du développement limité.
- Troncature d'un DL à l'ordre n à l'ordre $k \leq n$.
- Utilisation de la parité/imparité des fonctions dans les DL.
- Opérations sur les DL(somme, multiplication par un scalaire, produit et composée).
- Développement limité usuels
- Méthode de DL pour un quotient.

C) Développement limité en un point réel adhérent à l'intervalle de définition de la fonction

- Définition
- Lien avec le DL en 0.

D) Existence de développements limités

- Primitivation de DL
- Formule de Taylor-Young
- Développements limités usuels et leur preuve
- Développement limité à l'ordre 3 de la tangente

E) Applications des développements limités

- Recherche d'équivalents en un point et signe de la fonction au voisinage du point.
- Position locale de la courbe par rapport à sa tangente
- Existence ou non d'extremum local au point A.
- Calcul de dérivées (par Taylor-Young).

F) Développements asymptotiques

- Observés sous le prisme de certains exemples

E) Comparaisons avec les suites

- Définitions et propriétés maintenues par rapport à l'étude des fonctions.
- Des suites extraites (pour la même extractrice) de 2 suites équivalentes sont équivalentes.
- Formule de Stirling (admis)
- Développement asymptotique du logarithme de la factorielle.

Chapitre 22 : Espaces vectoriels (1)

A) Premières définitions

- Loi externe
- Définition espace vectoriel, et caractérisation équivalentes
- Espaces vectoriels usuels
- Produit d'espaces vectoriels
- Règles de calculs (pour les neutres et opposés) dans un espace vectoriels
- Combinaison linéaire d'éléments d'un espace vectoriel et stabilité des espaces vectoriels par combinaisons linéaires (finies). Famille presque nulles.

B) Sous-espaces vectoriels

- Définition et caractérisation
- Exemples usuels de Sous-espaces vectoriels.
- Sous espace vectoriel engendré par une partie ou une famille (et opérations sur ces espaces).
- Droite et plans vectoriels.
- Modification d'une famille de vecteurs laissant stable son espace vectoriel engendré.
- Intersection de sous espaces vectoriels.

C) Somme de 2 sous espaces vectoriels.

- définition de $F + G$ comme $(F \cup G)$ et première caractérisation.
- Ecriture des vecteurs de $F + G$ comme somme (pas forcément unique) d'un élément de F et d'un élément de G .

Questions de cours :

- Preuve de la primitivation d'un développement limité et calcul du développement limité à l'ordre 5 de $x \mapsto \arctan(x)$ et à l'ordre 3 $x \mapsto \tan(x)$.
- Preuve de la formule de Taylor-Young et application au calcul de développement limité de la fonction $x \mapsto \exp(x)$ et $x \mapsto \cos(x)$ et une fonction au choix du colleur.
- Pour cette question on admettra le lien entre existence de développements limité à l'ordre 0 (resp.1) d'une fonction en un point a et sa continuité (resp sa dérivabilité) et on montrera le résultat suivant, puis on l'appliquera à l'étude de $x \mapsto \frac{e^x}{\sqrt{1+x^2}}$ au voisinage de 0. :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $a \in I$ et soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé fixé. On suppose que f admet un développement limité à l'ordre $n \geq 2$ en a de la forme :

$$\forall x \in I, f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_n(x-a)^n + o_{x \rightarrow a}((x-a)^n),$$

avec $a_n \neq 0$. Alors f est dérivable en a , $a_0 = f(a)$, $a_1 = f'(a)$ et :

- 1) L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en $(a, f(a))$ est $(T_a) : y = a_0 + a_1(x-a)$;
- 2) La position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à (T_a) au voisinage de $(a, f(a))$ dépend du signe de a_n et de la parité de n :
 - si n est pair, alors $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (T_a) si $a_n > 0$ et en dessous si $a_n < 0$;
 - si n est impair, alors $\mathcal{C}_f$ traverse (T_a) en $(a, f(a))$, qui est donc un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
- Calcul du développement asymptotique de $x \mapsto \frac{1}{\sin(x)}$ en 0 ainsi que du développement asymptotique de $x \mapsto \frac{x}{1+\exp \frac{1}{x}}$ en $+\infty$. On demandera aussi de redonner la formule de Stirling.
- Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $(A, B) \subset E$. On prouvera les propriétés suivantes :
 - 1) $A \subset \text{Vect}(A)$ avec égalité si et seulement si A est un sous-espace vectoriel de E .
 - 2) Si $A \subset B$ et B espace vectoriel, alors $\text{Vect}(A) \subset B$.
 - 3)
$$\text{vect}(\text{vect}(A)) = \text{vect}(A);$$
 - 4)
$$\text{vect}(\text{vect}(A) \cup B) = \text{vect}(A \cup B)$$
 - 5)
$$\text{vect}(A \cup B) = \text{vect}(A) \iff B \subset \text{vect}(A)$$
- Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel, F et G 2 sous-espaces vectoriels de E . On montrera que :
 - 1) (Commutativité) $F + G = G + F$;
 - 2) (Élément neutre) $\{0\} + F = F = F + \{0\}$;
 - 3) (Associativité) $(F + G) + H = F + (G + H)$;
 - 4) (Élément absorbant) $E + F = E = F + E$.
 - 5) $\forall x \in E, x \in F + G \iff x = x_F + x_G, x_F \in F, x_G \in G$.