DM 9

Intégration

Correction

Simon Dauguet
simon.dauguet@gmail.com

Pour le Mardi 27 Mai 2025

1. Application.

On considère la suite (u_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+n}$ et la suite (v_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*$,
 $v_n = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{2k+1}$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\frac{k}{n} + 1} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(k/n)$$

où $f(t) = \frac{1}{1+t}$ définie sur $[0, 1]$ et continue (en fait $\mathcal{C}^\infty$, mais la continuité seule nous suffit).

Donc la suite (u_n) est la suite des sommes de Riemann de la fonction f . Elle converge donc vers
 $\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = [\ln(1+t)]_0^1 = \ln(2)$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} u_{2n} &= \sum_{k=0}^{2n-1} \frac{1}{k+2n} \\ &= \sum_{\substack{0 \leq k \leq 2n-1 \\ k \text{ impair}}} \frac{1}{k+2n} + \sum_{\substack{0 \leq k \leq 2n-1 \\ k \text{ pair}}} \frac{1}{k+2n} \\ &= \sum_{0 \leq 2p+1 \leq 2n-1} \frac{1}{2p+2n+1} + \sum_{0 \leq 2p \leq 2n-1} \frac{1}{2p+2n} \\ &= \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{2p+2n+1} + \frac{1}{2} \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{p+n} \\ &= \sum_{p=n}^{2n-1} \frac{1}{2p+n} + \frac{1}{2} u_n \\ &= v_n + \frac{1}{2} u_n \end{aligned}$$

(c) On a donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = u_{2n} - \frac{1}{2} u_n$. Or la suite (u_n) est convergente de limite $\ln(2)$, donc la sous suite (u_{2n}) est aussi convergente et de même limite. Puis (v_n) est alors une combinaison linéaire de deux suites convergentes. Mais l'ensemble des suites réelles convergentes est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel sur lequel la limite est une forme linéaire. Donc la suite (v_n) est convergente de limite $\ln(2) - \frac{1}{2} \ln(2) = \frac{1}{2} \ln(2)$.

2. Développement asymptotique d'une somme de Riemann.

Dans cette question, f désigne une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur le segment $[0, 1]$ à valeurs réelles.

(a) f étant une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$, elle est en particulier de classe $\mathcal{C}^3$, donc trois fois dérivable de dérivée troisième continue sur $[0, 1]$. Donc $f^{(3)}$ existe et est continue sur $[0, 1]$. Donc, par un corollaire du TVI, $f^{(3)}$ est bornée et atteint ses bornes sur $[0, 1]$. En particulier, $|f^{(3)}|$ est bornée sur $[0, 1]$ et donc, $\exists M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall x \in [0, 1], |f^{(3)}(x)| \leq M$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

i. Soit $t \in [k/n, (k+1)/n]$. On peut alors appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange entre k/n et t . Mais nous allons repartir de la formule de Taylor avec reste intégral entre t et k/n :

$$f(t) = f(k/n) + f'(k/n)(t - k/n) + \frac{1}{2}f''(k/n)(t - k/n)^2 + \int_{k/n}^t \frac{f^{(3)}(x)}{2}(t - x)^2 dx$$

Ce qui nous donne

$$\left| f(t) - f\left(\frac{k}{n}\right) - \left(t - \frac{k}{n}\right) f'\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2} \left(t - \frac{k}{n}\right)^2 f''\left(\frac{k}{n}\right) \right| = \left| \int_{k/n}^t \frac{f^{(3)}(x)}{2}(t - x)^2 dx \right|$$

Puis

$$\begin{aligned} \left| \int_{k/n}^t \frac{f^{(3)}(x)}{2}(t - x)^2 dx \right| &\leq \int_{k/n}^t \frac{|f^{(3)}(x)|}{2} |t - x|^2 dx && \text{inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_{k/n}^t \frac{|f^{(3)}(x)|}{2} (t - x)^2 dx && \text{car } x \in [k/n, t] \\ &&& \subset [k/n, (k+1)/n] \\ &&& \subset [0, 1] \\ &\leq \sup_{[0,1]} |f^{(3)}| \int_{k/n}^t \frac{(t - x)^2}{2} dx && \text{Croissance de l'intégrale} \\ &= M \left[-\frac{(t - x)^3}{6} \right]_{x=k/n}^t \\ &= \frac{M}{6} \left(t - \frac{k}{n}\right)^3 \end{aligned}$$

D'où l'on a

$$\left| f(t) - f\left(\frac{k}{n}\right) - \left(t - \frac{k}{n}\right) f'\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2} \left(t - \frac{k}{n}\right)^2 f''\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{6} \left(t - \frac{k}{n}\right)^3 \quad (1)$$

ii. Soit $q \in \mathbb{N}^*$. La primitive de $t \mapsto \left(t - \frac{k}{n}\right)^q$ qui s'annule en k/n est $t \mapsto \int_{k/n}^t \left(x - \frac{k}{n}\right)^q dx$ par théorème fondamental de l'intégration. Et $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\int_{k/n}^t \left(x - \frac{k}{n}\right)^q dx = \left[\frac{1}{q+1} \left(x - \frac{k}{n}\right)^{q+1} \right]_{x=k/n}^{x=t} = \frac{(t - k/n)^{q+1}}{q+1} \quad (2)$$

iii. On a

$$\begin{aligned} &\left| \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t) dt - \frac{1}{n} f(k/n) - \frac{1}{2n^2} f'(k/n) - \frac{1}{6n^3} f''(k/n) \right| \\ &= \left| \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t) dt - f\left(\frac{k}{n}\right) \int_{k/n}^{(k+1)/n} dt - f'\left(\frac{k}{n}\right) \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(t - \frac{k}{n}\right) dt - \frac{f''(k/n)}{2} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(t - \frac{k}{n}\right)^2 dt \right| \\ &&& \text{par (2)} \\ &= \left| \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(f(t) - f\left(\frac{k}{n}\right) - \left(t - \frac{k}{n}\right) f'\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2} \left(t - \frac{k}{n}\right)^2 f''\left(\frac{k}{n}\right) \right) dt \right| && \text{lin int} \\ &\leq \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left| f(t) - f\left(\frac{k}{n}\right) - \left(t - \frac{k}{n}\right) f'\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2} \left(t - \frac{k}{n}\right)^2 f''\left(\frac{k}{n}\right) \right| dt && \text{inéga tri} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \int_{k/n}^{(k+1)/n} \frac{M}{6} \left(t - \frac{k}{n}\right)^3 dt && \text{cf (1) et croiss int} \\
&= \frac{M}{6} \left[\frac{1}{4} \left(t - \frac{k}{n}\right)^4 \right]_{t=k/n}^{t=(k+1)/n} && \text{par (2)} \\
&= \frac{M}{24n^4}
\end{aligned}$$

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a

$$\begin{aligned}
&\left| \int_0^1 f(t)dt - S_n(f) - \frac{1}{2n} S_n(f') - \frac{1}{6n^2} S_n(f'') \right| \\
&= \left| \int_0^1 f(t)dt - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n^2} \sum_{k=0}^{n-1} f'\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{6n^3} \sum_{k=0}^{n-1} f''\left(\frac{k}{n}\right) \right| \\
&= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left(\int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t)dt - \frac{1}{n} f(k/n) - \frac{1}{2n^2} f'(k/n) - \frac{1}{6n^3} f''(k/n) \right) \right| && \text{Chasles} \\
&\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t)dt - \frac{1}{n} f(k/n) - \frac{1}{2n^2} f'(k/n) - \frac{1}{6n^3} f''(k/n) \right| && \text{inéga tri} \\
&\leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{M}{24n^4} && \text{cf 2(b)iii} \\
&= \frac{M}{24n^3}
\end{aligned}$$

(d) On définit la suite (ε_n) par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \varepsilon_n = n^2 \left(S_n(f) + \frac{1}{2n} S_n(f') + \frac{1}{6n^2} S_n(f'') - \int_0^1 f(t)dt \right)$$

D'après la question précédente, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |\varepsilon_n| \leq \frac{M}{24n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc (ε_n) est une suite convergente de limite nulle (par théorème des gendarmes).

On en déduit alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
\frac{\varepsilon_n}{n^2} &= S_n(f) + \frac{1}{2n} S_n(f') + \frac{1}{6n^2} S_n(f'') - \int_0^1 f(t)dt \\
\iff S_n(f) &= \int_0^1 f(t)dt - \frac{1}{2n} S_n(f') - \frac{1}{6n^2} S_n(f'') + \frac{\varepsilon_n}{n^2} && (3)
\end{aligned}$$

(e) On peut suivre le même raisonnement pour f' et f'' qui sont deux fonctions continues sur $[0, 1]$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$\varepsilon'_n = n \left(S_n(f') + \frac{1}{2n} S_n(f'') - \int_0^1 f'(t)dt \right)$$

On a alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
|n\varepsilon'_n| &= n \left| S_n(f') + \frac{1}{2n} S_n(f'') - \int_0^1 f'(t)dt \right| \\
&= n \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f'\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2n^2} \sum_{k=0}^{n-1} f''\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f'(t)dt \right|
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= n \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{n} f' \left(\frac{k}{n} \right) + \frac{1}{2n^2} f'' \left(\frac{k}{n} \right) - \int_{k/n}^{(k+1)/n} f'(t) dt \right) \right| && \text{Chasles} \\
&= n \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(f' \left(\frac{k}{n} \right) + \left(t - \frac{k}{n} \right) f'' \left(\frac{k}{n} \right) - f'(t) \right) dt \right| && \text{cf (2)} \\
&\leq n \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(f' \left(\frac{k}{n} \right) + \left(t - \frac{k}{n} \right) f'' \left(\frac{k}{n} \right) - f'(t) \right) dt \right| && \text{inéga tri} \\
&= n \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(- \int_{k/n}^t f^{(3)}(x)(t-x) dx \right) dt \right| && \text{Taylor reste int} \\
&\leq n \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \int_{k/n}^t |f^{(3)}(x)(t-x)| dx dt && \text{double inéga tri} \\
&\leq n \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \int_{k/n}^t M(t-x) dx dt \\
&= Mn \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left[\frac{-(t-x)^2}{2} \right]_{x=k/n}^{x=t} dt \\
&= Mn \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \frac{1}{2} \left(t - \frac{k}{n} \right)^2 dt \\
&= Mn \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{6n^3} \\
&= \frac{M}{6n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

D'où $\varepsilon'_n = \frac{n\varepsilon'_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et par définition de ε'_n ,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n(f') = \int_0^1 f'(t) dt - \frac{1}{2n} S_n(f'') + \frac{\varepsilon'_n}{n}. \quad (4)$$

On procède de la manière : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$\varepsilon''_n = S_n(f'') - \int_0^1 f''(t) dt$$

Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
|\varepsilon''_n| &= \left| S_n(f'') - \int_0^1 f''(t) dt \right| \\
&= \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f'' \left(\frac{k}{n} \right) - \int_0^1 f''(t) dt \right| \\
&= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{n} f'' \left(\frac{k}{n} \right) - \int_{k/n}^{(k+1)/n} f''(t) dt \right) \right| && \text{Chasles} \\
&= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(f'' \left(\frac{k}{n} \right) - f''(t) \right) dt \right| \\
&= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(- \int_{k/n}^t f^{(3)}(x) dx \right) dt \right| && \text{Taylor reste int} \\
&\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \int_{k/n}^t |f^{(3)}| dx dt && \text{triple inéga tri}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \int_{k/n}^t M dx dt \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} M \left(t - \frac{k}{n} \right) dt \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{M}{2n^2} \\
&= \frac{M}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

Donc $\varepsilon_n'' \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_n(f'') = \int_0^1 f''(t) dt + \varepsilon_n'' \quad (5)$$

(f) On en déduit donc, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n(f) = \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} S_n(f') - \frac{1}{6n^2} S_n(f'') + \frac{\varepsilon_n}{n^2} \quad \text{cf (3)}$$

$$= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \left(\int_0^1 f'(t) dt - \frac{1}{2n} S_n(f'') + \frac{\varepsilon_n'}{n} \right) - \frac{1}{6n^2} S_n(f'') + \frac{\varepsilon_n}{n^2} \quad \text{cf (4)}$$

$$= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{12n^2} S_n(f'') + \frac{2\varepsilon_n - \varepsilon_n'}{2n^2}$$

$$= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{12n^2} \left(\int_0^1 f''(t) dt + \varepsilon_n'' \right) + \frac{2\varepsilon_n - \varepsilon_n'}{2n^2} \quad \text{cf (5)}$$

$$= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{12n^2} \int_0^1 f''(t) dt + \frac{\varepsilon_n'' + 12\varepsilon_n - 6\varepsilon_n'}{12n^2}$$

$$= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{12n^2} \int_0^1 f''(t) dt + \frac{\delta_n}{n^2}$$

en posant $\delta_n = \frac{1}{12}(\varepsilon_n'' + 12\varepsilon_n - 6\varepsilon_n')$.

La suite (δ_n) est donc une combinaison linéaire de suites de limite nulle. C'est donc une suite convergente de limite nulle, par structure d'espace vectoriel et linéarité de la limite.

3. Application

(a) On reprend $f(t) = \frac{1}{1+t}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1]$. On a alors

$$\forall t \in [0, 1], \quad f'(t) = \frac{-1}{(1+t)^2}$$

et

$$\forall t \in [0, 1], \quad f''(t) = \frac{2}{(1+t)^3}$$

Comme f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1]$, on peut appliquer toute la question 2. Et donc on sait qu'il existe une suite (α_n) de limite nulle, telle que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
u_n &= S_n(f) \\
&= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{12n^2} \int_0^1 f''(t) dt + \frac{\alpha_n}{n^2} \\
&= \left[\ln(1+t) \right]_0^1 - \frac{1}{2n} \left[f(t) \right]_0^1 + \frac{1}{12n^2} \left[f'(t) \right]_0^1 + \frac{\alpha_n}{n^2} \\
&= \ln(2) - \frac{1}{2n} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) + \frac{1}{12n^2} \left(-\frac{1}{4} + 1 \right) + \frac{\alpha_n}{n^2} \\
&= \ln(2) + \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} + \frac{\alpha_n}{n^2}
\end{aligned}$$

(b) On a donc

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n - \ln(2) &= \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} + \frac{\alpha_n}{n^2} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{4n} + o(1/n) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4n}\end{aligned}$$

par caractérisation des équivalents par les o .

(c) Enfin, on a

$$\begin{aligned}v_n &= u_{2n} - \frac{1}{2}u_n \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(2) + \frac{1}{8n} + \frac{1}{64n^2} - \frac{1}{2} \left(\ln(2) + \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} \right) + o(1/n^2) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\ln(2)}{2} - \frac{1}{64n^2} + o(1/n^2)\end{aligned}$$

D'où

$$v_n - \frac{\ln 2}{2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{64n^2} + o(1/n^2) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{64n^2}$$

par caractérisation des équivalents.