



Chapitre 18 - TD : Développements Limités

Simon Dauguet
simon.dauguet@gmail.com

3 février 2026

1 DL

Exercice 1 :

Déterminer les DL des fonctions indiquées au points indiqués et à l'ordre indiqués. Bref, faire ce qu'on demande.

- | | |
|--|---|
| 1. $\text{DL}_4(1)$: $\frac{\ln x}{x^2}$ | 2. $\text{DL}_5(0)$: $\text{sh}(x) \text{ch}(2x) - \text{ch}(x)$ |
| 3. $\text{DL}_3(0)$: $\ln\left(\frac{x^2+1}{x+1}\right)$ | 4. $\text{DL}_3(1)$: $\cos(\ln(x))$ |
| 5. $\text{DL}_3(0)$: $\sqrt{3 + \cos x}$ | 6. $\text{DL}_3(0)$: $\ln(1 + \sqrt{1 + x})$ |
| 7. $\text{DL}_2(0)$: $(1 + x)^{1/x}$ | 8. $\text{DL}_3(0)$: $\frac{\ln(1+x)}{e^x-1}$ |
| 9. $\text{DL}_2(0)$: $\frac{\arctan x}{\tan x}$ | 10. $\text{DL}_2(0)$: $\frac{\sin x}{e^x-1}$ |
| 11. $\text{DL}_3(1)$: $\frac{x-1}{\ln(x)}$ | 12. $\text{DL}_4(0)$: $\ln\left(\frac{\text{sh}(x)}{x}\right)$ |
| 13. $\text{DL}_4(0)$: $\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)$ | 14. $\text{DL}_3(0)$: $\ln(2 + \sin(x))$ |
| 15. $\text{DL}_3(0)$: $\ln(1 + e^x)$ | 16. $\text{DL}_6(\pi)$: $\ln(2 + \cos(x))$ |
| 17. $\text{DL}_3(0)$: $\frac{x \text{ch} x - \text{sh} x}{\text{ch} x - 1}$ | 18. $\text{DL}_3(0)$: $\frac{x - \sin x}{1 - \cos x}$ |
| 19. $\text{DL}_4(0)$: $e^{\cos x}$ | 20. $\text{DL}_7(0)$: $x(2 + \cos x) - 3 \sin x$ |
| 21. $\text{DL}_5(a)$: $x^a - a^a$ | 22. $\text{DL}_7(0)$: $\arctan\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$ |
| 23. $\text{DL}_2(0)$: $\frac{\cos(\sin(x)) - \cos(x)}{x^4}$ | 24. $\text{DL}_3(\pi/2)$: $\frac{1 + \ln(\sin(x)) - \sin(x)}{\cos(x)^4}$ |

Exercice 2 :

Déterminer les DL des fonctions suivantes :

1. $\text{DL}_2(0)$ de $x \mapsto (1 + \arctan x)^{\frac{x}{\sin(x)^2}}$
2. $\text{DL}_2(a)$ de $x \mapsto \frac{x^a - a^x}{\arctan(x) - \arctan(a)}$.

3. $\text{DL}_2(2)$ de $x \mapsto \left(\frac{2^x+3^x}{2^{x+1}+5^{x/2}}\right)^{\frac{1}{2-x}}$.
4. $\text{DL}_4(0)$ de $x \mapsto \frac{e^{1-\sin(x)} - e^{1-\tan(x)}}{\tan(x) - \sin(x)}$.

Exercice 3 :

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{\ln(e^x-1)}}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\arctan\left(\frac{x+1}{x+2}\right) - \arctan\left(\frac{x}{x+2}\right) \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{1/x}}{e}\right)^{1/x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)^{\frac{1}{\ln(x)}}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan(x)} - \sqrt{1+\sin(x)}}{x^3}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin(x)) - \cos(x)}{1 - \cos(\sin(x^2))}$

Exercice 4 :

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer le $\text{DL}_n(0)$ de

$$x \mapsto \ln\left(\sum_{k=0}^n x^k\right)$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le $\text{DL}_n(0)$ de $x \mapsto \ln\left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!}\right)$

Exercice 5 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le $\text{DL}_{2n+2}(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. On pourra commencer par calculer la dérivée de cette fonction.

Exercice 6 :

Montrer que l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = xe^{x^2}$ admet une réciproque définie sur \mathbb{R} et former le $\text{DL}_5(0)$ de f^{-1} .

On utilisera le fait que $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

Exercice 7 :

Déterminer les réels a, b tels que

$$f(x) = \cos(x) - \frac{1+ax^2}{1+bx^2}$$

ait une partie principale en 0 la plus petite possible (donc d'un ordre le plus grand possible).

2 Théorème satanique, le retour !

Exercice 8 :

Soit $f :]-1, 0[\cup]0, +\infty[$ définie par

$$f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

Montrer que f peut être prolongée par continuité en 0. Montrer alors que f est de classe C^1 sur $] -1, +\infty [$. Quelle est la position relative de f par rapport à sa tangente en 0 ?

Exercice 9 (sinus cardinal) :

On définit le sinus cardinal, noté sinc , par $\text{sinc} : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$.

Montrer que φ peut être prolongée en une fonction de classe C^1 sur \mathbb{R} , bornée dont le maximum est atteint en 0 et qui vaut 1.

Le sinus cardinal est une fonction classique qui intervient beaucoup en physique.

Exercice 10 :

Montrer que la fonction

$$f : x \mapsto \frac{\tan(x) - x}{x^3}$$

peut être prolongée en une fonction C^1 sur $]-\pi/2, \pi/2[$.

Exercice 11 (Exemple de fonction non nulle ayant un $\text{DL}_n(0)$ nul) :

Soit la fonction

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Montrer que f est C^∞ et déterminer le $\text{DL}_n(0)$ de f pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 12 :

soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^{1+1/x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } 0 \end{cases}$$

On note \mathcal{C} sa courbe représentative.

1. Montrer que f est continue en 0
2. f est-elle dérivable en 0 ?
3. Étudier les variations de f
4. Déterminer le $\text{DL}_3(1)$ de f
5. Préciser l'équation de la tangente \mathcal{T} à \mathcal{C} au point d'abscisse 1. Préciser la position relative de \mathcal{C} par rapport à \mathcal{T} .

Exercice 13 (Physique : Optique ondulatoire) :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_n : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{\sin(x)}$.

1. Donner le domaine de définition de f_n .
2. Montrer que $\forall k \in \mathbb{Z}$, f_n est prolongeable par continuité en $k\pi$. On considérera f_n ainsi prolongée.
3. Montrer que $\forall k \in \mathbb{Z}$, f_n est dérivable en $k\pi$ et donner sa dérivée en ce point.
4. Étudier la parité de f_n .
5. Étudier la périodicité de f_n .
6. Montrer que f_n est de classe C^1 .
7. Étudier les maximums de $|f_n|$.
8. Montrer que la largeur des pics d'extremums sont de plus en plus fins en fonction de n (on appelle pic la distance entre les deux zéros de f_n encadrant un extremum). Autrement dit, montrer que la largeur des pics tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.