



Chapitre 29 - TD : Probabilité

Simon Dauguet
simon.dauguet@gmail.com

mardi 2 juin, 2026

1 Mise en jambes

Exercice 1 :

Soit A, B, C trois événements d'une espace probabilisable Ω . Exprimer les événements suivants :

1. Aucun des événements A, B ou C n'est réalisé.
2. Un seul des trois événements A, B ou C est réalisé.
3. Au moins deux des trois événements A, B ou C sont réalisés.
4. Pas plus de deux des trois événements A, B ou C ne sont réalisés.

Exercice 2 :

Soit A, B, C trois événements d'un espace probabilisable Ω .

1. Vérifier que $(A \cup B) \cap C$ entraîne $A \cup (B \cap C)$
2. A quelle condition sur les événements A et C , les événements précédents sont-ils égaux ?

Exercice 3 :

Soit $\Omega = \{1, \dots, n\}$.

1. Déterminer une probabilité \mathbb{P}_1 sur Ω telle que la probabilité de l'événement $\{k\}$ soit proportionnelle à k .
2. Déterminer une probabilité \mathbb{P}_2 sur Ω telle que la probabilité de l'événement $\{1, \dots, k\}$ soit proportionnelle à k^2 .

Exercice 4 :

Soit a, b, c trois éléments distincts d'un ensemble quelconque. A quelle(s) condition(s) sur $x, y \in \mathbb{R}$ existe-t-il une probabilité sur $\Omega = \{a, b, c\}$ vérifiant

$$\mathbb{P}(\{a, b\}) = x \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\{b, c\}) = y$$

Exercice 5 :

Soit A, B deux parties d'un ensemble fini Ω vérifiant

$$A \cap B \neq \emptyset, \quad A \cap \bar{B} \neq \emptyset, \quad \bar{A} \cap B \neq \emptyset, \quad \bar{A} \cap \bar{B} \neq \emptyset$$

A quelle condition sur $(a, b, c, d) \in]0, 1[^4$ existe-t-il une probabilité \mathbb{P} sur Ω vérifiant

$$\mathbb{P}(A|B) = a, \quad \mathbb{P}(A|\bar{B}) = b, \quad \mathbb{P}(B|A) = c, \quad \mathbb{P}(B|\bar{A}) = d$$

Exercice 6 :

On dispose de r boules à l'intérieur de n urnes avec $r \leq n$. Chaque urne pouvant contenir plusieurs boules. On suppose qu'on a équiprobabilité.

1. Déterminer la probabilité de l'événement

A : "chaque urne contient au plus une boule"

2. De même avec

B : "Il existe une urne contenant au moins deux boules"

Exercice 7 :

1. Combien de fois faut-il lancer un dé équilibré pour avoir au moins une chance sur deux d'obtenir un six ?
2. Même question avec deux dés pour obtenir un double six ?

Exercice 8 :

Une urne contient des boules numérotées de 1 à 10. On tire sans remise trois boules dans cette urne.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir des numéros en ordre croissant ?
2. Même question pour un tirage avec remise et des numéros en ordre strictement croissant ?
3. Même question pour un tirage avec remise et des numéros en ordre croissant au sens large ?

Exercice 9 :

Soit $\Omega = \mathfrak{S}_n$ muni de la loi uniforme \mathbb{P} .

Déterminer la probabilité que 1 et n soient dans la même orbite d'une permutation.

Exercice 10 :

Une urne contient $2n$ boules numérotées de 1 à $2n$. On tire toutes les boules successivement et sans remise.

1. Déterminer la probabilité que l'on tire les boules de numéros impairs dans l'ordre croissant, non nécessairement successivement (exemple : 8,2,1,3,6,4,5,7).
2. Déterminer la probabilité que l'on tire les boules de numéros impairs dans l'ordre croissant et consécutivement (exemple : 8,2,1,3,5,7,6,4).

Exercice 11 :

On considère un jeu de n cartes numérotées de 1 à n . On mélange les cartes.

1. Quelle est la probabilité que la carte 1 soit plus loin dans le paquet que la carte 2 ?
2. Quelle est la probabilité que les cartes 1 et 2 soient voisines ?

Exercice 12 (Paradoxe des anniversaires) :

Vous êtes dans une classe de 30 élèves. Votre prof de maths veut parier avec vous qu'au moins deux personnes de la classe ont leur anniversaire qui tombe le même jour (sans tenir compte de l'année).

Acceptez-vous le pari ?

2 Proba conditionnelles

Exercice 13 :

Soit A et B deux événements avec $\mathbb{P}(A) > 0$. Comparer les probabilités conditionnelles

$$\mathbb{P}(A \cap B | A \cup B) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A \cap B | A)$$

Exercice 14 :

Soit A, B, C trois événements avec $\mathbb{P}(B \cap C) > 0$. Vérifier

$$\mathbb{P}(A | B \cap C) \mathbb{P}(B | C) = \mathbb{P}(A \cap B | C)$$

Exercice 15 :

Soit (Ω, \mathbb{P}) un espace probabilisé fini, A, B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) > 0$.

Montrer que

$$\mathbb{P}(A \cap B | A \cup B) \leq \mathbb{P}(A \cap B | A).$$

Exercice 16 () :**

Soit (Ω, \mathbb{P}) un espace probabilisé fini. Soit A, B deux événements. Montrer que

$$|\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \leq \frac{1}{4}.$$

Exercice 17 :

On considère N coffres avec une probabilité p qu'un trésor a été placé dans l'un de ces coffres, chaque coffre pouvant être choisi de façon équiprobable. On a ouvert $N - 1$ coffres dans trouver le trésor. Quelle est la probabilité pour qu'il figure dans le dernier coffre ?

Exercice 18 :

Gauss a une boîte à gâteaux contenant 8 cookies choco-pépites et 2 cookies caramel au beurre salé. Il pioche trois cookies dans la boîte et le mange à chaque tirage.

1. Quelle est la probabilité qu'il mange au moins un cookie au caramel ?
2. Sachant qu'il a mangé un cookie au caramel, quelle est la probabilité que le premier cookie mangé soit au caramel ?

Exercice 19 :

Une famille possède deux enfants.

1. Quelle est la probabilité que les deux soient des garçons ?
2. Quelle est cette probabilité sachant que l'aîné est un garçon ?
3. On sait que l'un des deux enfants est un garçon. Quelle est la probabilité que le deuxième le soit aussi ?
4. On sait que l'un des deux enfants est un garçon et est né un 29 février. Quelle est la probabilité que le deuxième soit un garçon ?

Exercice 20 :

5 cartes d'un jeu de 52 sont servies à un joueur de Poker.

1. Quelle est la probabilité que celle-ci comporte exactement une paire d'As?
2. Même question sachant que le jeu distribué comporte au moins un As?

Exercice 21 (Urnes de Polya) :

Une urne contient initialement b boules blanches et r boules rouges. On tire de celle-ci une boule, on note sa couleur et on la remet accompagnée de d boules de la même couleur. On répète l'expérience autant de fois qu'on en a envie.

Déterminer la probabilité que la boule tirée soit blanche lors du n -ème tirage.

Exercice 22 :

Une succession d'individus A_1, \dots, A_n se transmet une information binaire du type "oui" ou "non" (ou 0 ou 1). Chaque individu A_k transmet l'information qu'il a reçu avec la probabilité p à l'individu A_{k+1} ou la transmet en son inverse avec la probabilité $1 - p$. Chaque individu se comporte indépendamment des autres.

Calculer la probabilité p_n pour que l'information reçue par A_n soit identique à celle émise par A_1 .

On suppose que $0 < p < 1$. Quelle est la limite de p_n quand $n \rightarrow +\infty$?

Exercice 23 :

Soit (Ω, \mathbb{P}) un espace probabilisé fini, $A \subset \Omega$ et (A_1, \dots, A_n) un système complet d'évènement de A tel que $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \mathbb{P}(A_k) \neq 0$. Soit $B \subset \Omega$ tel que $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \mathbb{P}(B|A_k)$ ne dépende pas de k .

Montrer que $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \mathbb{P}(B|A_k) = \mathbb{P}(B|A)$.

Exercice 24 () :**

Soit (Ω, \mathbb{P}) un espace probabilisé fini. Soit A, B, C trois évènements tels que

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{5}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{5}, \quad \mathbb{P}(C|A) = \mathbb{P}(C|B) = \frac{1}{2}.$$

Calculer $\mathbb{P}(C)$ sachant que $\mathbb{P}(C)$ est l'inverse d'un entier.

Exercice 25 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Une urne contient b boule blanche et c boules de couleur. On fait un tirage avec les règles suivantes :

- Si la boule tirée est blanche, on la retire définitivement de l'urne.
- Si la boule tirée est colorée, on la replace dans l'urne.

Déterminer la probabilité d'obtenir exactement une boule blanche en n tirages.

3 Événements indépendants

Exercice 26 :

Montrer qu'un évènement A est indépendant de tout autre évènement ssi $\mathbb{P}(A) = 0$ ou $\mathbb{P}(A) = 1$

Exercice 27 :

On suppose $A \cap B = \emptyset$. A quelle condition les évènements A et B sont-ils indépendants?

Exercice 28 :

Soit (Ω, \mathbb{P}) un espace probabilisé fini tel que $p = \text{Card}(\Omega)$ soit un nombre premier et \mathbb{P} la probabilité uniforme. Montrer que deux événements A et B non trivial (i.e. $0 < \mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) < 1$) ne peuvent être indépendants.

Exercice 29 :

Soit A, B, C trois événements tels que A et $B \cup C$ sont indépendants, ainsi que A et $B \cap C$. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 30 :

Soit A, B, C trois événements. On suppose A indépendant de $B \cap C$ et B indépendant de $A \cap C$ et C indépendant de $A \cap B$. On suppose aussi que A est indépendant de $B \cup C$ et $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B), \mathbb{P}(C) > 0$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$.
2. À l'aide d'une disjonction de cas, établir que les événements A, B, C sont mutuellement indépendants.

Exercice 31 :

Soit (Ω, \mathbb{P}) un espace probabilisé fini.

Montrer qu'il n'existe pas d'événements A_1, \dots, A_n mutuellement indépendants, de réunion Ω et de même probabilité $p \in]0, 1[$.

Exercice 32 :

On considère une pièce pipée dont la probabilité de tomber sur Pile est $p \in]0, 1[$. On lance la pièce trois fois successivement. On nomme A l'événement "Les deux premiers lancers donnent le même résultat" et B l'événement "Les deux derniers lancers donnent le même résultat".

Déterminer $p \in]0, 1[$ pour que les événements A et B soient indépendants.

Exercice 33 (*) :**

Soit $n \geq 2$ un entier. On définit une probabilité uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. Pour un entier p divisant n , on introduit l'événement

$$A_p = \{1 \leq k \leq n, p|k\}$$

1. Calculer $\mathbb{P}(A_p)$
2. Soit p et q deux diviseurs de n . On suppose p et q premiers entre eux. Montrer que les événements A_p et A_q sont indépendants.
Plus généralement, montrer que si p_1, \dots, p_r sont des diviseurs deux à deux premiers entre eux, alors les événements A_{p_1}, \dots, A_{p_r} sont mutuellement indépendants.

3. On note

$$B = \{1 \leq k \leq n, \text{pgcd}(k, n) = 1\}$$

Montrer que

$$\mathbb{P}(B) = \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|n}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

4. [Fonction indicatrice d'Euler] On note $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ la fonction indicatrice d'Euler définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n)$ est le nombre d'entiers $k \in \{1, \dots, n\}$ tels que $k \wedge n = 1$.

Donner une expression de $\varphi(n)$ en fonction de n .

Exercice 34 :

Soit A_1, \dots, A_n des événements mutuellement indépendants. Montrer que la probabilité qu'aucun des A_i ne soit réalisé est inférieure à

$$e^{-\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)}$$

Exercice 35 (Inégalités de Boole-Fréchet) :

Soit (Ω, \mathbb{P}) un espace probabilisé fini. Soit A_1, \dots, A_n des événements de Ω .

1. Montrer que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - n + 1.$$

2. Montrer que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \leq \min_{1 \leq i \leq n} \mathbb{P}(A_i).$$

Que peut-on dire dans le cas d'égalité ?

4 Pot-Pourri

Exercice 36 :

Il est bien connue que dans une population de cygne, se cache toujours un vilain petit canard. Des scientifiques établissent qu'autour d'un certain lac (le Lac des Cygnes ...), un œuf sur 10 000 est un vilain petit canard. Mélusine, la bonne fée, veut mettre en place un sortilège pour savoir si un œuf sera un vilain petit canard.

Le sortilège est positif chez 99% des œufs mais aussi faussement positif chez 0.1% des œufs de cygnes. Un œuf est testé et a un résultat positif.

Quelle est la probabilité que ce soit l'œuf d'un vilain petit canard ? Qu'en conclure ?

Exercice 37 :

Une pochette contient deux dés. L'un est parfaitement équilibré, mais le second donne un 6 une fois sur 2, les autres faces étant équilibrées.

On tire au hasard un dé de la pochette et on le lance.

1. On obtient un 6. Quelle est la probabilité que le dé tiré soit équilibré ?
2. Au contraire, on a eu un 5. Même question ?

Exercice 38 :

Dans une entreprise, 1% des articles produits sont défectueux. Un contrôle qualité permet de refuser 95% des articles défectueux mais aussi de refuser 2% des articles acceptables.

1. Quelle est la probabilité qu'il y ait une erreur de contrôle ?
2. Quelle est la probabilité qu'un article accepté soit en réalité défectueux ?

Exercice 39 (Loi de succession de Laplace) :

On considère $n + 1$ urnes numérotées de 0 à n telles que l'urne $k \in \{0, \dots, n\}$ contienne $n - k$ boules noires et k boules blanches. On choisit une urne au hasard et on effectue des tirages avec remise au hasard dans cette urne.

1. Déterminer la probabilité p_n que les $N \in \mathbb{N}^*$ premiers tirages amènent des boules blanches. Déterminer la limite de p_n .
2. Déterminer la probabilité q_n que la $(N + 1)$ -ème boule tirée soit noire, sachant que les N premières boules tirées étaient blanches. Déterminer la limite de q_n .

Exercice 40 (Loi de Hardy-Weinberg) :

Considérons un gène qui se présente sous deux allèles A et a dans une population donnée. Un individu dispose de deux allèles d'un même gène, donc AA , Aa ou aa . Un individu reçoit un allèle de chacun de ses parents au hasard.

Notons p, q, r les proportions des génotypes dans une génération et P, Q, Q les proportions des mêmes génotypes dans la génération suivante. Montrer que $Q^2 = 4PR$.