

Fiche 40 : TD du 18-01.

Exercice 1

Soit $n \geq 2$ un entier fixé et $f : \mathbb{R}^+ = [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par la formule suivante :

$$f(x) = \frac{1 + x^n}{(1 + x)^n}, \quad x \geq 0.$$

1. Étudier la fonction f
2. En déduire l'inégalité suivante :

$$(1 + x)^n \leq 2^{n-1}(1 + x^n), \quad \forall x \in \mathbb{R}^+.$$

3. Montrer que si $x \in \mathbb{R}^+$ et $y \in \mathbb{R}^+$ alors on a

$$(x + y)^n \leq 2^{n-1}(x^n + y^n).$$

Exercice 2

$$\text{Soit } f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto e^x \text{ si } x < 0 \\ x \mapsto ax^2 + bx + c \text{ sinon} \end{cases}$$

Déterminer a, b, c pour que f soit C^2 (et C^3 ?).

Exercice 3

À l'aide de la formule de Leibnitz écrire les dérivées successives des fonctions :

$$x \mapsto x^2 e^x \quad ; \quad x \mapsto x^2(1+x)^n \quad ; \quad x \mapsto \frac{x^2+1}{(x+1)^2} \quad ; \quad x \mapsto x^{n-1} \ln x.$$

Exercice 4

Étudier la dérivabilité sur \mathbb{R} des applications suivantes :

$$f : x \mapsto x|x|, \quad g : x \mapsto \frac{x}{1+|x|}, \quad h : x \mapsto \frac{1}{1+|x|}.$$

Exercice 5

Soit f de classe C^1 sur \mathbb{R} vérifiant pour tout x réel, $f \circ f(x) = \frac{x}{2} + 3$. En remarquant que $f(\frac{x}{2} + 3) = \frac{f(x)}{2} + 3$, montrer que f' est constante puis déterminer f .