

# CHAPITRE B4

## CONTINUITÉ ET DÉRIVABILITÉ

### Objectifs

- Notions de limite et de continuité en un point, à droite, à gauche.
- Fonctions continues et prolongements par continuité.
- Approche locale de la dérivabilité.
- Étude globale des fonctions continues, dérivables.

## 1 Limites, continuité

Les notions de ce chapitre sont présentées pour une fonction définie sur un intervalle de  $\mathbb{R}$ . Elles s'étendent (dans une mesure que l'on précisera) aux fonctions définies sur un domaine qui s'en rapproche ou s'y ramène simplement (par exemple  $\mathbb{R}^*$  comme union de deux intervalles, *etc.*).

Dans toute la suite, on considère un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$ .

**Notation.**  $\overline{\mathbb{R}}$  désigne  $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ . On désigne par  $\overline{I}$  l'intervalle  $I$  incluant ses bornes si elles sont finies. Par exemple  $\overline{]0, 1[} = [0, 1]$ .



## 1.1 Étude locale

**Définition B4.1**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$ . Soit  $a$  un élément ou une extrémité de  $I$  et soit  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . On dit que  $f(x)$  **tend vers**  $\ell$  **quand**  $x$  **tend vers**  $a$  et on note  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  lorsque,

- pour  $a \in \mathbb{R}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$ ,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap ]a - \eta, a + \eta[, |f(x) - \ell| < \varepsilon,$$

- pour  $a \in \mathbb{R}$  et  $\ell = +\infty$ ,

$$\forall M > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap ]a - \eta, a + \eta[, f(x) > M,$$

- pour  $a = +\infty$  et  $\ell = +\infty$ ,

$$\forall M > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I \cap [A, +\infty[, f(x) > M,$$

- pour  $a = -\infty$  et  $\ell \in \mathbb{R}$ ,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I \cap ]-\infty, A], |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

**Définition B4.2**

Soit  $f$  définie sur  $I$ .

- Soit  $a \in \overline{I}$ . On dit que  $f$  vérifie la propriété  $\mathcal{P}$  **au voisinage de**  $a$  lorsqu'il existe  $\eta > 0$  tel que  $f$  vérifie la propriété  $\mathcal{P}$  sur  $I \cap ]a - \eta, a + \eta[$ .
- Supposons que  $+\infty$  est au bord de  $I$ . On dit que  $f$  vérifie la propriété  $\mathcal{P}$  **au voisinage de**  $+\infty$  s'il existe  $A > 0$  tel que  $f$  vérifie la propriété  $\mathcal{P}$  sur  $I \cap [A, +\infty[$ .

**Remarques.**

- Il existe bien sûr la même définition si l'on se place au voisinage de  $-\infty$ .
- On peut encore écrire cinq autres définitions de la limite dans les autres cas pour  $a$  et  $\ell$ . Il est indispensable de savoir le faire. On peut aussi utiliser la notion de voisinage pour résumer la définition de  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  en une assertion :

pour tout voisinage  $V$  de  $\ell$ , il existe un voisinage  $W$  de  $a$  tel que pour tout  $x \in I \cap W$ ,  $f(x) \in V$ .

**Proposition B4.3 (Unicité de la limite)**

Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_1$  et  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_2$ , alors  $\ell_1 = \ell_2$ .

**Notation.** On peut donc noter  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ .

**Dém. B4.3**

Supposons  $\ell_1 \neq \ell_2$ . Alors il existe un voisinage  $V_1$  de  $\ell_1$  et un voisinage  $V_2$  de  $\ell_2$  disjoints (par exemple si  $\ell_1$  et  $\ell_2 \in \mathbb{R}$ , on prend  $V_1 = ]\ell_1 - \varepsilon, \ell_1 + \varepsilon[$  et  $V_2 = ]\ell_2 - \varepsilon, \ell_2 + \varepsilon[$  avec  $\varepsilon = \frac{\ell_2 - \ell_1}{2}$ ). Par définition, il existe  $W_1$  voisinage de  $a$  tel que pour tout  $x \in I \cap W_1$ ,  $f(x) \in V_1$ . Et aussi il existe  $W_2$  voisinage de  $a$  tel que pour tout  $x \in I \cap W_2$ ,  $f(x) \in V_2$ . Mais  $W_1 \cap W_2$  est un voisinage (non vide) de  $a$ . Or pour  $x \in W_1 \cap W_2$ ,  $f(x) \in V_1 \cap V_2$ , ce qui est impossible car on les a choisis disjoints.

**Définition B4.4**

Soit  $f$  définie sur  $I$  et  $a \in I$ . On dit que  $f$  est **continue en  $a$**  lorsque  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$ .

**Remarque.** On peut donc traduire cette définition en termes mathématiques :  $f$  est continue en  $a$  lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap ]a - \eta, a + \eta[, |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

**Définition B4.5 (À droite et à gauche)**

Soit  $f$  définie sur  $I$  et  $a$  un élément ou une extrémité de  $I$ .

- (i)
  - Si  $a \neq \sup(I)$ , on dit que  $f$  admet une **limite à droite** en  $a$  lorsque  $f|_{I \cap ]a, +\infty[}$  admet une limite en  $a$ .
  - Si  $a \neq \inf(I)$ , on dit que  $f$  admet une **limite à gauche** en  $a$  lorsque  $f|_{I \cap ]-\infty, a[}$  admet une limite en  $a$ .
- (ii)
  - Si  $a \neq \sup(I)$ , on dit que  $f$  est **continue à droite** en  $a$  lorsque  $f|_{I \cap ]a, +\infty[}$  est continue en  $a$ .
  - Si  $a \neq \inf(I)$ , on dit que  $f$  est **continue à gauche** en  $a$  lorsque  $f|_{I \cap ]-\infty, a[}$  est continue en  $a$ .

**Notations.** On note  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \ell$  et  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} \ell$  ou encore, si on a l'existence de la limite,  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{a^+} f = \ell$ .

**Proposition B4.6**

- (i)  $f$  admet une limite en  $a$  si et seulement si elle admet une limite à droite et à gauche en  $a$  et qu'elles sont égales.
- (ii)  $f$  est continue en  $a \in I$  si et seulement si elle est continue à droite et à gauche en  $a$ .

**Théorème et définition B4.7**

Soit  $a \in I$  et  $f$  définie sur  $I \setminus \{a\}$ . Supposons que  $f$  admette une limite finie  $\ell \in \mathbb{R}$  en  $a$ . Alors on peut définir la fonction

$$\tilde{f}: I \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{a\} \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

Cette fonction est continue en  $a$  et est appelée **prolongement par continuité** de  $f$  en  $a$ .

**1.2 Opérations**

Désormais  $f$  et  $g$  désignent deux fonctions définies sur une partie de  $\mathbb{R}$ . Les limites considérées s'entendent en un point de leur ensemble de définition ou au bord de ce dernier.

**Proposition B4.8**

- (i) Si  $f \xrightarrow{a} \ell \in \mathbb{R}$ , alors  $f$  est bornée au voisinage de  $a$ .
- (ii) Si  $f \xrightarrow{a} \ell > 0$ , alors il existe  $m > 0$  tel que  $f > m$  au voisinage de  $a$ .

**Dém. B4.8**

- (i) On applique la définition avec  $\varepsilon = 1$ . Ceci montre que  $f$  est bornée au voisinage de  $a$  par  $\ell - 1$  et  $\ell + 1$ .
- (ii) Si  $\ell \in \mathbb{R}_+$ , on applique la définition avec  $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$ . Ceci montre que  $f(x) \geq \ell - \ell/2$  dans un voisinage de  $a$ , ce qui est un minorant  $m$  strictement positif.  
Si  $\ell = +\infty$ , on applique la définition avec n'importe quel seuil strictement positif.

**Théorème B4.9 (Opérations algébriques)**

Soit  $f, g$  deux fonctions définies sur  $I$  et  $a \in \bar{I}$ . On suppose que  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_1$  et  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_2$ .

Alors

- (i) pour tous  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $(\alpha f + \beta g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha \ell_1 + \beta \ell_2$ ,
- (ii)  $(fg)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_1 \ell_2$ ,
- (iii)  $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} |\ell_1|$ .
- (iv) avec  $\ell_1 \neq 0$ ,  $(1/f)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1/\ell_1$

**Dém. B4.9**

Démonstration partielle de la première propriété dans le cas où  $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$ .

- (i) Soit  $\varepsilon > 0$ .

Soit  $V_1$  voisinage de  $a$  tel que pour tout  $x \in V_1$ ,  $|f(x) - \ell_1| < \frac{\varepsilon}{2|\alpha|}$ .

Soit  $V_2$  voisinage de  $a$  tel que pour tout  $x \in V_2$ ,  $|g(x) - \ell_2| < \frac{\varepsilon}{2|\beta|}$ .

Soit  $V = V_1 \cap V_2$  voisinage de  $a$ . Alors pour tout  $x \in V$ ,

$$|(\alpha f + \beta g)(x) - \alpha \ell_1 + \beta \ell_2| \leq |\alpha| |f(x) - \ell_1| + |\beta| |g(x) - \ell_2| \leq \varepsilon.$$

#### Théorème B4.10 (Composition)

Si  $f \xrightarrow{a} b$  et  $g \xrightarrow{b} \ell$ , alors  $g \circ f \xrightarrow{a} \ell$ .

#### Corollaire B4.11

Si  $f$  est continue en  $a$  et  $g$  continue en  $f(a)$ , alors  $g \circ f$  est continue en  $a$ .

#### Proposition B4.12 (Compatibilité avec la relation d'ordre)

Si  $f \leq g$  au voisinage de  $a$  et  $f \xrightarrow{a} \ell_1$  et  $g \xrightarrow{a} \ell_2$ , alors  $\ell_1 \leq \ell_2$ .

#### Dém. B4.12

On travaille avec  $g - f$  qui tend vers  $\ell_2 - \ell_1$ . Si  $\ell_1 > \ell_2$ , alors  $\ell_1 - \ell_2 > 0$  et donc  $f - g$  admet un minorant strictement positif dans un voisinage de  $a$ . Ceci contredit l'hypothèse sur le signe de  $g - f$ .

**Remarque.** En particulier, si  $f \leq b$  au voisinage de  $a$  et  $f \xrightarrow{a} \ell$ , alors  $\ell \leq b$ .

#### Théorème B4.13 (Gendarmes)

(i) Si  $g \leq f \leq h$  au voisinage de  $a$  et  $g, h \xrightarrow{a} \ell$ , alors  $f \xrightarrow{a} \ell$ .

(ii) Si  $g \leq f$  au voisinage de  $a$  et  $g \xrightarrow{a} +\infty$ , alors  $f \xrightarrow{a} +\infty$ .

#### Théorème B4.14 (Caractérisation séquentielle de la limite)

On a équivalence entre

(i)  $f \xrightarrow{a} \ell$ ,

(ii) Pour toute suite  $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  telle que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ ,  $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

**Remarque.** On utilise aussi la contraposée de (i) $\Rightarrow$ (ii), notamment pour démontrer qu'une fonction est n'admet pas de limite, ou est discontinue en un point.

**Théorème B4.15 (Variations)**

Soit  $f$  définie sur un intervalle de la forme  $[a, b[$  ou  $]a, b[$  (avec  $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ ) et croissante au voisinage de  $b$ . Alors

soit  $f$  est majorée au voisinage de  $b$ , alors elle admet une limite finie en  $b$ ,

soit  $f \xrightarrow[b]{} +\infty$ .

**Remarque.** On a un résultat similaire avec une fonction décroissante, en remplaçant la majoration par une minoration, et  $+\infty$  par  $-\infty$ .

**1.3 Fonctions continues****Définition B4.16**

On dit qu'une fonction  $f$  est **continue sur**  $I$  lorsqu'elle est continue en tout  $a \in I$ .

**Notation.** On désigne par  $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$  l'algèbre des fonctions continues sur  $I$ .

**Proposition B4.17**

- Soit  $f, g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ . Alors
  - (i) pour tous  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $(\alpha f + \beta g) \in \mathcal{C}(I)$ ,
  - (ii)  $fg \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ ,
  - (iii)  $|f| \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ .
  - (iv)  $\frac{1}{f}$  est continue sur  $I \setminus \{x \in I, f(x) = 0\}$ .
- Soit  $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$  et  $g \in \mathcal{C}(J, \mathbb{R})$  où  $J$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  tel que  $f(I) \subset J$ . Alors  $g \circ f \in \mathcal{C}(I)$ .

**Théorème B4.18 (Valeurs intermédiaires)**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $[a, b] \subset I$ . Si

- $f$  est continue sur  $[a, b]$ ,
- $\gamma$  est compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ ,

alors il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $\gamma = f(c)$ .

**Théorème B4.19**

L'image d'un intervalle (resp. d'un segment) par une fonction continue est un intervalle (resp. un segment).

**Théorème B4.20**

Toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

**Notation.** En particulier  $f$  continue sur  $[a, b]$  atteint son maximum et son minimum, notés  $\max_{x \in [a, b]} f(x)$  et  $\min_{x \in [a, b]} f(x)$ .

**Théorème B4.21**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Si  $f$  est injective, alors  $f$  est strictement monotone.

## 2 Dérivation des fonctions réelles

### 2.1 Dérivabilité

**Définition B4.22**

soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$  différent de  $\inf I$  (resp.  $\sup I$ ).

- (i) On dit que  $f$  est **dérivable à gauche** (resp. **à droite**) en  $a$  lorsque  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  possède une limite finie à gauche (resp. à droite), appelée **nombre dérivé à gauche** (resp. **à droite**).
- (ii) On dit que  $f$  est **dérivable en  $a$**  lorsqu'elle est dérivable à gauche et à droite en  $a$  et que les nombres dérivés à gauche et à droite sont égaux. Dans ce cas, leur valeur commune est appelée **nombre dérivé** de  $f$  en  $a$  et noté  $f'(a)$ .
- (iii)  $f$  est **dérivable sur  $I$**  lorsqu'elle est dérivable en tout point  $a \in I$ . On peut alors définir sur  $I$  la fonction  $f' : x \mapsto f'(x)$  appelée **fonction dérivée** de  $f$ .

**Remarque.** Autrement dit,  $f$  est dérivable en  $a$  si et seulement si son taux d'accroissement admet une limite finie lorsque  $x$  tend vers  $a$  et on a

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

**Définition B4.23**

Étant donné  $f$  une fonction dérivable en  $a$ ,  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative et  $A$  le point de  $\mathcal{C}$  d'abscisse  $a$ , on définit **la tangente** en  $A$  à  $\mathcal{C}$  comme la droite  $\mathcal{T}_a$  d'équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

**Remarque.** Cette droite est (en un sens topologique qu'on ne précisera pas dans le cadre de ce cours) la limite quand  $x$  tend vers  $a$  des droites sécantes à  $\mathcal{C}$  en  $A$  et un point  $M$  d'abscisse  $x$ .


**Proposition B4.24 (Développement limité à l'ordre 1)**

soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ . Alors on a équivalence entre :

- (i)  $f$  est dérivable en  $a$ .
- (ii) Il existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  et une fonction  $\varepsilon$  tels que :

$$\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \quad \text{et} \quad f(x) = f(a) + \alpha(x - a) + (x - a)\varepsilon(x). \quad (\text{B4.1})$$

**Remarque.** L'équation de la condition (B4.1) peut s'écrire

$$f(a + h) = f(a) + f'(a)h + h\varepsilon(h) \quad \text{avec} \quad \varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

**Proposition B4.25**

Si  $f$  est dérivable en  $a$ , alors  $f$  est continue en  $a$ .

**Remarque.** On peut écrire la même propriété à gauche et à droite.

**Proposition B4.26 (Calcul de dérivées)**

soit  $f$  et  $g$  dérivables en  $a$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Alors

- (i)  $\lambda f + \mu g$  est dérivable en  $a$  et  $(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$  ;
- (ii)  $fg$  est dérivable en  $a$  et  $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$  ;
- (iii) si  $g(a) \neq 0$ ,  $\frac{1}{g}$  est dérivable en  $a$  et  $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}$  ;
- (iv) si  $g(a) \neq 0$ ,  $\frac{f}{g}$  est dérivable en  $a$  et  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$  ;
- (v) si  $g$  est dérivable en  $b = f(a)$ ,  $g \circ f$  est dérivable en  $a$  et  $(g \circ f)'(a) = f'(a)g'(f(a))$  ;
- (vi) si  $f$  est strictement monotone sur  $I$  et à valeurs dans  $J$ , on peut définir sur  $J$  sa fonction réciproque  $f^{-1}$ . Dans ce cas,  $f^{-1}$  est dérivable en  $b = f(a)$  et  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$ .

**Théorème B4.27**

soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable en  $a$  qui n'est pas une borne de  $I$ . Si  $f$  présente un extremum local en  $a$ , alors  $f'(a) = 0$ .



## 2.2 Dérivées successives

### Définition B4.28

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . On note  $f^{(0)} = f$ .

- (i) Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ , supposons  $f^{(k-1)}$  définie. On dit que  $f$  est  **$k$  fois dérivable** sur  $I$  lorsque  $f^{(k-1)}$  est dérivable. On note alors  $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$ , appelée **dérivée  $k$ -ième** de  $f$ .
- (ii)  $f$  est **infiniment dérivable** lorsqu'elle est  $k$  fois dérivable pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ .
- (iii) Si  $f$  est  $k$  fois dérivable et que  $f^{(k)}$  est continue sur  $I$ , on dit que  $f$  est **de classe  $\mathcal{C}^k$**  sur  $I$ .
- (iv) On dit que  $f$  est **de classe  $\mathcal{C}^\infty$**  sur  $I$  lorsqu'elle est de classe  $\mathcal{C}^k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ .

### Remarques.

- On peut adapter ces définitions pour parler d'une fonction  $k$  fois (ou infiniment) dérivable en  $a \in I$ .
- Cependant, pour parler d'une fonction  $k$  fois dérivable en un seul point, l'existence de  $f^{(k-1)}$  sur  $I$  tout entier est nécessaire.
- On écrit le plus souvent  $f'$  et  $f''$  au lieu de  $f^{(1)}$  et  $f^{(2)}$ .

**Notations.** On note  $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$  (resp.  $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ ) l'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$  (resp.  $\mathcal{C}^\infty$ ) sur  $I$ . Lorsqu'aucune confusion n'est possible, on peut écrire simplement  $\mathcal{C}^k(I)$  et  $\mathcal{C}^\infty(I)$ .

### Proposition B4.29

soit  $f, g \in \mathcal{C}^k(I)$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Alors  $\lambda f + \mu g$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  et on a

$$(\lambda f + \mu g)^{(k)} = \lambda f^{(k)} + \mu g^{(k)}.$$

### Théorème B4.30 (Leibniz)

Étant donné  $n \in \mathbb{N}$ , soit  $f, g \in \mathcal{C}^n(I)$  (resp.  $\mathcal{C}^\infty(I)$ ). Alors  $fg$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  (resp.  $\mathcal{C}^\infty$ ) et on a

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

**Remarque.** Même si on ne peut donner ici aucune formule générale pour les dérivées, on peut montrer que l'inverse d'une fonction  $\mathcal{C}^k$  et la composée de deux fonctions  $\mathcal{C}^k$  (moyennant les hypothèses usuelles) sont également de classe  $\mathcal{C}^k$ .

## 2.3 Étude globale des fonctions dérivables

Dans tout ce paragraphe, on donne  $a < b$ .

**Théorème B4.31 (Rolle)**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Si

- $f$  est continue sur  $[a, b]$ ,
- $f$  est dérivable sur  $]a, b[$ ,
- $f(a) = f(b)$ ,

alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f'(c) = 0$ .

Les conséquences de ce théorème sont multiples. Parmi les plus connues et utiles, les deux résultats suivants.

**Proposition B4.32**

- (i) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . Étant donné  $n \in \mathbb{N}^*$ , on suppose que  $f$  admet (au moins)  $n + 1$  zéros sur  $[a, b]$ . Alors  $f'$  admet (au moins)  $n$  zéros sur  $]a, b[$ .
- (ii) Soit  $f \in \mathcal{C}^n([a, b])$ . On suppose que  $f$  admet (au moins)  $n + 1$  zéros sur  $[a, b]$ . Alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f^{(n)}(c) = 0$ .

**Théorème B4.33 (Accroissements finis)**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Si

- $f$  est continue sur  $[a, b]$ ,
- $f$  est dérivable sur  $]a, b[$ ,

alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ .

**Proposition B4.34 (Inégalité des accroissements finis)**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Si

- $f$  est continue sur  $[a, b]$ ,
- $f$  est dérivable sur  $]a, b[$ ,
- $\exists m, M \in \mathbb{R}, \forall x \in ]a, b[, m \leq f'(x) \leq M$ ,

alors  $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$ .

**Corollaire B4.35**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Si

- $f$  est continue sur  $[a, b]$ ,
- $f$  est dérivable sur  $]a, b[$ ,
- $\exists k \in \mathbb{R}$  tel que  $\forall x \in ]a, b[, |f'(x)| \leq k$ ,

alors  $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ .

**Théorème B4.36 (Limite de la dérivée)**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . Si

- $f$  est continue sur  $I$ ,
- $f$  est dérivable sur  $I \setminus \{a\}$ ,
- $f'$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$ ,

alors

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a).$$

En particulier, si  $\ell \in \mathbb{R}$ , alors  $f$  est dérivable en  $a$  et  $f'(a) = \ell$ .

**3 Cas des fonctions complexes****Définition B4.37**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  et  $a \in \bar{I}$  et  $\ell \in \mathbb{C}$ . On dit que  $f$  **tend vers**  $\ell$  quand  $x$  tend vers  $a$  lorsque

$$|f(x) - \ell| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$$

**Proposition B4.38**

Avec les notations précédentes, les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i)  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ ,
- (ii)  $\operatorname{Re}(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} \operatorname{Re}(\ell)$  et  $\operatorname{Im}(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} \operatorname{Im}(\ell)$ .

**Remarque.** Les définition de la continuité en un point  $x_0 \in I$  et sur  $I$  sont inchangées et on a

$$f \text{ est continue en } x_0 \Leftrightarrow \operatorname{Re} f \text{ et } \operatorname{Im} f \text{ sont continues en } x_0.$$

Puis tout le paragraphe sur la dérivabilité peut être énoncé avec  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ , où  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

**Théorème B4.39 (Inégalité des accroissements finis)**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ . Si

- $f$  est continue sur  $[a, b]$ ,
- $f$  est dérivable sur  $]a, b[$ ,
- $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in ]a, b[, |f'(x)| \leq M$ ,

alors  $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$ .

**Méthodes**

- Prolongement d'une fonction par continuité.
- Étude et interprétation de la dérivabilité
  - par taux d'accroissement,
  - via le développement limité à l'ordre 1
- Calcul des dérivées successives d'une fonction
  - par récurrence,
  - par la formule de Leibniz.
- Obtenir l'existence d'une solution à une équation
  - par théorème des valeurs intermédiaires,
  - via une dérivée par théorème de Rolle ou des accroissements finis.
- Obtenir une inégalité par l'IAF.