Corrigé du problème d'algèbre.

Partie A : Application φ_A

1) Soient M et N deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned}\varphi_A(M+N) &= A(M+N) - (M+N)A \\ &= AM + AN - (MA + NA) \\ &= AM + AN - MA - NA \\ &= AM - MA + AN - NA \\ &= \varphi_A(M) + \varphi_A(N)\end{aligned}$$

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned}\varphi_A(\lambda M) &= A(\lambda M) - (\lambda M)A \\ &= \lambda AM - \lambda MA \\ &= \lambda(AM - MA) \\ &= \lambda\varphi_A(M)\end{aligned}$$

Ceci montre que φ_A est linéaire.

L'application φ_A est une application linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: c'est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

L'application φ_A est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2) On a $\varphi_A(I_n) = 0_n$ donc $\varphi_A(I_n) = \varphi_A(0_n)$ ce qui montre que φ_A n'est pas injective.

L'application φ_A n'est pas injective.

3) 1^{ère} rédaction

L'application φ_A étant un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, on a : φ_A est injective si et seulement si φ_A est surjective (théorème de caractérisation des isomorphismes).

D'après la question précédente, φ_A n'est pas injective donc φ_A n'est pas surjective.

2^{ème} rédaction

L'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ étant de dimension finie, on a d'après le théorème du rang :

$$\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) + \dim(\text{Im}(\varphi_A)) = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) .$$

D'après la question précédente, φ_A n'est pas injective donc $\text{Ker}(\varphi_A) \neq \{0_n\}$ et $\dim \text{Ker}(\varphi_A) > 0$.

On déduit $\dim(\text{Im}(\varphi_A)) < \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ d'où $\text{Im}(\varphi_A) \neq \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donc φ_A n'est pas surjective.

3^{ème} rédaction

Par l'absurde, si φ_A est surjective, en particulier il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $I_n = AM - MA$.

On a alors

$$\text{tr}(I_n) = \text{tr}(AM - MA) = \text{tr}(AM) - \text{tr}(MA) = 0 .$$

Contradiction et résultat.

φ_A n'est pas surjective.

Partie B : Exemple

4) a. On considère une matrice M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

On écrit

$$M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$$

avec x, y, z, t des réels.

On a

$$AM = \begin{pmatrix} x+z & y+t \\ 2z & 2t \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad MA = \begin{pmatrix} x & x+2y \\ z & z+2t \end{pmatrix}$$

donc

$$\varphi_A(M) = \begin{pmatrix} z & -x-y+t \\ z & -z \end{pmatrix}$$

et

$$\varphi_A(M) = 0_2 \iff \begin{cases} -x-y+t=0 \\ z=0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \text{Ker}(\varphi_A) \iff x+y=t \text{ et } z=0$$

b. On a

$$\begin{cases} x+y-t=0 \\ z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-y+t \\ z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-\alpha+\beta \\ y=\alpha \\ z=0 \\ t=\beta \end{cases} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

donc

$$\text{Ker}(\varphi_A) = \left\{ \begin{pmatrix} -\alpha+\beta & \alpha \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \right\}_{\alpha, \beta \in \mathbb{R}} = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}_{\alpha, \beta \in \mathbb{R}} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

On pose $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On a donc $\text{Ker}(\varphi_A) = \text{Vect}(I_2, B)$: la famille de vecteurs (I_2, B) est génératrice dans $\text{Ker}(\varphi_A)$.

Pour tous α et β dans $\mathbb{R}$, on a

$$\alpha I_2 + \beta B = 0_2 \iff \begin{pmatrix} \alpha-\beta & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \alpha=0 \text{ et } \beta=0$$

donc la famille de vecteurs (I_2, B) est libre.

La famille de vecteurs (I_2, B) est libre et génératrice dans $\text{Ker}(\varphi_A)$.

On déduit que c'est une base de $\text{Ker}(\varphi_A)$.

La famille de vecteurs (I_2, B) est une base de $\text{Ker}(\varphi_A)$.

$\text{Ker}(\varphi_A)$ admet une base composée de deux vecteurs donc c'est un espace vectoriel de dimension 2.

$$\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) = 2$$

5) a. L'espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ étant de dimension finie, on a d'après le théorème du rang :

$$\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) + \dim(\text{Im}(\varphi_A)) = \dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) .$$

On a $\dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) = 4$ et d'après la question précédente, $\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) = 2$ donc $\dim(\text{Im}(\varphi_A)) = 2$.

$$\dim(\text{Im}(\varphi_A)) = 2$$

b. 1ère rédaction

On a

$$\varphi_A \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \varphi_A \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour tous α et β dans $\mathbb{R}$, on a

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0_2 \iff \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & -\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \alpha = 0 \text{ et } \beta = 0$$

donc la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ est libre.

C'est une famille libre de deux vecteurs dans $\text{Im}(\varphi_A)$ qui est un espace vectoriel de dimension 2 : c'est donc une base de $\text{Im}(\varphi_A)$.

La famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\text{Im}(\varphi_A)$

2ème rédaction

La famille de vecteurs $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ donc

$$\begin{aligned} \text{Im}(\varphi_A) &= \text{Vect}(\varphi_A(E_{11}), \varphi_A(E_{12}), \varphi_A(E_{21}), \varphi_A(E_{22})) \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Ainsi, la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ est génératrice dans $\text{Im}(\varphi_A)$.

Pour tous α et β dans $\mathbb{R}$, on a

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0_2 \iff \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & -\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \alpha = 0 \text{ et } \beta = 0$$

donc la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ est libre.

La famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ est libre et génératrice dans $\text{Im}(\varphi_A)$ donc c'est une base de $\text{Im}(\varphi_A)$.

3ème rédaction

D'après la question 4a, si $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ est une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on a

$$\varphi_A(M) = \begin{pmatrix} z & -x-y+t \\ z & -z \end{pmatrix}$$

donc

$$\begin{aligned} \text{Im}(\varphi_A) &= \left\{ \begin{pmatrix} z & -x-y+t \\ z & -z \end{pmatrix} \right\}_{x,y,z,t \in \mathbb{R}} \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_{x,y,z,t \in \mathbb{R}} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Ainsi, la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ est génératrice dans $\text{Im}(\varphi_A)$.

Pour tous α et β dans $\mathbb{R}$, on a

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0_2 \iff \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & -\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \alpha = 0 \text{ et } \beta = 0$$

donc la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ est libre.

La famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ est libre et génératrice dans $\text{Im}(\varphi_A)$ donc c'est une base de $\text{Im}(\varphi_A)$.

6) On a

$$\begin{aligned} \varphi_A(E_{11}) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -E_{12} \\ \varphi_A(E_{12}) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -E_{12} \\ \varphi_A(E_{21}) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = E_{11} + E_{21} - E_{22} \\ \varphi_A(E_{22}) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{12} \end{aligned}$$

La matrice de φ_A dans la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est donc

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Partie C : Lemme de Schur

7) a. On suppose que u est une homothétie de E .

Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u(x) = \lambda \cdot x$ pour tout $x \in E$.

Si $x \in E$, on a $\lambda \cdot x + (-1) \cdot u(x) = 0_E$ donc la famille de vecteurs $(x, u(x))$ est liée.

Si u est une homothétie, alors pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ est liée.

b. On suppose que pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ est liée.

On commence par montrer que pour tout $x \in E$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u(x) = \lambda \cdot x$.

Si $x = 0_E$, c'est évident. On suppose donc $x \neq 0_E$. La famille $(x, u(x))$ est liée donc il existe α et β des réels non tous les deux nuls tels que $\alpha \cdot x + \beta \cdot u(x) = 0_E$. Si $\beta = 0$, on a $\alpha \cdot x = 0_E$ et comme $x \neq 0_E$ ceci entraînerait $\alpha = 0$ ce qui est impossible puisque les réels α et β ne sont pas tous les deux nuls. On a donc $\beta \neq 0$ et en posant $\lambda = -\frac{\alpha}{\beta}$, on obtient $u(x) = \lambda \cdot x$.

Pour montrer que u est une homothétie, il reste à voir que ce coefficient λ est le même pour tous les vecteurs non nuls x de E .

1ère rédaction

On considère $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe un réel λ_k tel que $u(e_k) = \lambda_k \cdot e_k$.

Montrons maintenant que tous les réels λ_k sont égaux (à λ_1).

Soit $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$. Il existe un réel γ_k tel que $u(e_1 + e_k) = \gamma_k \cdot (e_1 + e_k) = \gamma_k \cdot e_1 + \gamma_k \cdot e_k$.

D'autre part, par linéarité de u , on a $u(e_1 + e_k) = u(e_1) + u(e_k) = \lambda_1 \cdot e_1 + \lambda_k \cdot e_k$.

On déduit $(\lambda_1 - \gamma_k) \cdot e_1 + (\lambda_k - \gamma_k) \cdot e_k = 0_E$ et comme la famille de vecteurs (e_1, e_k) est libre ceci entraîne $\lambda_1 = \gamma_k$ et $\lambda_k = \gamma_k$ d'où $\lambda_k = \lambda_1$.

Ainsi, en posant $\lambda = \lambda_1$, on obtient $u(e_k) = \lambda \cdot e_k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

L'application linéaire u correspond avec l'homothétie de rapport λ sur une base de E : ces deux applications linéaires sont donc égales.

2ème rédaction

On considère deux vecteurs x et y non nuls de E .

D'après ce qui précède, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $u(x) = \alpha \cdot x$ et $\beta \in \mathbb{R}$ tel que $u(y) = \beta \cdot y$.

Si la famille (x, y) est liée, il existe (puisque $x \neq 0_E$) un réel λ tel que $y = \lambda \cdot x$.

On a $u(y) = \beta \cdot (\lambda \cdot x) = (\beta \lambda) \cdot x = (\lambda \beta) \cdot x$.

L'application u étant linéaire, on a $u(y) = \lambda \cdot u(x) = (\lambda \alpha) \cdot x$.

Le vecteur x n'étant pas nul, on déduit $\lambda \alpha = \lambda \beta$. Comme $y \neq 0_E$, on a $\lambda \neq 0$ et on déduit $\alpha = \beta$.

Si la famille (x, y) est libre, on considère le vecteur $x + y$.

Il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $u(x + y) = \gamma \cdot (x + y)$.

On a donc $u(x + y) = \gamma \cdot x + \gamma \cdot y$.

L'application u étant linéaire, $u(x + y) = u(x) + u(y) = \alpha \cdot x + \beta \cdot y$.

On a donc $(\alpha - \gamma) \cdot x + (\beta - \gamma) \cdot y = 0_E$ et comme la famille de vecteurs (x, y) est libre ceci entraîne $\alpha = \gamma$ et $\beta = \gamma$ d'où $\alpha = \beta$.

Ainsi, le même réel λ convient pour tous les vecteurs x de E .

On a donc $u(x) = \lambda \cdot x$ pour tout $x \in E$, ce qui montre que u est une homothétie.

On obtient avec a et b le lemme de Schur : u est une homothétie si et seulement si pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ est liée.

Partie D : Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

8) 1ère rédaction

On a

$$Z_n = \bigcap_{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})} \text{Ker}(\varphi_M)$$

donc Z_n est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (c'est une intersection de sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).

Z_n est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

2ème rédaction

La matrice nulle 0_n appartient à Z_n .

Soient A et B dans Z_n . Montrons que $A + B$ appartient à Z_n .

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a

$$(A + B)M = AM + BM = MA + MB = M(A + B).$$

Ainsi, $(A + B)M = M(A + B)$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donc $A + B \in Z_n$.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $A \in Z_n$. Montrons que λA appartient à Z_n .

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a

$$(\lambda A)M = \lambda(AM) = \lambda(MA) = M(\lambda A).$$

Ainsi, $(\lambda A)M = M(\lambda A)$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donc $\lambda A \in Z_n$.

9) a. Si $A \in Z_2$, on a $AM = MA$ pour toute matrice M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ donc en particulier on a $AE_{ij} = E_{ij}A$ pour tous i, j dans $\llbracket 1, 2 \rrbracket$.

Réciproquement, supposons $AE_{ij} = E_{ij}A$ pour tous i, j dans $\llbracket 1, 2 \rrbracket$.

On a donc $\varphi_A(E_{ij}) = 0_2$ pour tous i, j dans $\llbracket 1, 2 \rrbracket$.

L'application φ_A étant linéaire et la famille $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ étant une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ on déduit $\varphi_A = 0_{\mathcal{L}(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))}$ c'est-à-dire $AM = MA$ pour tout M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$$A \in Z_2 \iff \forall (i, j) \in \llbracket 1, 2 \rrbracket^2, AE_{ij} = E_{ij}A$$

b. Analyse

Soit $A \in Z_2$.

On écrit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec a, b, c et d des réels et on utilise le fait que A commute avec les quatre matrices de la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

L'égalité $AE_{11} = E_{11}A$ s'écrit $\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ d'où on déduit $b = c = 0$. L'égalité $AE_{12} = E_{12}A$ s'écrit

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ d'où on déduit } a = d, \text{ ce qui montre } A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Synthèse

Si A s'écrit $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $A = \lambda I_2$ et il est clair que $A \in Z_2$.

Conclusion

Z_2 est l'ensemble des matrices de la forme $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$

10) a. Dans un espace vectoriel de dimension finie, tout sous-espace vectoriel admet un supplémentaire.
Vect(x) est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^n$ est un espace vectoriel de dimension finie donc il existe un supplémentaire F de Vect(x) dans $\mathbb{R}^n$.

b. On note p la projection sur F parallèlement à Vect(x).

L'application p étant un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$, on a d'après l'hypothèse sur u , $u \circ p = p \circ u$.

En particulier $[u \circ p](x) = [p \circ u](x)$ c'est-à-dire $u(p(x)) = p(u(x))$.

On a $p(x) = 0_{\mathbb{R}^n}$ donc $u(p(x)) = 0_{\mathbb{R}^n}$.

On déduit $p(u(x)) = 0_{\mathbb{R}^n}$, ce qui montre $u(x) \in \text{Vect}(x)$.

Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u(x) = \lambda x$ et on déduit que la famille $(x, u(x))$ est liée.

c. Analyse

Soit $A \in Z_n$.

On considère u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à la matrice A .

L'égalité $AM = MA$ valable pour tout matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se traduit géométriquement par $u \circ v = v \circ u$ pour tout endomorphisme v de $\mathbb{R}^n$.

D'après b, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, la famille $(x, u(x))$ est liée.

On déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, la famille $(x, u(x))$ est liée.

D'après la question 7b, ceci entraîne que u est une homothétie.

Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u(x) = \lambda x$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

La matrice A représente u dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$ donc on a

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \lambda & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & \ddots \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire $A = \lambda I_n$.

Synthèse

Réciproquement, si $A = \lambda I_n$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $A \in Z_n$.

Conclusion

$$Z_n = \text{Vect}(I_n)$$

Partie E : Matrices diagonales

11) On considère une matrice M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

On écrit

$$M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$$

avec x, y, z, t des réels.

On a

$$AM = \begin{pmatrix} \alpha x & \alpha y \\ \beta z & \beta t \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad MA = \begin{pmatrix} \alpha x & \beta y \\ \alpha z & \beta t \end{pmatrix}$$

donc

$$\varphi_A(M) = \begin{pmatrix} 0 & (\alpha - \beta)y \\ (\beta - \alpha)z & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$\varphi_A(M) = 0_2 \iff \begin{cases} (\alpha - \beta)y = 0 \\ (\beta - \alpha)z = 0 \end{cases}$$

On a $\alpha - \beta \neq 0$ donc $\varphi_A(M) = 0_2 \iff y = 0$ et $z = 0$.

$$M \in \text{Ker}(\varphi_A) \text{ si et seulement si } M \text{ est diagonale}$$

b. D'après ce qui précède, on a

$$\text{Ker}(\varphi_A) = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} \right\}_{x,t \in \mathbb{R}} = \left\{ x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}_{x,t \in \mathbb{R}} = \text{Vect}(E_{11}, E_{22}).$$

Ainsi, la famille de vecteurs (E_{11}, E_{22}) est génératrice dans $\text{Ker}(\varphi_A)$.

De plus c'est une famille libre (elle est extraite de la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$), donc on déduit que c'est une base de $\text{Ker}(\varphi_A)$ et on a $\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) = 2$.

$$\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) = 2$$

L'espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ étant de dimension finie, on a d'après le théorème du rang :

$$\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) + \dim(\text{Im}(\varphi_A)) = \dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})).$$

On a $\dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) = 4$ et $\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) = 2$ donc $\dim(\text{Im}(\varphi_A)) = 2$.

$$\dim(\text{Im}(\varphi_A)) = 2$$

c. Soit $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Si $B \in \text{Im}(\varphi_A)$, il existe $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que $B = \varphi_A(M)$.

En écrivant

$$M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$$

avec x, y, z, t des réels, on a d'après les calculs de 11a

$$B = \begin{pmatrix} 0 & (\alpha - \beta)y \\ (\beta - \alpha)z & 0 \end{pmatrix}$$

ce qui montre que les coefficients diagonaux de B sont nuls.

Réciproquement, on suppose que la matrice B a ses coefficients diagonaux nuls.

On a donc

$$B = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

avec a et b des réels et d'après les calculs de 11a, on a $B = \varphi_A(M)$ où

$$M = \frac{1}{\alpha - \beta} \begin{pmatrix} 0 & a \\ -b & 0 \end{pmatrix}.$$

$$B \in \text{Im}(\varphi_A) \text{ si et seulement si ses coefficients diagonaux sont nuls.}$$

Si g appartient à C_f , les espaces vectoriels E_α et E_β sont stables par g d'après b, donc on peut considérer les applications $g_1 : E_\alpha \rightarrow E_\alpha$ et $g_2 : E_\beta \rightarrow E_\beta$ définies par $g_1(y) = g(y)$ et $g_2(z) = g(z)$ (endomorphismes induits).

Ces applications sont des endomorphismes de E_α et E_β respectivement (par linéarité de g) et il est évident que l'application

$$\Phi : \begin{cases} C_f & \rightarrow \mathcal{L}(E_\alpha) \times \mathcal{L}(E_\beta) \\ g & \mapsto (g_1, g_2) \end{cases}$$

est linéaire.

L'application Φ est injective : si $\Phi(g) = (0_{\mathcal{L}(E_\alpha)}, 0_{\mathcal{L}(E_\beta)})$, on a $g(y) = 0_{\mathbb{R}^n}$ pour tout $y \in E_\alpha$ et $g(z) = 0_{\mathbb{R}^n}$ pour tout $z \in E_\beta$ et on déduit facilement $g = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)}$ puisque $\mathbb{R}^n = E_\alpha + E_\beta$.

Maintenant, si $(u, v) \in \mathcal{L}(E_\alpha) \times \mathcal{L}(E_\beta)$, on définit un endomorphisme g de $\mathbb{R}^n$ en posant $g(x) = u(p(x)) + v(q(x))$ où p est la projection sur E_α parallèlement à E_β et q est la projection sur E_β parallèlement à E_α .

L'endomorphisme g ainsi défini appartient à C_f car il laisse stable les espaces E_α et E_β (question 12b) et on a $\Phi(g) = (u, v)$.

Ainsi, l'application Φ est un isomorphisme donc

$$\dim(C_f) = \dim(\mathcal{L}(E_\alpha) \times \mathcal{L}(E_\beta)) = \dim(\mathcal{L}(E_\alpha)) + \dim(\mathcal{L}(E_\beta)).$$

D'après la question 12b, on a $\dim(E_\alpha) = p$ et $\dim(E_\beta) = n - p$ donc $\dim(\mathcal{L}(E_\alpha)) = p^2$ et $\dim(\mathcal{L}(E_\beta)) = (n - p)^2$.

$$\dim(\text{Ker}(\varphi_A)) = p^2 + (n - p)^2$$

Partie F : Matrices de trace nulle

13) 1ère rédaction

V_n est le noyau de la trace qui est une forme linéaire non nulle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On déduit que V_n est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Comme $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension n^2 , V_n est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension $n^2 - 1$.

$$V_n \text{ est un sous-espace vectoriel de } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ de dimension } n^2 - 1.$$

2ème rédaction

L'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ étant de dimension finie, on a d'après le théorème du rang :

$$\dim(\text{Ker}(\text{tr})) + \dim(\text{Im}(\text{tr})) = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})).$$

$\text{Im}(\text{tr})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}$ contenant 1 ($\text{tr}(E_{11}) = 1$) donc $\text{Im}(\text{tr}) = \mathbb{R}$ et $\dim(\text{Im}(\text{tr})) = 1$.

On a $\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = n^2$ donc $\dim(\text{Ker}(\text{tr})) = n^2 - 1$.

On a $V_n = \text{Ker}(\text{tr})$ donc V_n est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension $n^2 - 1$.

14) On considère les matrices

$$A = E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = E_{11} - E_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Montrons que la famille (A, B, C) est libre.

Soient α, β, γ des réels vérifiant $\alpha A + \beta B + \gamma C = 0_n$.

On a

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire

$$\begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \beta & -\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et on déduit $\alpha = 0, \beta = 0, \gamma = 0$.

La famille (A, B, C) est une famille libre de trois vecteurs dans V_2 qui est un espace vectoriel de dimension 3 d'après la question précédente : c'est donc une base de V_2 .

$$\text{La famille } \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) \text{ est une base de } V_2.$$

15) a. On suppose $u \neq 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}$.

On raisonne par l'absurde.

On suppose que pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ est liée.

D'après la question 7b, l'application linéaire u est une homothétie : il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u(x) = \lambda \cdot x$ pour tout $x \in E$.

La matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est donc

$$M = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

L'endomorphisme u étant de trace nulle, on a $\text{tr}(M) = 0$, c'est-à-dire $2\lambda = 0$.

On a donc $\lambda = 0$ donc $u = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}$ ce qui est absurde.

$$\text{Si } u \neq 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}, \text{ il existe un vecteur } x \text{ de } \mathbb{R}^2 \text{ tel que la famille } (x, u(x)) \text{ est libre}$$

b. Si $u = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}$, la matrice de u dans la base canonique est 0_2 .

On peut donc supposer $u \neq 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}$.

D'après a, il existe un vecteur x de $\mathbb{R}^2$ tel que la famille $(x, u(x))$ est libre.

On pose $a_1 = x$ et $a_2 = u(x)$. La famille $\mathcal{B} = (a_1, a_2)$ est une famille libre de deux vecteurs dans $\mathbb{R}^2$ qui est de dimension 2 donc c'est une base de $\mathbb{R}^2$.

On a $u(a_1) = a_2$ donc la matrice M' de u dans la base $\mathcal{B}$ est de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}$$

avec a et b des réels. L'endomorphisme u étant de trace nulle, on a $\text{tr}(M') = 0$, c'est-à-dire $b = 0$.

Ainsi on a

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

et la matrice représentative de u dans la base $\mathcal{B}$ a ses deux coefficients diagonaux nuls.

16) On suppose qu'il existe deux matrices A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $M = AB - BA$.

On a donc par linéarité de la trace,

$$\text{tr}(M) = \text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA).$$

On a $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ donc $\text{tr}(M) = 0$.

Réciproquement, on suppose $\text{tr}(M) = 0$.

On considère l'endomorphisme u de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à u .

Cet endomorphisme est de trace nulle, donc d'après la question 15b, il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle

la matrice M' de u a ses deux coefficients diagonaux nuls.

D'après la question 11c, $M' \in \text{Im}(\varphi_{E_{11}})$; il existe donc une matrice H de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $M' = E_{11}H - HE_{11}$.

On note P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ à la base $\mathcal{B}$.

D'après le théorème de changement de base, on a $M = PM'P^{-1}$ donc

$$M = PM'P^{-1} = P(E_{11}H - HE_{11})P^{-1} = (PE_{11}H - PHE_{11})P^{-1} = PE_{11}HP^{-1} - PHE_{11}P^{-1}.$$

On a donc

$$M = (PE_{11}P^{-1})(PHP^{-1}) - (PHP^{-1})(PE_{11}P^{-1}).$$

On pose $A = PE_{11}P^{-1}$ et $B = PHP^{-1}$. On a $M = AB - BA$.

17) Cette question est difficile.

On commence par généraliser le résultat de la question 15b, en procédant par récurrence sur la dimension de l'espace.

On considère donc la propriété P_n : « Si E est un espace vectoriel de dimension n et si u est un endomorphisme de E de trace nulle, alors il existe une base de E dans laquelle la matrice de u a tous ses coefficients diagonaux nuls. »

Initialisation

Si $n = 1$, dire que u est de trace nulle équivaut à dire que u est nul donc la propriété P_1 est vérifiée.

Hérédité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On suppose que la propriété P_n est vérifiée.

On considère E un espace vectoriel de dimension $n + 1$ et u un endomorphisme de E de trace nulle.

Si u est une homothétie, on considère une base quelconque de E et la matrice associée à u est λI_{n+1} avec $\lambda \in \mathbb{R}$. La trace de u étant nulle, on déduit $\lambda = 0$ et $u = 0_{\mathcal{L}(E)}$. La matrice de u dans n'importe quelle base de E est donc la matrice nulle et en particulier, tous ses coefficients diagonaux sont nuls.

On suppose maintenant que u n'est pas une homothétie.

D'après le lemme de Schur (question 7b), il existe un vecteur x de E tel que la famille $(x, u(x))$ est libre.

D'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter la famille $(x, u(x))$ en une base $\mathcal{B}$ de E .

Dans cette base, la matrice de u est de la forme

$$M = \left[\begin{array}{c|ccc} 0 & \times & \dots & \times \\ \hline 1 & & & \\ 0 & & N & \\ \vdots & & & \end{array} \right].$$

La matrice M étant de trace nulle, et le coefficient de place $(1,1)$ étant nul, on déduit que la matrice N de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ obtenue en retirant de M la première ligne et la première colonne est de trace nulle.

On note $\mathcal{C}$ la famille de vecteurs obtenue en retirant de $\mathcal{B}$ le vecteur x , et on considère $F = \text{Vect}(\mathcal{C})$.

Il est facile de montrer que F est un supplémentaire de $\text{Vect}(x)$ dans E .

On note p la projection sur F parallèlement à $\text{Vect}(x)$.

La matrice N est la matrice représentative dans la base $\mathcal{C}$ de $v = p \circ u$ considéré comme un endomorphisme de F .

D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une base $\mathcal{C}'$ de F dans laquelle la matrice N' de l'endomorphisme v a tous ses coefficients diagonaux nuls.

En ajoutant x en première position à la famille $\mathcal{C}'$, on obtient une base de E , dans laquelle l'endomorphisme

u a pour matrice représentative une matrice de la forme

$$M' = \left[\begin{array}{c|ccc} 0 & \times & \dots & \times \\ \hline \times & & & \\ \vdots & & N' & \\ \times & & & \end{array} \right].$$

La matrice N' ayant tous ses coefficients diagonaux nuls, il en est de même de la matrice M' .

Conclusion

D'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, si E est un espace vectoriel de dimension n et si u est un endomorphisme de E de trace nulle, alors il existe une base de E dans laquelle la matrice de u a tous ses coefficients diagonaux nuls.

On raisonne maintenant de façon analogue à la question 16 (il suffit de généraliser la question 11c aux matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant tous leurs coefficients diagonaux distincts).

On suppose qu'il existe deux matrices A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $M = AB - BA$.

On a donc par linéarité de la trace

$$\text{tr}(M) = \text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0.$$

On suppose que la matrice M est de trace nulle.

On considère l'endomorphisme u de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à M . Cet endomorphisme est de trace nulle, donc d'après ce qui précède, il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle la matrice M' de u a tous ses coefficients diagonaux nuls.

On considère la matrice

$$D = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & 0 & \\ & & 3 & \\ & 0 & & \ddots \\ & & & & n \end{pmatrix}$$

Si $H = (h_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le coefficient de place (i,j) de la matrice $DH - HD$ est égal à $(i - j)h_{ij}$. On considère donc la matrice H définie par $h_{ii} = 0$ et $h_{ij} = \frac{1}{i - j} m'_{ij}$ si $i \neq j$ et on obtient $M' = DH - HD$.

De même qu'à la question 16, on pose $A = PDP^{-1}$ et $B = PHP^{-1}$ où P est la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ à la base $\mathcal{B}$.

On obtient

$$\begin{aligned} AB - BA &= PDP^{-1}PHP^{-1} - PHP^{-1}PDP^{-1} \\ &= PDHP^{-1} - PHDP^{-1} \\ &= P(DH - HD)P^{-1} \\ &= PM'P^{-1} \\ &= M \quad (\text{théorème de changement de base}) \end{aligned}$$

Ainsi, $M = AB - BA$.

Corrigé du problème d'analyse.

1. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. En 0, $x \mapsto \ln(1-x)$ a pour développement limité à l'ordre $n+1$

$$\ln(1-x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{-1}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1}).$$

Donc

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k+1} + o(x^n).$$

- (b) Tout d'abord, f est continue sur $I \setminus \{0\}$ en tant que quotient et composée de fonctions continues. De plus, d'après la question précédente, on a en particulier $f(x) = 1 + o(1)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Ainsi, d'après le théorème de prolongement par continuité, f se prolonge en une fonction continue sur I , et on a $f(0) = 1$.

$$f \text{ se prolonge en une fonction continue sur } I \text{ et on a } f(0) = 1.$$

- (c) D'après la question 1a, on a $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} + o(x)$. Ainsi,

$$f \text{ est dérivable en } 0 \text{ et } f'(0) = \frac{1}{2}.$$

- (d) Une équation de $\mathcal{F}$ est $y = f'(0)x + f(0)$, i.e. $\mathcal{F} : y = \frac{x}{2} + 1$.

D'après la question 1a, on a $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)$. Ainsi, $f(x) - \left(1 + \frac{x}{2}\right)$ a même signe que $\frac{x^2}{3}$ au voisinage de 0. Donc

$$\mathcal{C} \text{ est au dessus de } \mathcal{F} \text{ au voisinage de } 0.$$

2. La fonction $x \mapsto 1-x$ est affine, donc $\mathcal{C}^\infty$ sur I . Comme elle est à valeurs dans $]0, +\infty[$ et $\ln$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$, on en déduit que $x \mapsto \ln(1-x)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur I en tant que composée de fonctions $\mathcal{C}^\infty$. Enfin, comme $x \mapsto \frac{-1}{x}$ est une fonction rationnelle, donc $\mathcal{C}^\infty$ sur $I \setminus \{0\}$, on en déduit que

$$f \text{ est } \mathcal{C}^\infty \text{ sur } I \setminus \{0\}$$

en tant que produit de fonctions $\mathcal{C}^\infty$.

3. (a) On a montré que f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $I \setminus \{0\}$, donc f est dérivable sur $I \setminus \{0\}$. D'autre part, on a montré que f est dérivable en 0. Donc f est dérivable sur I . De plus, on a :

$$\forall x \in I \setminus \{0\}, f'(x) = \frac{\ln(1-x)}{x^2} + \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{1-x} - f(x) \right).$$

On en déduit

$$\forall x \in I \setminus \{0\}, xf'(x) = \frac{1}{1-x} - f(x).$$

Enfin, comme $f(0) = 1$, l'égalité est bien vérifiée pour $x = 0$. D'où le résultat.

$$\forall x \in I, xf'(x) = \frac{1}{1-x} - f(x)$$

- (b) Soit $n \in \mathbb{N}$. On a les développements limités suivants à l'ordre 2 en 0.

$$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + o(x^2) \quad f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)$$

Ainsi, par différence, $xf'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x}{2} + \frac{2x^2}{3} + o(x^{n+1})$. En divisant par x , on obtient

$$f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} + \frac{2x}{3} + o(x).$$

- (c) On sait déjà que f est dérivable sur I et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{0\}$. De plus, d'après la question précédente, on a $f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} + o(1)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \frac{1}{2} = f'(0)$. Ainsi, f' est continue en 0. Donc

$$f \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } I.$$

- (d) D'après la question 3b, on a aussi $f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} + \frac{2}{3}x + o(x)$. Ainsi, f' est dérivable en 0, et $f''(0) = \frac{2}{3}$. Donc

$$f \text{ est deux fois dérivable en } 0 \text{ et } f''(0) = \frac{2}{3}.$$

4. (a) Soit $k : t \mapsto t \ln t - (t-1)$, k est définie et dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a : $\forall t > 0, k'(t) = \ln t$. Par conséquent k est strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$. Comme $k(1) = 0$, on en déduit que

$$\forall t > 0, t \ln t \geq t - 1.$$

- (b) On a $\forall x \in I, 1-x > 0$. Ainsi, d'après la question précédente, $\forall x \in I, (1-x) \ln(1-x) \geq -x$, d'où $\forall x \in I, (1-x) \ln(1-x) + x \geq 0$. Or d'après la question 3a,

$$\forall x \in I \setminus \{0\}, f'(x) = \frac{(1-x) \ln(1-x) + x}{x^2(1-x)}.$$

Comme $\forall x \in I \setminus \{0\}, x^2(1-x) > 0, \forall x \in I \setminus \{0\}, f'(x) \geq 0$. Enfin, comme $f'(0) = \frac{1}{2} > 0$, on en déduit $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$. Donc

$$f \text{ est croissante sur } I.$$

Calculons les limites de f en $-\infty$ et en 1.

- En $-\infty$. On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$, donc par composition de limites, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1-x)}{1-x} = 0$. Or on a :

$$\forall x \in I \setminus \{0\}, f(x) = \frac{-(1-x)}{x} \times \frac{\ln(1-x)}{1-x}.$$

On en déduit $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ par produit de limites.

- En 1. On a $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(1-x) = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ par opérations sur les limites.

- (c) Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, f admet pour asymptote horizontale la droite d'équation $y = 0$ en $-\infty$. De plus, comme f est croissante sur I , $\forall x \in I$, $f(x) \geq 0$. Donc $\mathcal{C}$ est au dessus de son asymptote en $-\infty$.

5. (a) On a déjà montré que h est $\mathcal{C}^\infty$ sur I à la question 2. Montrons par récurrence sur n que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in I, h^{(n)}(x) = \frac{(n-1)!}{(1-x)^n}.$$

Initialisation. $\forall x \in I$, $h'(x) = \frac{1}{1-x}$, donc la propriété est vérifiée pour $n = 1$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\forall x \in I$, $h^{(n)}(x) = \frac{(n-1)!}{(1-x)^n}$. On a alors

$$\forall x \in I, h^{(n+1)}(x) = -(-n) \frac{(n-1)!}{(1-x)^{n+1}} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n+1$.

D'après le principe de récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in I, h^{(n)}(x) = \frac{(n-1)!}{(1-x)^n}.$$

- (b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$. On a $0 \leq x < \frac{1}{2}$, d'où $\frac{1}{2} < 1-x \leq 1$. On obtient ainsi : $1 \leq \frac{1}{(1-x)^n} < 2^n$. D'après la question précédente,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], |h^{(n)}(x)| \leq 2^n (n-1)!.$$

- (c) Remarquons déjà que si $x = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k+1} = 1 = f(0)$. Donc $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k+1}$ est vérifiée pour $x = 0$. Posons $M_n = 2^n (n-1)!$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$. D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange,

$$\left| h(x) - \sum_{i=0}^{n+1} \frac{h^{(i)}(0)}{i!} x^i \right| \leq \frac{M_{n+2}}{(n+2)!} x^{n+2}.$$

Or $\forall i \in \mathbb{N}^*$, $h^{(i)}(0) = (i-1)!$, $h(0) = 0$ et $\frac{M_{n+2}}{(n+2)!} x^{n+2} \leq \frac{2^{n+2}(n+1)!}{(n+2)!} \times \frac{1}{2^{n+2}} = \frac{1}{n+2}$. Donc

$$\left| h(x) - \sum_{i=1}^{n+1} \frac{x^i}{i} \right| \leq \frac{1}{n+2}.$$

Ainsi, en divisant par x et en effectuant le changement d'indice $k = i-1$:

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k+1} \right| \leq \frac{1}{x(n+2)}.$$

On en déduit, d'après le théorème des gendarmes, que

$$\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k+1} = f(x).$$

6. (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'après la question 1a, $f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k+1} + \frac{x^n}{n+1} + o(x^n)$. Ainsi, par opérations sur les développements limités,

$$\varphi_n(x) = \frac{(-1)^n n!}{n+1} + o(1).$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} \varphi_n(x) = \frac{(-1)^n n!}{n+1}.$$

- (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. φ_n est dérivable sur $I \setminus \{0\}$ en tant que combinaison linéaire et produit de fonctions dérivables. Soit $x \in I \setminus \{0\}$. On a, d'après la question 3a,

$$\begin{aligned} \varphi_n'(x) &= (-1)^n n! \left[\frac{-n}{x^{n+1}} \left(f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k+1} \right) + \frac{1}{x^n} \left(f'(x) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{kx^{k-1}}{k+1} \right) \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1} n!}{x^{n+1}} \left[n f(x) - n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k+1} - x f'(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{kx^k}{k+1} \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1} n!}{x^{n+1}} \left[(n+1) f(x) - n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k+1} - \frac{1}{1-x} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{kx^k}{k+1} \right]. \end{aligned}$$

Or, comme $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, on obtient

$$\begin{aligned}\varphi'_n(x) &= \frac{(-1)^{n+1}n!}{x^{n+1}} \left[(n+1)f(x) - n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} x^k - x^n - \frac{x^{n+1}}{1-x} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{kx^k}{k+1} \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1}n!}{x^{n+1}} \left[(n+1)f(x) - (n+1) \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k+1} - x^n - \frac{x^{n+1}}{1-x} \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1}(n+1)!}{x^{n+1}} \left(f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k+1} - \frac{x^n}{n+1} \right) + \frac{(-1)^n n!}{1-x}\end{aligned}$$

$$\boxed{\varphi'_n(x) = \varphi_{n+1}(x) + \frac{(-1)^n n!}{1-x}}$$

7. (a) **Initialisation.** On a montré que

$$\forall x \in I \setminus \{0\}, f'(x) = \frac{-1}{x}f(x) + \frac{1}{x(1-x)}.$$

Or $\forall x \in I \setminus \{0\}, \varphi_1(x) = \frac{-1}{x}(f(x) - 1)$. On en déduit que

$$\forall x \in I \setminus \{0\}, f'(x) = \varphi_1(x) + \frac{-1}{x} + \frac{1}{x(1-x)} = \varphi_1(x) + \frac{1}{1-x}.$$

Ainsi, la propriété est montrée pour $n = 1$ car le polynôme $P_1(X) = 1$ convient.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose qu'il existe $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$\forall x \in I \setminus \{0\}, f^{(n)}(x) = \varphi_n(x) + \frac{P_n(x)}{(1-x)^n}.$$

Soit $x \in I \setminus \{0\}$. En utilisant la question précédente, on obtient

$$\begin{aligned}f^{(n+1)}(x) &= \varphi_{n+1}(x) + \frac{(-1)^n n!}{1-x} + \frac{P'_n(x)(1-x)^n + nP_n(x)(1-x)^{n-1}}{(1-x)^{2n}} \\ &= \varphi_{n+1}(x) + \frac{(-1)^n n!(1-x)^n + P'_n(x)(1-x) + nP_n(x)}{(1-x)^{n+1}}.\end{aligned}$$

Comme la fonction $x \mapsto (-1)^n n!(1-x)^n + P'_n(x)(1-x) + nP_n(x)$ est une fonction polynomiale, on en déduit que la propriété est vérifiée au rang $n+1$.

D'après le principe de récurrence,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists P_n \in \mathbb{R}[X], \forall x \in I \setminus \{0\}, f^{(n)}(x) = \varphi_n(x) + \frac{P_n(x)}{(1-x)^n}}$$

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons qu'il existe deux polynômes P_n, Q_n tels que

$$\forall x \in I \setminus \{0\}, f^{(n)}(x) = \varphi_n(x) + \frac{P_n(x)}{(1-x)^n} = \varphi_n(x) + \frac{Q_n(x)}{(1-x)^n}.$$

Alors $\forall x \in I \setminus \{0\}, \frac{P_n(x)}{(1-x)^n} = \frac{Q_n(x)}{(1-x)^n}$, i.e. $P_n(x) = Q_n(x)$.

P_n et Q_n coïncident sur $I \setminus \{0\}$, soit en une infinité de valeurs réelles. Autrement dit, le polynôme $P_n - Q_n$ possède une infinité de racines et est par conséquent le polynôme nul. Donc $\boxed{P_n = Q_n}$.

(c) L'hérédité de la question 7a donne la relation

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, P_{n+1}(X) = (-1)^n n!(1-X)^n + P'_n(X)(1-X) + nP_n(X)$$

On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ le degré de P_n est $n-1$ et son coefficient dominant est $(n-1)!$.

Initialisation. $P_1 = 1$ est de degré 0 et de coefficient dominant $0! = 1$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons P_n de degré $n-1$ et de coefficient dominant $(n-1)!$.

Alors $\deg(P_n) = \deg((1-X)P'_n(X)) = n-1$, donc le degré de P_{n+1} est n et son coefficient dominant celui de $(-1)^n n!(1-X)^n$, à savoir $(-1)^n n!(-1)^n = n!$.

D'après le principe de récurrence,

$$\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^* \text{ le degré de } P_n \text{ est } n-1 \text{ et son coefficient dominant est } (n-1)!}$$

(d) Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .

Initialisation. On a déjà montré que f est continue sur I .

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .

Alors $f^{(n)}$ est continue sur I .

De plus, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $I \setminus \{0\}$, donc en particulier $f^{(n)}$ est dérivable sur $I \setminus \{0\}$.

Dans l'expression de $f^{(n+1)}$ donnée par la question 7a, φ_{n+1} possède une limite finie en 0.

De plus, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_{n+1}(x)}{(1-x)^{n+1}} = P_{n+1}(0)$. Donc par opérations sur les limites, $f^{(n+1)}$ possède une limite finie en 0.

D'après le théorème de limite de la dérivée, $f^{(n)}$ est dérivable en 0 et $(f^{(n)})'(0)$ coïncide avec la limite de $f^{(n+1)}$ en 0, ce qui permet de prolonger $f^{(n+1)}$ en une fonction continue sur I .

Ainsi f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I .

D'après le principe de récurrence, $\boxed{f \text{ est } \mathcal{C}^\infty \text{ sur } I}$.

8. Comme f est $\mathcal{C}^\infty$ sur I . On a, d'après le théorème de Taylor-Young,

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^k).$$

Donc, par unicité du développement limité et d'après la question 1a,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{n+1}.$$

D'où

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = \frac{n!}{n+1}}$$