

# CHAPITRE D5

## MATRICES ET APPLICATIONS LINÉAIRES

### Objectifs

- Représentation matricielle d'une famille de vecteurs.
- Savoir construire ou lire la matrice d'une application linéaire.
- Changements de base et les matrices de passage.
- Comprendre comment deux matrices semblables représentent le même endomorphisme.

Dans tout ce chapitre,  $n$  et  $p$  sont des entiers naturels non nuls et les espaces vectoriels considérés sont de dimension finie sur un corps  $\mathbb{K}$ . On peut se limiter à  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 1 Matrice d'une famille de vecteurs

#### Définition et théorème D5.1

Soit  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de base  $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$  et  $x \in F$ . On note  $x = \sum_{i=1}^n x_i f_i$  sa décomposition dans la base  $\mathcal{F}$ . On appelle **matrice du vecteur**  $x$  dans la base  $\mathcal{F}$  la matrice

$$\text{Mat}_{\mathcal{F}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Ceci crée un isomorphisme entre  $F$  et  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ .

**Définition D5.2**

Soit  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de base  $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$  et  $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_p)$  une famille de vecteurs de  $F$ . On appelle **matrice de la famille  $\mathcal{V}$**  dans la base  $\mathcal{F}$  la matrice

$$\text{Mat}_{\mathcal{F}}(\mathcal{V}) = \begin{array}{cccc} & v_1 & & v_j & & v_p & & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \left( \begin{array}{cccc} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{array} \right) & \begin{array}{l} \rightarrow \cdot f_1 \\ \\ \rightarrow \cdot f_i \\ \\ \rightarrow \cdot f_n \end{array} \end{array}$$

où les  $a_{ij}$  sont les composantes des  $v_j$  dans la base  $\mathcal{F}$ .

**Proposition D5.3**

Avec les notations précédentes,  $\text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{F}}(\mathcal{V})) = \text{rg}(\mathcal{V}) = \dim(\text{Vect}(\mathcal{V}))$ .

## 2 Matrice d'une application linéaire

### Définition D5.4

Soit

- $E$  un espace vectoriel de base  $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_p)$ ,
- $F$  un espace vectoriel de base  $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ ,
- $u \in \mathcal{L}(E, F)$

On appelle **matrice de  $u$  relativement aux bases  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{F}$**  la matrice

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(u) = \begin{array}{cccc} & u(e_1) & u(e_j) & u(e_p) \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \left( \begin{array}{cccc} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{array} \right) & \begin{array}{l} \rightarrow \cdot f_1 \\ \\ \rightarrow \cdot f_i \\ \\ \rightarrow \cdot f_n \end{array} \end{array}$$

où

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i.$$

**Remarque.** Autrement dit,

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(u(e_1), \dots, u(e_p)).$$

**Notation.** Pour un endomorphisme, on note simplement

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{E}}(u)$$

### Théorème D5.5

Soit  $\mathcal{E}$  une base de  $E$  un espace de dimension  $p$  et  $\mathcal{F}$  une base de  $F$  un espace de dimension  $n$ . Alors l'application

$$\begin{array}{ccc} \Phi : \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ u & \mapsto & \text{Mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(u) \end{array}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

**Remarque.** En particulier,  $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = p \times n$ .

**Définition D5.6**

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

(i) On appelle **application linéaire canoniquement associée à  $A$**  l'application

$$\begin{aligned} \tilde{A} : \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X &\mapsto AX \end{aligned} .$$

(ii) On appelle **noyau de  $A$**  le noyau de l'application  $\tilde{A}$ .

(iii) On appelle **image de  $A$**  l'image de l'application  $\tilde{A}$ .

**Remarque.** En identifiant vecteurs et matrices colonnes, cela donne aussi une application  $\mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$  que l'on dira aussi canoniquement associée à  $A$ .

**Proposition D5.7**

Soit  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels avec pour bases respectivement  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{F}$ . Étant donné  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{F}}(u(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{E}}(x).$$

**Proposition D5.8**

Soit  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels avec pour bases respectivement  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{F}$ . Étant donné  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , on a  $\text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{F}}(u)) = \text{rg}(u)$ .

**Proposition D5.9**

Soit  $E$ ,  $F$  et  $G$  trois espaces vectoriels avec pour bases respectivement  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{G}$ . Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ . Alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{E},\mathcal{G}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}(u).$$

**Remarque.** Avec  $A = \text{Mat}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}(u)$ ,  $X = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(x)$  et  $Y = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(u(x))$ , on retient la forme

$$Y = AX.$$

**Remarque.** Tous les résultats précédents peuvent s'interpréter dans le cas particulier où  $E = F$  et établissent une correspondance bijective entre matrices carrées et endomorphismes.

**Proposition D5.10**

Soit  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels de même dimension avec pour bases respectivement  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{F}$ . Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors

(i)  $u$  est un isomorphisme si et seulement si  $\text{Mat}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}(u)$  est inversible.

(ii) Dans ce cas,  $\text{Mat}_{\mathcal{F},\mathcal{E}}(u^{-1}) = (\text{Mat}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}(u))^{-1}$ .

### 3 Matrice de changement de base

#### Définition D5.11

Soit  $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$  et  $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$  deux bases de  $E$ . On appelle **matrice de passage** (ou **matrice de changement de base**) de  $\mathcal{E}$  à  $\mathcal{F}$  la matrice de  $\mathcal{F}$  dans la base  $\mathcal{E}$  et on note

$$P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}} = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F}).$$

#### Proposition D5.12

Soit  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{G}$  trois bases de l'espace vectoriel  $E$ . Alors on a

- (i)  $P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}} = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F})$  ;
- (ii)  $P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}} = \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\text{Id}_E)$  ;
- (iii)  $P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{G}} = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}} P_{\mathcal{F}}^{\mathcal{G}}$  ;
- (iv)  $P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$  est inversible et  $(P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}})^{-1} = P_{\mathcal{F}}^{\mathcal{E}}$ .

#### Proposition D5.13 (Changement de base pour un vecteur)

Soit  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{F}$  deux bases de  $E$ . Étant donné  $x \in E$ , on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{F}}(x) = P_{\mathcal{F}}^{\mathcal{E}} \text{Mat}_{\mathcal{E}}(x).$$

#### Proposition D5.14 (Changement de base pour un morphisme)

Soit  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{E}'$  deux bases de  $E$ . Soit  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{F}'$  deux bases de  $F$ . Étant donné  $u : E \rightarrow F$ , on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}', \mathcal{F}'}(u) = P_{\mathcal{F}'}^{\mathcal{F}} \text{Mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(u) P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}'}$$

#### Proposition D5.15 (Changement de base pour un endomorphisme)

Soit  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{E}'$  deux bases de  $E$ . Étant donné  $u : E \rightarrow E$ , on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}'}(u) = P_{\mathcal{E}'}^{\mathcal{E}} \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u) P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}'}$$

**Remarque.** Avec  $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u)$ ,  $A' = \text{Mat}_{\mathcal{E}'}(u)$  et  $P = P_{\mathcal{E}'}^{\mathcal{E}}$ , on retient la forme

$$A' = P^{-1}AP \text{ ou } A = PA'P^{-1}.$$



## 4 Matrices semblables

**Définition D5.16**

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  et  $B$  sont **semblables** lorsqu'il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $A = PBP^{-1}$ . Ceci définit la relation binaire dite de **similitude** sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

**Proposition D5.17**

La relation de similitude est une relation d'équivalence sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

**Proposition D5.18**

Soit  $E$  un ev de dimension  $n$  et de base  $\mathcal{E}$ .

- (i) Soit  $\mathcal{E}'$  une base de  $E$  et soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors  $\text{Mat}_{\mathcal{E}}(u)$  et  $\text{Mat}_{\mathcal{E}'}(u)$  sont semblables.
- (ii) Réciproquement, si  $A$  et  $B$  sont deux matrices semblables de taille  $n$ , alors il existe  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{E}'$  une base de  $E$  telles que  $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u)$  et  $B = \text{Mat}_{\mathcal{E}'}(u)$ .

**Définition D5.19**

- (i) On dit qu'une matrice carrée est **diagonalisable** lorsqu'elle est semblable à une matrice diagonale.
- (ii) On dit qu'une matrice carrée est **trigonalisable** lorsqu'elle est semblable à une matrice triangulaire.

## 5 Rang d'une matrice

**Proposition D5.20**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i)  $A$  est inversible,
- (ii)  $\text{Ker } A = \{0\}$ ,
- (iii)  $\text{Im } A = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ ,
- (iv)  $\text{rg}(A) = n$ .

**Proposition D5.21**

Soit  $n, p, q \in \mathbb{N}^*$ ,  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ .

- (i)  $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg } A, \text{rg } B)$ ,
- (ii) si  $n = p$  et  $A$  est inversible, alors  $\text{rg}(AB) = \text{rg } B$ ,
- (iii) si  $p = q$  et  $B$  est inversible, alors  $\text{rg}(AB) = \text{rg } A$ ,

**Définition D5.22**

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  est **équivalente** à  $B$  lorsqu'il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  telles que  $A = PBQ$ .

**Proposition D5.23**

L'équivalence de matrices est une relation d'équivalence sur  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

**Proposition et définition D5.24**

La matrice  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est de rang  $r \in \mathbb{N}$  si et seulement si elle est équivalente à la matrice  $J_r$  définie par blocs par

$$J_r = \left( \begin{array}{c|c} I_r & 0_{r,p-r} \\ \hline 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{array} \right).$$

**Proposition D5.25**

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . On a  $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^\top)$ .

**Définition D5.26**

Soit  $n, p, m, q \in \mathbb{N}^*$ ,  $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K})$ . On dit que  $B$  est une **matrice extraite** de  $A$  lorsqu'il existe deux applications strictement croissantes  $\varphi : \llbracket 1, m \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$  et  $\psi : \llbracket 1, q \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, p \rrbracket$  telles que

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket, b_{i,j} = a_{\varphi(i), \psi(j)}.$$

**Théorème D5.27 (Caractérisation du rang par les matrices extraites)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \setminus \{0\}$ . Le rang de  $A$  est le plus grand entier  $k$  tel qu'il existe une matrice extraite de  $A$  carrée de taille  $k$  inversible.



**Remarque.** En particulier, toutes les matrices extraites de  $A$  sont de rang inférieur ou égal à  $\text{rg}(A)$ .

#### Méthodes

- Écrire la matrice d'une famille de vecteurs dans une base donnée.
- Écrire la matrice d'une application linéaire dans une base donnée.
- Étudier l'application linéaire canoniquement associée à une matrice.
- Écrire dans une nouvelle base la matrice d'une application linéaire donnée.