

Corrigé du DM 4

Fonctions indicatrices

Partie A - Indicatrices et opérations ensemblistes

1. Soit $A, B, C \subset E$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbb{1}_{A \setminus (B \cup C)} &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{B \cup C} \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A (\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C) \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{(A \setminus B) \cap (A \setminus C)} &= \mathbb{1}_{A \setminus B} \mathbb{1}_{A \setminus C} \\ &= (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B) (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C) \\ &= \mathbb{1}_A^2 - \mathbb{1}_A^2 \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_A^2 \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A^2 \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\forall A, B, C \subset E, \quad A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbb{1}_{A \setminus (B \cap C)} &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{B \cap C} \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{(A \setminus B) \cup (A \setminus C)} &= \mathbb{1}_{A \setminus B} + \mathbb{1}_{A \setminus C} - \mathbb{1}_{A \setminus B} \mathbb{1}_{A \setminus C} \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C - (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B) (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C) \\ &= 2\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\forall A, B, C \subset E, \quad A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbb{1}_{A \setminus (B \setminus C)} &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{B \setminus C} \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A (\mathbb{1}_B - \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C) \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{(A \setminus B) \cup (A \cap C)} &= \mathbb{1}_{A \setminus B} + \mathbb{1}_{A \cap C} - \mathbb{1}_{A \setminus B} \mathbb{1}_{A \cap C} \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C - (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B) \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C \\ &= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\forall A, B, C \subset E, \quad A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)}$

2. Soit A, B deux parties de E .

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{\overline{A \cap B}} &= 1 - \mathbb{1}_{A \cap B} = 1 - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \\ \mathbb{1}_{\overline{A \cup B}} &= \mathbb{1}_{\bar{A}} + \mathbb{1}_{\bar{B}} - \mathbb{1}_{\bar{A}} \mathbb{1}_{\bar{B}} \\ &= 1 - \mathbb{1}_A + 1 - \mathbb{1}_B - (1 - \mathbb{1}_A)(1 - \mathbb{1}_B) \\ &= 1 - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{\overline{A \cup B}} &= 1 - \mathbb{1}_{A \cup B} = 1 - \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \\ \mathbb{1}_{\bar{A} \cap \bar{B}} &= \mathbb{1}_{\bar{A}} \mathbb{1}_{\bar{B}} = (1 - \mathbb{1}_A)(1 - \mathbb{1}_B) \\ &= 1 - \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\forall A, B \subset E, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \text{ et } \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}}$.

3. Soit A, B, C trois parties de E .

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{A \cap (B \cup C)} &= \mathbb{1}_A (\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C) \\ &= \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \\ \mathbb{1}_{(A \cap B) \cup (A \cap C)} &= \mathbb{1}_{A \cap B} + \mathbb{1}_{A \cap C} - \mathbb{1}_{A \cap B} \mathbb{1}_{A \cap C} \\ &= \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{A \cup (B \cap C)} &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_{B \cap C} - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{B \cap C} \\
&= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \\
\mathbb{1}_{(A \cup B) \cap (A \cup C)} &= \mathbb{1}_{A \cup B} \mathbb{1}_{A \cup C} \\
&= (\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B)(\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C) \\
&= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C \times (1 - 1) + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \times (1 - 1) + \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \times (-1 - 1 + 1) \\
&= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C
\end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\forall A, B, C \subset E, \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{ et } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)}$

4. a) Soit $A, B \subset E$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{A \Delta B} &= \mathbb{1}_{(A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})} \\
&= \mathbb{1}_{A \cap \bar{B}} + \mathbb{1}_{B \cap \bar{A}} - \mathbb{1}_{A \cap \bar{B}} \mathbb{1}_{B \cap \bar{A}} \\
&= \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B - (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B)(\mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B) \\
&= \mathbb{1}_A - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_B \\
&= \mathbb{1}_A^2 - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_B^2 \\
&= (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B)^2 \\
&= \text{les valeurs prises sont 0 ou 1 (donc } x^2 = x) \\
&= |\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B|
\end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\forall A, B \subset E, \quad \mathbb{1}_{A \Delta B} = |\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B|}$.

b) Soit $A, B \subset E$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{(A \cup B) \setminus (A \cap B)} &= \mathbb{1}_{A \cup B} - \mathbb{1}_{A \cap B} \\
&= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B - (\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B) \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \\
&= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B
\end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\forall A, B \subset E, \quad A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)}$.

c) Soit $A, B, C \subset E$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{A \cap (B \Delta C)} &= \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{B \Delta C} \\
&= \mathbb{1}_A \times |\mathbb{1}_B - \mathbb{1}_C| \\
\mathbb{1}_{(A \cap B) \Delta (A \cap C)} &= |\mathbb{1}_{A \cap B} - \mathbb{1}_{A \cap C}| \\
&= |\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C| \\
&= \mathbb{1}_A \times |\mathbb{1}_B - \mathbb{1}_C|
\end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\forall A, B \subset E, \quad A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)}$.

5. Soit $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$:

- $\boxed{A \subset B \Leftrightarrow \mathbb{1}_A \leq \mathbb{1}_B}$ en effet : $A \subset B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$
 $\Leftrightarrow (\mathbb{1}_A(x) = 1 \Rightarrow \mathbb{1}_B(x) = 1)$
 $\Leftrightarrow \mathbb{1}_A \leq \mathbb{1}_B$

- $\boxed{A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \mathbb{1}_{A \cap B} = 0 \Leftrightarrow \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B = 0}$

- $\boxed{A \cup B \cup C = E \Leftrightarrow \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C \geq 1}$

6. Soit $A, B \subset E$:

- $\boxed{\mathbb{1}_C = \min(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B) \Leftrightarrow C = A \cap B}$ en effet

$$\begin{aligned}
x \in C &\Leftrightarrow \mathbb{1}_C(x) = \min(\mathbb{1}_A(x), \mathbb{1}_B(x)) = 1 \\
&\Leftrightarrow \mathbb{1}_A(x) = \mathbb{1}_B(x) = 1 \\
&\Leftrightarrow x \in A \text{ et } x \in B \\
&\Leftrightarrow x \in A \cap B
\end{aligned}$$

- $\boxed{\mathbb{1}_D = \max(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B) \Leftrightarrow D = A \cup B}$

Partie B - Indicatrices et cardinalité

7. Soit $C = \{(A, B); A \subset B \subset E\}$.

a) Approche 1 : Considérons l'application :

$$\varphi : \begin{cases} C & \longrightarrow \mathcal{F}(E, \{0, 1, 2\}) \\ (A, B) & \longmapsto \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B \end{cases}$$

On note que B est l'image réciproque de $\{1, 2\}$; que A est l'image réciproque de $\{2\}$. Ceci permet d'établir le caractère surjectif et injectif de φ : donc φ est bijective.

La bijection exhibée donne que les deux ensembles sont équipotents.

Comme $\text{Card}(\mathcal{F}(E, \{0, 1, 2\})) = 3^n$ alors $\boxed{\text{Card}(C) = 3^n}$.

Remarque : On pourrait introduire $\psi : \begin{cases} E^2 & \longrightarrow \mathcal{F}(E, \{0, 1, 2\}) \\ (A, B) & \longmapsto \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \end{cases}$.

Dans ce cas φ est une restriction de ψ sur C : $\varphi = \psi|_C$

L'application ψ est surjective, non injective. Cette restriction permet de construire une bijection.

b) Approche 2 : Par le calcul descriptif :

$$\begin{aligned} \text{Card}(C) &= \sum_{A \subset B \subset E} 1 \\ &\quad \text{choix de } A \text{ puis de } B \setminus A \\ &= \sum_{A \subset E} \sum_{(B \setminus A) \subset (E \setminus A)} 1 \\ &\quad \text{discussion suivant le cardinal de } A : k = \text{Card}(A) \\ &= \sum_{\substack{A \subset E \\ \text{Card}(A)=k}} \sum_{(B \setminus A) \subset (E \setminus A)} 1 \\ &\quad \text{discussion suivant le cardinal de } A : k = \text{Card}(A) \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{\substack{A \subset E \\ \text{Card}(A)=k}} \sum_{(B \setminus A) \subset (E \setminus A)} 1 \\ &\quad \text{Le nombre de parties d'un ensemble de } n - k \text{ éléments est } 2^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{\substack{A \subset E \\ \text{Card}(A)=k}} 2^{n-k} \\ &\quad \text{le nombre de façons de choisir une partie de } k \text{ éléments dans } E \text{ est : } \binom{n}{k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \\ &\quad \text{formule du binôme} \\ &= (2 + 1)^n \end{aligned}$$

Ainsi, on retrouve $\boxed{\text{Card}(C) = 3^n}$.

8. Soit $E = \{1, 2, 3\}$, alors $\mathcal{P}(E)$ possède 8 éléments :

$$\begin{aligned} S_1 &= \text{Card}(\emptyset) + \text{Card}(\{1\}) + \text{Card}(\{2\}) + \text{Card}(\{3\}) \\ &\quad + \text{Card}(\{1, 2\}) + \text{Card}(\{1, 3\}) + \text{Card}(\{2, 3\}) + \text{Card}(\{1, 2, 3\}) \\ &= 12 \end{aligned}$$

9. On complète la démarche proposée pour le calcul de $S_1 = \sum_{A \subset E} \text{Card}(A)$

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \sum_{A \subset E} \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) \\
 &\quad \text{on permute les deux sommes} \\
 &= \sum_{x \in E} \sum_{A \subset E} \mathbb{1}_A(x) \\
 &\quad \text{il s'agit de dénombrer toutes les parties de } E \text{ qui contiennent l'élément } x \\
 &\quad \text{c'est-à-dire le nombre de façons de compléter } \{x\} \text{ en une partie de } E \\
 &\quad \text{c'est-à-dire le nombre de parties de } E \setminus \{x\} \\
 &= \sum_{x \in E} \text{Card}(\mathcal{P}(E \setminus \{x\})) \\
 &\quad E \setminus \{x\} \text{ contient } n - 1 \text{ éléments donc } \text{Card}(\mathcal{P}(E \setminus \{x\})) = 2^{n-1} \\
 &= \sum_{x \in E} 2^{n-1} \\
 &= n2^{n-1}
 \end{aligned}$$

Ainsi,
$$S_1 = \sum_{A \subset E} \text{Card}(A) = n2^{n-1}.$$

10. Avec $E = \{1, 2\}$, alors $\mathcal{P}(E)$ possède 4 éléments, ce qui donne une double somme avec 16 termes. Structurons les possibilités et dans un tableau à double entrées :

		A				
		\emptyset	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$	
B	\emptyset	0	0	0	0	$S_2 = 8$
	$\{1\}$	0	1	0	1	
	$\{2\}$	0	0	1	1	
	$\{1, 2\}$	0	1	1	2	

11. Calcule de $S_2 = \sum_{A, B \subset E} \text{Card}(A \cap B)$:

$$\begin{aligned}
 S_2 &= \sum_{A, B \subset E} \text{Card}(A \cap B) &= \sum_{A \subset E} \sum_{B \subset E} \sum_{x \in E} \mathbb{1}_{A \cap B}(x) \\
 &= \sum_{A \subset E} \sum_{B \subset E} \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) \mathbb{1}_B(x) \\
 &\quad \text{Permutons les sommes} \\
 &= \sum_{A \subset E} \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) \underbrace{\sum_{B \subset E} \mathbb{1}_B(x)}_{\text{Card}(\mathcal{P}(E \setminus \{x\}))} &= \sum_{x \in E} \sum_{A \subset E} \mathbb{1}_A(x) 2^{n-1} \\
 &= \sum_{x \in E} 2^{n-1} \times 2^{n-1} &= n2^{n-1} \times 2^{n-1} = n4^{n-1}
 \end{aligned}$$

Ainsi,
$$S_2 = \sum_{A, B \subset E} \text{Card}(A \cap B) = n4^{n-1}.$$

12. Calcule de $S_3 = \sum_{A, B \subset E} \text{Card}(A \cup B)$:

$$\begin{aligned}
S_3 &= \sum_{A, BCE} \text{Card}(A \cup B) \\
&= \sum_{ACE} \sum_{BCE} \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) + \mathbb{1}_B(x) - \mathbb{1}_A(x)\mathbb{1}_B(x) \\
&= \sum_{BCE} \sum_{ACE} \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) + \sum_{ACE} \sum_{BCE} \mathbb{1}_B(x) - \sum_{ACE} \sum_{BCE} \mathbb{1}_A(x)\mathbb{1}_B(x) \\
&= \sum_{BCE} S_1 + \sum_{ACE} S_1 - S_2 \\
&= 2 \cdot 2^n \cdot n 2^{n-1} - n 4^{n-1} = (4 - 1)n 4^{n-1} = 3n 3^{n-1}
\end{aligned}$$

Ainsi,
$$S_3 = \sum_{A, BCE} \text{Card}(A \cup B) = 3n 4^{n-1}.$$