

Les polynômes : Def et degré

1 Généralité(s)	1	3 Égalité.	4
1.1 C'est quoi un polynôme et c'est quoi X?	1	3.1 Équation polynomiale.	4
1.2 Opérations : CL, Produit, Composée, Dérivée. . .	2	3.2 Égalité de deux polynômes.	4
2 Degré.	3	4 Formule de Taylor.	5
		5 Exercices.	6

1 Généralité(s)

1.1 C'est quoi un polynôme et c'est quoi X ?

Définition 1. Polynôme Vs Fonction polynomiale et X Vs x .

Polynôme algébrique. On dit que P est un polynôme à coefficients dans \mathbb{K}

Ssi P est une liste d'éléments dans \mathbb{K} qui est nul à partir d'un certain rang.

Par exemple : $P = (2, 3, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, 0, 0, \dots)$ la liste est nulle à partir du rang 9.

Le symbole X. Pour simplifier l'écriture de P , utilise le symbole X^k qui indique la position (à la façon du logiciel python) d'un élément dans la liste P . Ainsi on écrit

$$\begin{aligned} P &= (2, 3, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, 0, 0, \dots) \\ &= 2X^0 + 3X^1 + 0X^2 + 0X^3 + 5X^4 + \dots + 7X^8 \\ &= 2 + 3X + 5X^4 + 7X^8 \end{aligned}$$

Conclusion : Le symbole X n'est pas une variable , c'est un "indicateur de position".

On va admettre que le symbole X se manipule comme la variable x .

Fonction polynomiale.

Soit Le polynôme $P = 2 + 3X + 5X^4 + 7X^8$ algébrique CàD la liste de ses coefficients, CàD (2, 3, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, 0, 0, \dots).

La fonction polynomiale associée , c'est la fonction $P : x \mapsto P(x) = 2 + 3x + 5x^4 + 7x^8$

À méditer.

> Soit une fonction polynomiale sur $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}$, CàD une fonction de \mathcal{D} à valeur dans \mathbb{R} .

Par exemple : $\forall x \in \mathcal{D}, P(x) = 2 + 3x + 5x^4 + 7x^8$

Alors on peut appliquer/évaluer la fonction P avec $\square \in \mathcal{D}, P(\square) = 2 + 3\square + 5\square^4 + 7\square^8$

> Soit un polynôme algébrique, par exemple $P(X) = 2 + 3X + 5X^4 + 7X^8$,

Alors on peut appliquer le polynôme P

> avec $x \in \mathbb{C}$ ou $\square \in \mathbb{C}$ on obtient $P(x)$ ou $P(\square)$

> et aussi avec la matrice carrée A on obtient $P(A)$

> Et même avec une fonction f on obtient $P(f)$

Remarque : le fonction $P(f)$, c'est $P(f) = 2id + 3f + 5f^4 + 7f^8$

et on a : $P(f) : x \mapsto P(f)(x) = [2id + 3f + 5f^4 + 7f^8](x) = 2x + 3f(x) + 5f^5(x) + 7f^8(x)$

1.2 Opérations : CL, Produit, Composée, Dérivée.

Définition 2. Opérations classiques

On considère P et Q deux polynômes.

Alors on peut facilement calculer

> **Addition, Combinaison Linéaire, Produit.**

> **Composée.** Soit $P = P(X) = \sum_{k=0}^{\alpha} a_k X^k$ et Q un polynôme

$$P \circ Q = P(Q) \stackrel{def}{=} \sum_{k=0}^{\alpha} a_k Q^k = \sum_{k=0}^{\alpha} a_k \square^k \text{ avec } \square = Q = Q(X)$$

Application : Grâce à la composition des polynômes, on a $P(X) = P \circ X \stackrel{def}{=} \sum_{k=0}^{\alpha} a_k X^k = P$

> **Polynôme Dérivé.** Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme non nul.

> Le polynôme dérivé de P , noté P' , c'est :

$$P' = \left[\sum_{k=0}^{\alpha} a_k X^k \right]' \stackrel{def}{=} \sum_{k=0}^{\alpha} a_k \cdot (kX^{k-1}) = \sum_{p=0}^{n-1} a_{p+1} \cdot (p+1) X^p$$

> Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le n -ième polynôme dérivé de P , que l'on note $P^{(n)}$

On commence par $P^{(0)} = P$ et $P^{(1)} = P'$ Puis par récurrence, $P^{(n+1)} = [P^{(n)}]'$

Théorème 3. Formulaire sur la dérivation.

Soit P, Q, R, \dots des polynômes, on a

> Constante : Si $P = \lambda$ alors $P' = [\lambda]' = 0$

> Combinaison linéaire : $[\lambda P + \mu Q]' = \lambda P' + \mu Q'$.

> Produit : $[P \cdot Q]' = P' \cdot Q + P \cdot Q'$.

$$\begin{aligned} \text{Généralisation : } (P \cdot Q \cdot R)' &= P'QR + PQ'R + PQR' \\ (P \cdot Q \cdot R \cdot S)' &= \end{aligned}$$

> Composée : $[P \circ Q]' = Q' \cdot [P' \circ Q]$

> **Formule de Leibnitz.** $[P \cdot Q]^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [P]^{(k)} \cdot [Q]^{(n-k)}$

> $\deg(P') = \deg(P) - 1$ et $\deg(P^{(n)}) = \deg(P) - n$

Ces formules sont valides sous réserve que \deg soit ≥ 0 .

Démonstration : La démonstration de Leibniz se fait par récurrence suivant la même démarche que la démonstration de la formule du binôme.

Démonstration : Soit P un polynôme non nul, on peut écrire $P = \underbrace{a_{\alpha}}_{\neq 0} X^{\alpha} + \dots$

On a $P' = [a_{\alpha} X^{\alpha} + \dots]' = \alpha a_{\alpha} X^{\alpha-1} + \dots$

Attention, ce n'est pas fini : Il faut justifier que $\text{coef}(X^{\alpha-1})$ n'est pas égale à 0.

Lorsque $\alpha \geq 1$, C'est bon

2 Degré.

Définition 4. Degré, Unitaire,....

Degré.

Lorsque P est un polynôme $\neq 0$, le plus grand indice n tel que $a_n \neq 0$ est appelé degré de P et on le note $\deg(P)$

Conclusion : Lorsque P est un polynôme non nul

Alors P a un degré et je note $\alpha = \deg(P)$

et on peut écrire $P = \underbrace{a_\alpha}_{\neq 0} X^\alpha + \dots$

Par convention : $\deg(0) = -\infty$.

Coef dominant, Unitaire. Lorsque $\deg(P) = n$, alors

$\text{coef}(X^n)$, c'est le coefficient dominant du polynôme P

et il est unitaire si $\text{coef}(X^n) = 1$

Conclusion : Si P est un polynôme unitaire de degré n ,

on peut écrire $P = 1 X^n + \dots$

Notation :

L'ensemble des polynômes à coefficients dans \mathbb{R} est noté $\mathbb{R}[X]$.

L'ensemble des polynômes à coefficients dans \mathbb{R} de degré $\leq n$ est noté $\mathbb{R}_n[X]$.

Théorème 5. Formulaire classique sur le degré.

Soit P, Q deux polynômes et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

> Quand $\lambda \neq 0$, on a $\deg(\lambda P) = \deg(P)$.

> $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$

> $\deg(\lambda P + \mu Q) = \begin{cases} = \max(\deg(P), \deg(Q)) & \text{Lorsque } \deg(P) \neq \deg(Q) \\ \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) & \text{Lorsque } \deg(P) = \deg(Q) \end{cases}$

> $\deg(P') = \deg(P) - 1$ et $\deg(P^{(n)}) = \deg(P) - n$

Ces formules sont valides sous réserve que \deg soit ≥ 0 .

Démonstration : Soit P et Q deux polynômes non nuls. Je note $n = \deg(P)$ et $m = \deg(Q)$

On peut écrire $P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + \dots$ et $Q = \underbrace{b_m}_{\neq 0} X^m + \dots$

On a maintenant

$$\begin{aligned} \lambda P &= \lambda(a_n X^n + \dots) = \lambda a_n X^n + \dots \\ \text{Comme } \lambda a_n &\neq 0, \text{ on a } \deg(\lambda P) = n = \deg(P) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P \cdot Q &= (a_n X^n + \dots) \cdot (b_p X^p + \dots) = a_n \cdot b_p X^{n+p} + \dots \\ \text{Comme } a_n \cdot b_p &\neq 0, \text{ on a } \deg(PQ) = n + p = \deg(P) + \deg(Q) \end{aligned}$$

Pour $(\lambda P + \mu Q)$, il y a une discussion selon que $n < p$, ou $n > p$ ou que $n = p$.

$$\lambda P + \mu Q = \lambda(a_n X^n + \dots) + \mu(b_p X^p + \dots) \begin{cases} \text{Si } n < p & = \mu b_p X^p + \dots \\ & \text{Comme } \mu b_p \neq 0, \text{ on a } \deg(\lambda P + \mu Q) = p \\ \text{Si } n = p & = (\lambda a_n + \mu b_n) X^n + \dots \\ \text{Si } n > p & = \lambda a_n X^n + \dots \\ & \text{Comme } \lambda a_n \neq 0, \text{ on a } \deg(\lambda P + \mu Q) = n \end{cases}$$

Lorsque $p = n$, CàD $\deg(P) = \deg(Q)$, il est possible que le coefficient $(\lambda a_n + \mu b_n)$ de X^n soit nul, on a alors une inégalité stricte, CàD $\deg(\lambda P + \mu Q) < \max(\deg(P), \deg(Q)) = n$

3 Égalité.

3.1 Équation polynomiale.

Théorème 6. Résoudre/Trouver

Pour résoudre/trouver une solution polynomiale, il faut **dans cet ordre**,

> Déterminer le degré de P

> puis les coefficients de P .

3.2 Égalité de deux polynômes.

Théorème 7. Égalité : degré et coefficients.

On considère $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ deux polynômes.

Deux polynômes sont égaux

Ssi ils ont les mêmes coefficients (et donc aussi le même degré.)

$$\text{CàD } P = Q \iff \begin{cases} \deg(P) = \deg(Q) \\ \forall k \in \{0, 1, \dots, \deg\}, a_k = b_k \end{cases}$$

Démonstration : La première propriété est une conséquence de la construction précise des polynômes, mais cette construction on ne l'a pas faite.

Théorème 8.

> Les polynômes pairs et impair.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme

On dit que le polynôme est pair Ssi $P(-X) = P(X)$

P est un polynôme pair \iff Il n'y a que des monômes pairs

> Lien Coefficient-Racines.

Soit P un polynôme de degré n .

On peut écrire que $P = \underbrace{a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0}_{\text{Forme développée}} = \underbrace{a_n (X - r_1) \dots (X - r_n)}_{\text{Forme factorisée}}$,

on a alors

$$\text{coef de } (X^n) = \underbrace{a_n}_{\text{développé}} = \underbrace{\dots}_{\text{factorisée}}$$

$$\text{coef de } (X^{n-1}) = \underbrace{a_{n-1}}_{\text{développé}} = \underbrace{\dots}_{\text{factorisée}}$$

$$\text{coef de } (X^0) = \underbrace{a_0}_{\text{développé}} = \underbrace{\dots}_{\text{factorisée}}$$

Démonstration : On fait \implies et \implies .

\Leftarrow ? On suppose que le polynôme P n'a que des monômes pairs

On va montrer que : $P(-X) = -P(X)$

Comme le polynôme P n'a que des monômes pairs, on peut écrire $P = \sum_{k=0}^n a_{2k} X^{2k}$, ainsi $P(-X) = \dots$ à finir

\implies ? On suppose que $P(-X) = -P(X)$

Comme P est un polynôme, on peut écrire, $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$

On va montrer que : Lorsque k est impair alors $a_k = 0$

$$\begin{aligned}
 P(-X) = P(X) &\iff \sum_{k=0}^n a_k (-X)^k = \sum_{k=0}^n a_k X^k \\
 &\iff \sum_{k=0}^n a_k (-1)^k X^k = \sum_{k=0}^n a_k X^k \\
 &\text{Ainsi on a } \forall k \in \mathbb{N}, a_k (-1)^k = a_k
 \end{aligned}$$

Donc lorsque k est impair, on a $a_k = -a_k \implies a_k = 0$. Conclusion : Il n'y a que des monômes pairs. Fini.

4 Formule de Taylor.

Théorème 9. Formule de Taylor.

Soit $P = a_n X^n + \dots + a_k X^k + \dots + a_1 X + a_0$ un polynôme de degré $\leq n$.

$$\text{Alors on a } \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}, a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$$

Ainsi on peut écrire

$$P(X) = P(0) + P'(0)X + P''(0)\frac{X^2}{2!} + \dots + P^{(k)}(0)\frac{X^k}{k!} + \dots + P^{(n)}(0)\frac{X^n}{n!}$$

$$\text{Généralisation : } P(a+h) = P(a) + P'(a)h + P''(a)\frac{h^2}{2!} + \dots + P^{(k)}(a)\frac{h^k}{k!} + \dots + P^{(n)}(a)\frac{h^n}{n!}$$

Démonstration : On fera la démonstration en classe.

5 Exercices.

Opérations sur les polynômes

Exercice 1. [Correction] Simplifier les expressions polynômiales suivantes.

- $(X^2 - X - 1) \cdot (-2X^2 + X - 2)$ et $(1 - X)^3 - (1 + X)^3$
- Soit $P = -X^2 + 2X + 1$. Calculer $P \circ P - P$ puis déterminer a, b tel que

$$[P \circ P](X) - P = (-X^2 + X + 1)(X^2 + aX + b)$$

- Déterminer $P = \operatorname{Re}[(X + i)^n]$
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer un polynôme P tel que : $\forall \theta \in \mathbb{R}, P(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$

Exercice 2. [Correction] On considère la fonction ϕ de $\mathbb{R}[X]$ à valeurs dans $\mathbb{R}[X]$ définie par

$$\phi(P) = P(X + 1) - P(X)$$

- Calculer : $\phi\left(\frac{X(X+1)(2X+1)}{6}\right)$ puis $[\phi \circ \phi]\left(\frac{X(X+1)(2X+1)}{6}\right)$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère les polynômes H_n dit de Hilbert le polynôme définis par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad H_n = \frac{(X-1)(X-2)\dots(X-n)}{n!}$$

- > Calculer $\phi(H_n)$. (on trouve un résultat de la forme λH_{n-1}).
- > En déduire $[\phi \circ \phi](H_n)$ et même $[\phi \circ \phi \circ \phi](H_n)$

Exercice 3. [Correction]

- Soit Le polynôme $P = X^2 + X - 1$.
Calculer $P(X).P(-X)$. Trouver un polynôme Q tel que $Q(X^2) = P(X).P(-X)$
- Soit Le polynôme $P = \prod_{k=1}^n (X + k)$.
Calculer $P(X).P(-X)$. Trouver un polynôme Q tel que $Q(X^2) = P(X).P(-X)$

Exercice 4. Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère les polynômes

$$P_n = X(X - n)^{n-1}$$

- Calculer P'_n puis $P'_n(X + 1) = P'_n \circ (X + 1)$.
- Calculer P_{n-1} et comparer avec $P'_n(X + 1)$.

 Degré

Exercice 5. [Correction] Déterminer le degré et le coef dominant de $P = (1 - X)^3 - (1 + X)^3$, de $Q = (1 - X)^4 - (1 + X)^4$

Exercice 6. [Correction] Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère le polynôme $P = (X^2 - 1)^n$
Calculer le degré et le coefficient dominant de $P^{(n)}$.

Exercice 7. [Correction] On considère la suite de polynôme définie par

$$P_0 = 1, P_1 = X \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, P_{n+2}(X) = 2X P_{n+1}(X) - P_n(X)$$

Calculer P_2, P_3 . Déterminer le degré et le coefficient dominant de P_n .

Exercice 8. [Correction] Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit T un polynôme non nul vérifiant $(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0$
Déterminer $\deg(T)$

Exercice 9. [Correction] Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère le polynôme P_n le n -ième polynôme de Chebychev définie par

$$P_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k X^{n-2k} (1 - X^2)^k$$

1. Déterminer le degré et le coefficient dominant du plateau $n^{\circ}k$ puis calculer le degré de P .
2. Calculer a_n , le coefficient dominant de P .

Exercice 10. [Correction] Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère le polynôme $P = (X + 1)^{2n} = (X + 1)^n \cdot (X + 1)^n$.

1. Calculer le coefficient de X^n dans P : D'une part et d'autre part
2. En déduire que : $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$

 Résoudre-Trouver

Exercice 11. [Correction] Une équation polynomiale simple.

On va déterminer les polynômes non nul P vérifiant $(P')^2 = 4P$,

CàD on va résoudre dans $\mathbb{R}[X]$ l'équation $(P')^2 = 4P$.

Comme P est un polynôme non nul, P a un degré. je note $n = \deg(P)$.

1. Déterminer la valeur de n .
2. Déterminer P .

Exercice 12. [Correction] Une équation polynomiale moins simple.

On va déterminer les polynômes non nul P vérifiant $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$,

CàD on va résoudre dans $\mathbb{R}[X]$ l'équation $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$.

Comme P est un polynôme non nul, P a un degré. je note $\alpha = \deg(P)$.

1. Déterminer la valeur de α .
2. Déterminer P .

Exercice 13. [Correction] Résoudre les équations suivantes.

1. $Q^2 = XP^2$, ici les inconnues sont $P, Q \in \mathbb{R}[X]$.
2. $P(X^2) = (X^2 + 1)P$, ici l'inconnue est $P \in \mathbb{R}[X]$.
3. $P \circ P = P$, ici l'inconnue est $P \in \mathbb{R}[X]$.

Correction.

Solution de l'exercice 1 (Énoncé)

1. Facile
2. On a

$$\begin{aligned} P \circ P &= - \left[-X^2 + 2X + 1 \right]^2 + 2 \left[-X^2 + 2X + 1 \right] + 1 \\ &= - \left[X^4 - 4X^3 + 2X^2 + 4X + 1 \right] + \left[-2X^2 + 4X + 2 \right] + 1 \\ &= -X^4 + 4X^3 - 4X^2 + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P \circ P - P &= -X^4 + 4X^3 - 3X^2 - 2X + 1 \\ &= (-X^2 + X + 1)(X^2 + aX + 1) \\ &= (-X^2 + X + 1)(X^2 - 3X + 1) \end{aligned}$$

- 3.

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}[(X+i)^n] &= \operatorname{Re} \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^{n-k} \underbrace{i^k}_{\text{Discussion}} \right] \\ &= \sum_{k=0 \text{ et } k \text{ pair}}^n \binom{n}{k} X^{n-k} i^k \\ &= \sum_{p=0}^{n/2} \binom{n}{2p} X^{n-2p} i^{2p} \\ &= \sum_{p=0}^{n/2} \binom{n}{2p} (-1)^p X^{n-2p} \end{aligned}$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer un polynôme P tel que : $\forall \theta \in \mathbb{R}, P(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$

Solution de l'exercice 2 (Énoncé)

1. On trouve $\phi\left(\frac{X(X+1)(2X+1)}{6}\right) = \dots = (X+1)^2$.
puis

$$\begin{aligned} [\phi \circ \phi] \left(\frac{X(X+1)(2X+1)}{6} \right) &= \phi \left(\phi \left(\frac{X(X+1)(2X+1)}{6} \right) \right) \\ &= \phi \left((X+1)^2 \right) \\ &= (X+2)^2 - (X+1)^2 \end{aligned}$$

2. On a

$$\begin{aligned} \phi(H_n) &= \frac{(X)(X-1)\dots(X+1-n)}{n!} - \frac{(X-1)(X-2)\dots(X-n)}{n!} \\ &= \frac{(X)(X-1)\dots(X-(n-1))}{n!} - \frac{(X-1)(X-2)\dots(X-n)}{n!} \\ &= \frac{(X-1)(X-2)\dots(X-(n-1))}{n!} [X - (X-n)] \\ &= \frac{(X-1)(X-2)\dots(X-(n-1))}{(n-1)!} = H_{n-1} \end{aligned}$$

On a maintenant

$$[\phi \circ \phi](H_n) = \phi(\phi(H_n)) = \phi(H_{n-1}) = H_{n-2}$$

$$[\phi \circ \phi \circ \phi](H_n) = \phi(\phi(\phi(H_n))) = \phi(\phi(H_{n-1})) = \phi(H_{n-2}) = H_{n-3}$$

Solution de l'exercice 3 (Énoncé)

1. On a

$$\begin{aligned} P(X).P(-X) &= (X^2 + X - 1)(\square^2 + \square - 1) \\ &= (X^2 + X - 1)(X^2 - X - 1) = X^4 - 3X^2 + 1 \end{aligned}$$

On veut trouver un polynôme Q tel que : $P(X).P(-X) = Q(\square)$ avec $\square = X^2$.

Comme $P(X).P(-X) = X^4 - 3X^2 + 1 = \square^2 - 3\square + 1$ avec $\square = X^2$
donc le polynôme $Q(X) = X^2 - 3X + 1$ convient.

2.

On veut trouver un polynôme Q tel que : $P(X).P(-X) = Q(\square)$ avec $\square = X^2$.

On a

$$\begin{aligned} P(X).P(-X) &= \prod_{k=1}^n (X+k) \prod_{k=1}^n (-X+k) \\ &= \prod_{k=1}^n (X+k)(-X+k) \\ &= \prod_{k=1}^n (-X^2 + k^2) = \prod_{k=1}^n (-\square + k^2) \quad \text{avec } \square = X^2 \end{aligned}$$

donc le polynôme $Q(X) = \prod_{k=1}^n (-X + k^2) = \prod_{k=1}^n \underbrace{-X + k^2}_{-(X - k^2)} = (-1)^n \prod_{k=1}^n (X - k^2)$ convient.

Solution de l'exercice 5 (Énoncé)

Déterminer le degré et le coef dominant de $P = (1 - X)^3 - (1 + X)^3$

Le polynôme P est de la forme $P = (1 - X)^3 - (1 + X)^3 = [\text{deg} = 3] - [\text{deg} = 3]$

Donc le formulaire ne permet pas de calculer le degré d'un polynôme

$$\begin{aligned} P &= (1 - X)^3 - (1 + X)^3 = [1 - 3X + 3X^2 - X^3] - [1 + 3X + 3X^2 + X^3] \\ &= -2X^3 + \dots \end{aligned}$$

Donc P est de degré 3.

Déterminer le degré et le coef dominant de $Q = (1 - X)^4 - (1 + X)^4$

le formulaire ne permet pas de calculer le degré d'un polynôme

$$\begin{aligned} Q &= (1 - X)^4 - (1 + X)^4 = [1 - 4X + 6X^2 - 4X^3 + X^4] - [1 + 4X + 6X^2 + 4X^3 + X^4] \\ &= 0X^4 - 8X^3 + \dots \end{aligned}$$

Donc Q est de degré 3.

Solution de l'exercice 6 (Énoncé)

> Avec le formulaire, on a $\text{deg}(P) = 2n$ ainsi $\text{deg}(P^{(n)}) = n$.

> Pour le coef dominant il faut normaliser

$$\begin{aligned} P &= (X^2 - 1)^n = X^{2n} + \dots \rightsquigarrow P' = (2n)X^{2n-1} + \dots \\ &\rightsquigarrow P'' = (2n)(2n-1)X^{2n-2} + \dots \\ &\rightsquigarrow P''' = (2n)(2n-1)(2n-2)X^{2n-3} + \dots \\ &\vdots \\ &\rightsquigarrow P^{[n]} = (2n)(2n-1)\dots(n+1)X^n + \dots \end{aligned}$$

Le coef dominant de $P^{(n)}$ est $(2n)(2n-1)\dots(n+1) = \frac{(2n)!}{n!}$

Solution de l'exercice 7 (Énoncé) On trouve : $P_2(X) = 2X^2 - 1$, $P_3 = 4X^3 + \dots$ et même $P_4 = 8X^3 + \dots$

On va montrer par récurrence à 2 étages

$H_{<n>}$: Le poly P_n est de degré n et son coef dominant est $= 2^{n-1}$, CàD $P_n = 2^{n-1}X^n + \dots$

Initialisation. Pour $n=1$ et $n=2$ Évident

Hérédité. On suppose $H_{<n>}$ et $H_{<n+1>}$

On va montrer que : Le poly P_{n+2} est de degré $n+2$ et son coef dominant est $= 2^{n+1}$

On a

$$\left. \begin{array}{l} P_{n+2}(X) = \underbrace{2X P_{n+1}(X)}_{\text{deg}=(n+2)} - \underbrace{P_n(X)}_{\text{deg}=n} \\ n < (n+2) \end{array} \right\} \Rightarrow P_{n+2} \text{ est de degré } n+2$$

De plus

$$\begin{aligned} P_{n+2}(X) &= 2X P_{n+1}(X) - P_n(X) \\ &= 2X[2^n X^{n+1} + \dots] - [2^{n-1} X^n + \dots] \\ &= 2^{n+1} X^{n+2} + \dots \end{aligned}$$

Donc le coef dominant de P_{n+2} est bien égale à 2^{n+1} .

Solution de l'exercice 8 (Énoncé) Comme T est un polynôme $\neq 0$, on sait que $\text{deg}(T) = \alpha \in \mathbb{N}$ et on peut écrire $T = \underbrace{a}_{\neq 0} X^\alpha + \dots$

l'équation devient

$$\begin{aligned} (1 - X^2) T'' - X T' + n^2 T &= 0 \\ \Leftrightarrow (1 - X^2) [a\alpha(\alpha - 1) X^{\alpha-2} + \dots] - X [a\alpha X^{\alpha-1} + \dots] + n^2 [a X^\alpha + \dots] &= 0 \\ \Leftrightarrow X^n [-a\alpha(\alpha - 1) - a\alpha + n^2 a] + \dots &= 0 \\ \Leftrightarrow X^n a(-\alpha^2 + \alpha - \alpha + n^2) + \dots &= 0 \\ \Leftrightarrow X^n a(-\alpha^2 + n^2) + \dots &= 0 \\ \Leftrightarrow X^n a(n - \alpha)(n + \alpha) + \dots &= 0 \end{aligned}$$

Un polynôme est nul Ssi ses coef sont nul donc on doit avoir

$$a(n - \alpha)(n + \alpha) = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } \alpha = n \text{ ou } \alpha = -1$$

Or $a \neq 0$ et $\alpha \in \mathbb{N}$,

Conclusion : Si T est une solution polynômiale non nulle de l'équation différentielle $(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0$ alors forcément $\text{deg}(T) = n$

Complément culturel : Il existe une solution polynômiale non nulle de degré n , c'est T_n , le n -ième polynôme de Chebychev.

Solution de l'exercice 9 (Énoncé)

1. On a : plateau $n^{\circ k} = \binom{n}{k} (-1)^k \underbrace{X^{n-2k}}_{\text{deg}=n-2k} \underbrace{(1 - X^2)^k}_{\text{deg}=2k}$ est de degré n .

De plus

$$\begin{aligned} \text{plateau } n^{\circ k} &= \binom{n}{k} (-1)^k X^{n-2k} (1 - X^2)^k \\ &= \binom{n}{k} (-1)^k X^{n-2k} [(-1)^k X^{2k} + \dots] \\ &= \left[\binom{n}{k} (-1)^{2k} X^n + \dots \right] \\ &= \binom{n}{k} X^n + \dots \end{aligned}$$

Conclusion : le coef dominant du plateau $n^{\circ k}$ est $\binom{n}{k}$.

2. On a

$$\begin{aligned}
 P_n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k X^{n-2k} (1-X^2)^k = \sum_{k=0}^n \underbrace{\binom{n}{k} X^n}_{\text{plateau } n^2k} + \dots \\
 &= X^n \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right] + \dots
 \end{aligned}$$

Conclusion : le polynôme P_n est de degré n et son coef dominant est $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \square^k = (1+\square)^n = 2^n$.

Solution de l'exercice 10 (Énoncé)

1. Calcul du coefficient de X^n dans P :

D'une part

À l'aide du binôme, on a $(X+1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} X^k$,

Ainsi le coefficient de X^n dans P est égale à $\binom{2n}{n}$

D'autre part

On a $(X+1)^{2n} = (X+1)^n \cdot (X+1)^n$

$$\begin{aligned}
 \text{Ainsi } (X+1)^{2n} &= (X+1)^n \cdot (X+1)^n \\
 &= \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k \right] \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k \right] \\
 &= \left[\binom{n}{0} X^0 + \binom{n}{1} X^1 + \dots + \binom{n}{n} X^n \right] \left[\binom{n}{0} X^0 + \binom{n}{1} X^1 + \dots + \binom{n}{n} X^n \right] \\
 &= \dots + X^{n+1} \left[\binom{n}{0} \binom{n}{n} + \binom{n}{1} \binom{n}{n-1} + \dots \right] + \dots
 \end{aligned}$$

Ainsi le coefficient de X^n dans P est égale à

$$\binom{n}{0} \binom{n}{n} + \binom{n}{1} \binom{n}{n-1} + \dots = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$$

2. On a donc

$$\begin{aligned}
 \binom{2n}{n} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} \\
 \text{Or à cause de la symétrie, on a } &\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 11 (Énoncé)

1. On va faire 2 deux méthodes.

Avec le formulaire.

Comme $P \neq 0$, P a un degré que je note α .

On a $(P')^2 = 4P$, ainsi

$$\text{deg}(\text{Gauche}) = \text{deg}(\text{Droite})$$

$$\text{CàD } 2(\alpha - 1) = \alpha \iff \alpha = 2$$

Sans le formulaire.

Comme $P \neq 0$, P a un degré que je note α et on a $P = \underbrace{a}_{\neq 0} X^\alpha + \dots$

On a $(P')^2 = 4P$, ainsi

$$\begin{aligned} (a\alpha X^{\alpha-1} + \dots)^2 &= aX^\alpha + \dots \\ \Leftrightarrow \underbrace{a^2 \alpha^2}_{\neq 0} X^{2\alpha-2} + \dots &= \underbrace{a}_{\neq 0} X^\alpha + \dots \\ \Rightarrow 2\alpha - 2 &= \alpha \\ \text{Donc } \alpha &= 2 \end{aligned}$$

2. Si il y a des solutions polynômiales P alors elles sont de degré 2.
On cherche les solutions P de la forme $P = aX^2 + bX + c$

Solution de l'exercice 12 (Énoncé)

1. On a $\underbrace{(X^2 + 1)P''}_{deg=\alpha} - \underbrace{6P}_{deg=\alpha} = 0$ donc le formulaire ne conclut pas.

On doit faire sans le formulaire.

Comme $P \neq 0$, P a un degré que je note α et on a $P = \underbrace{a}_{\neq 0} X^\alpha + \dots$

On a $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$, ainsi

$$\begin{aligned} (X^2 + 1)(a\alpha(\alpha - 1)X^{\alpha-2} + \dots) - 6(aX^\alpha + \dots) &= 0 \\ \Leftrightarrow X^\alpha [a\alpha(\alpha - 1) - 6a] + \dots &= 0 \\ \Leftrightarrow X^\alpha a(\alpha^2 - \alpha - 6) + \dots &= 0 \\ \Rightarrow a(\alpha^2 - \alpha - 6) &= 0 \end{aligned}$$

Comme $a \neq 0$, on a donc forcément $\alpha^2 - \alpha - 6 = 0$
Avec le discriminant Δ , on trouve $\alpha = 3$ ou $\alpha = -2$
Conclusion : Comme $\deg(P) = \alpha \in \mathbb{N}$, on a $\alpha = 3$ Yes!!!

2. Déterminer P .

Solution de l'exercice 13 (Énoncé)

1. Si P **et** Q sont des solutions non nul de $Q^2 = XP^2$, on a

$$\begin{aligned} \deg(\text{Gauche}) &\text{ est pair et } \deg(\text{Droite}) \text{ est impair!!!!} \\ \text{OUPS donc il n'y a pas de solution avec } P \text{ et } Q &\text{ non nul.} \end{aligned}$$

Il y a deux situations particulières à examiner situation Lorsque $P = 0$ et situation Lorsque $Q = 0$.

2. Si P est une solutions non nul de l'équation $P(X^2) = (X^2 + 1)P$, on a

$$\deg(P(X^2)) = \deg((X^2 + 1)P) \Leftrightarrow 2\deg(P) = \deg(P) + 2 \Leftrightarrow \deg(P) = 2$$

Si l'équation admet des solutions $P \neq 0$, elles sont forcément de degré 2.

On cherche maintenant les solutions de degré 2, CàD de la forme $P = aX^2 + bX + c$.

À faire.

3. Si P est une solutions non nul de l'équation $P \circ P = P$, on a

$$\deg(P \circ P) = \deg(P) \Leftrightarrow \deg(P)^2 = \deg(P) \Leftrightarrow \deg(P) = 0 \text{ ou } 1$$

On cherche maintenant les solutions de degré ≤ 1 , CàD de la forme $P = aX + b$.

$$\begin{aligned} P \circ P = P &\Leftrightarrow a[aX + b] + b = aX + b \\ &\Leftrightarrow a^2X + ab + b = aX + b \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = a \\ ab + b = b \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - a = 0 \\ ab = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ ou } a = 1 \\ ab = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Situation $a=1$

On a alors forcément $b=0$ Donc $P=1X+0=X$ est une solution.

Situation $a=0$

On a plus de condition sur b Donc $P=0X+b=b$ est une solution.

Conclusion : Les solutions de l'équation $P \circ P = P$ sont
le polynôme X et les polynômes constants