

EDL : Équations Différentielles Linéaire.

1 Primitives	1	3.2 Résoudre l'équation homogène.	4
1.1 Rappel	1	3.3 Méthode de variation de la constante.	4
1.2 Une primitive difficile.	1	4 EDL2 à coefficients constants	5
2 Primitiver une égalité	2	4.1 Vocabulaire et description des solutions.	5
3 EDL1	3	4.2 Résolution de l'équation homogène.	6
3.1 Vocabulaire et description des solutions.	3	4.3 Solution particulière.	7
		5 Le principe de Cauchy	8
		6 Exercices	9

1 Primitives

1.1 Rappel

La grille classique pour les calculs de primitive est

> Monôme : par exemple $\frac{1}{x^n \sqrt{x}}$

> Mélange : par exemple $\sqrt{2x} + \frac{1}{2x} = \sqrt{2} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \frac{1}{x}$

> Produit, Quotient : Bli, Bli

MAIS $\frac{\square'}{\square}$ et $\square' \square$ et même $\square' \square^\alpha$: par exemple $\frac{1}{x \ln(x)}$ et $\frac{\ln(x)}{x}$

> Composée simple : $f(u) \rightsquigarrow \frac{1}{u'} F(u)$ avec $u' = \text{KONSTANTTE}$; par exemple $\cos(2t)$, $e^{-\frac{t}{2}}$ ou $\sqrt{1-x}$

> Nouvô mais usuelle : $\frac{1}{1+x^2} \rightsquigarrow \arctan(x)$ ou $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \rightsquigarrow \arcsin(x)$

> DES=décomposition en éléments simples : par exemple $\frac{1}{x(x-1)}$ ou $\frac{1}{x^2-1}$

> Trigo avec produit $\rightsquigarrow$ plus de produit

Théorème 1. Kulture ou IPP

On peut aussi connaître

> Une primitive de $t e^{-t}$ est de la forme $(at + b) e^{-t}$

Une primitive de $(t^2 + 1) e^{2t}$ est de la forme $(at^2 + bt + c) e^{2t}$

CàD (poly du même degré) $\times$ la même exp

> Une primitive de $\cos(t) e^{-t}$ est de la forme $[a \cos(t) + b \sin(t)] e^{-t}$

Une primitive de $\sin(t) e^{2t}$ est de la forme $[a \cos(t) + b \sin(t)] e^{2t}$

De façon plus générale les intégrales/primitives suivantes se font avec des IPP

$$\int^x \ln(t) dt \quad \int^x \arctan(t) dt \quad \int^x t e^{-t} dt \quad \int^x \sin(t) e^{2t} dt$$

Il restera au programme une dernière primitive difficile
que l'on verra au moment du cours sur DES.

1.2 Une primitive difficile.

Trouver une primitive de $\frac{1}{1+x+x^2}$

2 Primitives une égalité

Théorème 2. Primitivation des égalités.

Soit $f : x \mapsto f(x)$ et $g : x \mapsto g(x)$ deux fonctions continues sur un intervalle I .

On suppose que $\forall x \in I, f(x) = g(x)$

On peut primitiver l'égalité C'est possible car les fonctions sont continues,

Ainsi il existe une constante K tel que : $\forall x \in I, F(x) = G(x) + K$

De plus quand on primitive une égalité, on conserve les $\iff$

Exemple classique en math : on va résoudre l'équation $f'' = 0$.

$f'' = 0$, CàD $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = 0$.

On primitive l'égalité

Ainsi il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \underbrace{0}_{\text{Une primitive de 0}} + a = a$.

On primitive à nouveau l'égalité

Ainsi il existe $b \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \underbrace{ax}_{\text{Une primitive de } a} + b$.

Conclusion : $f'' = 0 \iff$ il existe a, b tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ax + b$

Théorème 3. Deux applications classiques

En physique

En mécanique, on rencontre $y'' = g$ où g est la gravitation!!!! On a alors

$$y'' = g \iff y''(t) = g \iff y'(t) = gt + \underbrace{K}_{=y'(0)}$$

$$\iff y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + y'(0)t + \underbrace{L}_{y(0)}$$

$$\text{Conclusion : } \forall t \geq 0, y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + \underbrace{y'(0)}_{=v_0}t + \underbrace{y(0)}_{=h_0}$$

En math

Soit f une fonction $\mathcal{C}^\infty$ et $n \in \mathbb{N}$. On a l'équivalence

$$f^{(n)} = 0 \iff \text{La fonction } f \text{ est un polynôme de degré } \leq n$$

3 EDL1

3.1 Vocabulaire et description des solutions.

Définition 4. Vocabulaire.

Soit I un intervalle.

Soit $a : x \mapsto a(x)$, $b : x \mapsto b(x)$ et $\lambda : x \mapsto \lambda(x)$ des fonctions continues de I , à valeurs dans $\mathbb{R}$.

> Une équation fonctionnelle

est une équation où l'inconnue est une fonction, souvent notée y .

> Une équation différentielle est une équation fonctionnelle faisant intervenir y , y' .

> Une *équation différentielle linéaire d'ordre 1* est une équation de la forme

$$\underbrace{\lambda(x) y' + a(x) y}_{\text{Partie Homogène}} = \underbrace{b(x)}_{\text{2-ième membre}}$$

> Une *équation différentielle linéaire d'ordre 1 normalisée* est une équation de la forme

$$\underbrace{1 y' + a(x) y}_{\text{Partie Homogène Normalisée}} = \underbrace{b(x)}_{\text{2-ième membre}}$$

L'équation différentielle homogène associée est donc $y' + a(x)y = 0$.

Vocabulaire : Résoudre ou intégrer une équation différentielle, c'est trouver toutes les fonctions **dérivables** y qui vérifient l'équation.

Théorème 5. Description de la forme des solutions d'une EDL1

Soit a, b des fonctions continues sur un intervalle I .

Soit l'équation normalisée : $y' + a(x)y = b(x)$.

Alors les solutions y de l'équa diff sont la somme de

> Une solution particulière $y_p : x \mapsto y_p(x)$ de l'équa diff complète

> Les solutions $h : x \mapsto h(x)$ de l'équa diff homogène

$$\text{Ainsi on a : } \forall x \in I, y(x) = y_p(x) + h(x)$$

Soit y une solution quelconque de l'équation complète et y_p une solution particulière de l'équation complètes.

$$\begin{aligned} \text{On a } y' + a(x)y &= b(x) \\ y_p' + a(x)y_p &= b(x) \end{aligned}$$

On fait la différence ainsi $(y - y_p)' + a(x)(y - y_p) = 0$

Conclusion : $y = y_p + h$

3.2 Résoudre l'équation homogène.

Théorème 6. Le théorème générale

Soit a des fonctions continues sur un intervalle I .

On suppose que : h est une fonction solution de l'équation différentielle : $y' + a(x)y = 0$.

On note $A : x \mapsto A(x)$ une primitive (sur I) de la fonction $a : x \mapsto a(x)$

Alors il existe une constante K tel que $\forall x \in I, h(x) = K e^{-A(x)}$

D'une part.

les fonctions de la forme $K e^{-A(x)}$ sont solution de l'équation différentielle.

D'autre part. On suppose que h est une solution de l'équation différentielle.

On va montrer que $h(x)$ est forcément de la forme $h(x) = K e^{-A(x)}$

On étudie la fonction $\varphi : x \mapsto h(x)e^{A(x)}$

On déduit de l'étude que la fonction φ est constante sur I

CàD $\forall x \in I, h(x)e^{A(x)} = K \iff h(x)e^{A(x)} = K e^{-A(x)}$

Théorème 7. Le théorème spécial physique

On suppose que : $h(t)$ vérifie l'équation différentielle : $y' + \frac{1}{\tau}y = 0$.

On sait que $1/\tau$ Une primitive $\xrightarrow{\quad\quad\quad} t/\tau$ Ici la variable c'est t

Alors il existe une constante K tel que $\forall t \geq 0, h(t) = K e^{-t/\tau}$

3.3 Méthode de variation de la constante.

Théorème 8. Solution particulière de l'équa diff complète

Soit a, b des fonctions continues sur un intervalle I .

Soit l'équation normalisée : $y' + a(x)y = b(x)$.

> Est ce que l'on ne vous a pas donné une solution particulière y_p à la question Q.1.a?

> Sinon **À la physicienne**, on essaye une solution particulière "évidente",

CàD on essaye $y_p : x \mapsto C$ ou $y_p : x \mapsto Cx$ avec $C = \text{Constante}$

> Sinon *Méthode de variation de la constante*

On cherche une solution particulière de la forme $\lambda(x) h(x)$.

Les calculs conduisent alors à : $\lambda'(x) h(x) = b(x) \iff \lambda'(x) = \frac{b(x)}{h(x)}$ Une primitive $\xrightarrow{\quad\quad\quad}$

Théorème 9. Principe de Superposition.

Soit u, v, w_1, w_2 sont des fonctions définie sur un intervalle I .

On suppose de plus que sur I la fonction u ne s'annule pas, CàD $\forall x \in I, u(x) \neq 0$.

On suppose

> La fonction y_1 est une solutions particulière (sur I) de : $u(x)y' + v(x)y = w_1(x)$.

> La fonction y_2 est une solutions particulière (sur I) de : $u(x)y' + v(x)y = w_2(x)$.

Alors la fonction $y_1 + y_2$ est une solutions particulière (sur I)
de l'équation différentielle $u(x)y' + v(x)y = w_1 + w_2$.

4 EDL2 à coefficients constants

4.1 Vocabulaire et description des solutions.

Définition 10. Vocabulaire.

Soit I un intervalle ouvert non vide.

Soit a , b et c trois constantes et f une fonction continue sur I

> On dit que

$$\underbrace{ay'' + by' + cy}_{\text{Partie Homogène}} = \underbrace{f(x)}_{\text{2-ième membre}}$$

est une *équation différentielle linéaire du deuxième ordre*.

> On dit que : $ay'' + by' + cy = 0$ est l'*équation différentielle homogène associée*.

Théorème 11. Description de la forme des solutions d'une EDL2

Soit a, b, c des constantes et ϕ une fonction continue sur un intervalle I .

Soit l'équation normalisée : $ay'' + by' + cy = \phi(x)$.

Alors les solutions y de l'équa diff sont la somme

> D'une solution particulière y_p de l'équa diff complète

> Des solutions h de l'équa diff homogène.

$$\text{CàD on a : } \forall x \in I, y(x) = y_p(x) + h(x)$$

C'est la même démonstration que pour l'ordre 1.

4.2 Résolution de l'équation homogène.

Définition 12. Équation Caractéristique.

Soit a, b, c trois constantes et soit (H) l'équation différentielle homogène $ah'' + bh' + ch = 0$

On dit que : $aX^2 + bX + c = 0$ est l'équation caractéristique de (H).

Théorème 13. Équa diff classique d'ordre 2.

Soit l'équa diff classique d'ordre 2 (homogène) $ah'' + bh' + ch = 0$ avec a, b, c des constantes, et son équation caractéristique $ax^2 + bx + c = 0$

Lorsque $\Delta = b^2 - 4ac > 0$

Alors l'équation caractéristique admet 2 solutions distinctes r et r' dans $\mathbb{R}$.
et les solutions h sont de la forme

$$\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = \lambda e^{rx} + \mu e^{r'x} \quad \text{avec } \lambda, \mu \text{ des constantes.}$$

Lorsque $\Delta = b^2 - 4ac = 0$

Alors l'équation caractéristique admet 1 seule solution $r = r'$
et les solutions h sont de la forme

$$\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = \lambda e^{rx} + \mu x e^{rx} = (\lambda + \mu x) \cdot e^{rx} \quad \text{avec } \lambda, \mu \text{ des constantes.}$$

Lorsque $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

Alors l'équation caractéristique admet 2 solutions $r = \alpha + i\beta$ et $r' = \bar{r} = \alpha - i\beta$
et les solutions h sont de la forme

$$\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = \lambda e^{\alpha x} \cos(\beta x) + \mu e^{\alpha x} \sin(\beta x) \quad \text{avec } \lambda, \mu \text{ des constantes.}$$

Remarque : Les constantes λ, μ se calculent avec les conditions initiales.

Démonstration : Démonstration "Version écrit"

$$\text{On va résoudre l'équation diff } y'' - 5y' + 6y = 0$$

Ici $a = 1, b = -5, c = 6$ et $r = 2$ et $r' = 3$ sont les sol de l'eq caract

> Question/Étape 1 : Montrer que :

$$f \text{ est sol de } y'' - 5y' + 6y = 0 \text{ Ssi } g = f' - 2f \text{ est sol de } y' - 3y = 0$$

Démonstration : C'est longuet à rédiger mais pas difficile. On fait $\Rightarrow$ et $\Leftarrow$

$$\text{Conclusion : } y'' - 5y' + 6y = 0 \iff \begin{cases} g = f' - 2f \\ \text{et} \\ g' - 3g = 0 \end{cases}$$

> Question/Étape 2 : On résout (A) puis on résout (B)

-> Les sol de $g' - 3g = 0$ sont : $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = A e^{3x}$ avec $A \in \mathbb{R}$

-> Les sol de $f' - 2f = g = A e^{3x}$ sont (Je vous laisse faire les calculs qui sont plus ambigus qu'il y paraît)

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \underbrace{A' e^{3x}}_{\text{Une sol part}} + \underbrace{B' e^{2x}}_{\text{Les sol de l'eq Homo}}$$

Conclusion on a bien : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \dots e^{3x} + \dots e^{2x}$. Yes!!!

Démonstration : Démonstration "Version oral pèche"

Soit h une solution de l'équation différentielle homogène

On va chercher l'équation différentielle vérifiée par la fonction $f = h.e^{-rx} \iff h = f.e^{rx}$

Situation $\Delta \neq 0$

> On calcule h' et h'' , on trouve

$$\begin{aligned} h' &= f' e^{rx} + r f e^{rx} & \text{et} & & h'' &= f'' e^{rx} + 2r f' e^{rx} + r^2 f e^{rx} \\ &= (f' + r f) e^{rx} & & & &= (f'' + 2r f' + r^2 f) e^{rx} \end{aligned}$$

> Comme h vérifie (H), on a

$$\begin{aligned} a h'' + b h' + c h &= 0 \\ \iff (a f'' + 2r f' + r^2 f) e^{rx} + (b f' + r f) e^{rx} + c f e^{rx} &= 0 \\ \iff [a f'' + (2ra + b) f' + (ar^2 + br + c) f] e^{rx} &= 0 \\ \text{Or } e^{rx} \neq 0 \text{ et } ar^2 + br + c = 0 \text{ car } r \text{ est une sol de l'équation caractéristique.} \\ \iff a f'' + (2ra + b) f' &= 0 \end{aligned}$$

> On remarque que comme r et r' sont solution de l'équa caractéristique,

$$\text{on a } r + r' = -b/a \text{ et donc } 2ra + b = a(2r + \frac{b}{a}) = a(2r - r - r') = 2a(r - r')$$

Ainsi on a

$$a f'' + (2ra + b) f' = 0 \iff a f'' + a(r - r') f' = 0 \iff f'' - (r - r') f' = 0$$

On applique la théorie des équations différentielles d'ordre 1 à la fonction f'

et on en déduit $\forall x, f'(x) = \alpha e^{(r'-r)x}$.

> On primitive, on a $f(x) = \beta e^{(r'-r)x} + \alpha$

$$\text{Conclusion : } \forall x, h(x) = f(x) e^{rx} = \lambda e^{rx} + \mu e^{r'x}$$

Fini.

Situation $\Delta = 0$

C'est la même démonstration mais comme $\Delta = 0$ on a en plus $r = -b/2a$

donc $ar^2 + br = 0$ Ainsi $a f'' + b f' + c f = 0 \iff a f'' = 0$.

Ainsi $f'' = 0 \iff f' = \alpha \iff f = \alpha x + \beta$

$$\text{Conclusion : } \forall x, h(x) = f(x) e^{rx} = (\alpha x + \beta) e^{rx}$$

4.3 Solution particulière.

Théorème 14. Le principe du miroir.

Pour trouver une solution particulière de l'équation

$$a y'' + b y' + c y = f(x)$$

Il n'y a pas de méthode directe, la méthode de variation de la constante n'est pas transposable (en sup du moins) donc il faut s'adapter!!!

Le principe du miroir

$$f(x) \quad \text{---|---} \quad y_p(x)$$

$$\text{MIROIR} \quad \text{---|---} \quad \text{ЯIOЯIM}$$

> Lorsque $f(x) = \text{Poly de degré 1}$,

on cherche une solution particulière $y_p(x) = \text{Poly de degré 1}$.

> Lorsque $f(x) = (\text{Poly de degré 1}) \times e^{ax}$,

on cherche une solution particulière $y_p(x) = (\text{Poly de degré 1}) \times e^{ax}$

> Lorsque $f(x) = \cos(\omega x)$,

on cherche une solution particulière $y_p(x) = \lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x)$

5 Le principe de Cauchy

Théorème 15. Principe de Cauchy d'ordre 1.

Lorsqu'on résout une équation différentielle linéaire d'ordre 1, les solutions dépendent d'une constante k que l'on peut déterminer avec une condition initiale.

Il n'y a alors plus d'indétermination et la solution est unique.

Principe de Cauchy Il existe une unique fonction f

> vérifiant une équation différentielle d'ordre 1

et

> satisfaisant à la condition initiale $f(x_0) = a$.

Exemple historique.

En terminale, la fonction exp est définie à l'aide de ce principe, CàD

La fonction exp est l'unique fonction vérifiant l'équation différentielle $y' = y$ et tel que $y(0) = 1$

Théorème 16. Principe de Cauchy d'ordre 2.

Quand on résout une équation différentielle linéaire d'ordre 2,

les solutions dépendent de 2 constantes λ et μ que l'on peut déterminer avec une condition initiale.

Il n'y a alors plus d'indétermination et la solution est unique.

Principe de Cauchy Il existe une unique fonction f

> vérifiant une équation différentielle d'ordre 2

et

> satisfaisant aux conditions initiales $f(x_0) = a$ et $f'(x_0) = b$.

Exemples.

La fonction cos est l'unique fonction vérifiant

vérifiant l'équation différentielle $y'' = -y$ et tel que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$

La fonction cosh est l'unique fonction vérifiant

vérifiant l'équation différentielle $y'' = +y$ et tel que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$

Kulture : En intégrant les équations différentielles, on a montré que le problème de Cauchy avait une solution unique.

Notre justification est valide car l'équation différentielle est linéaire et donc on sait la résoudre.

Cauchy a démontré ces théorèmes pour toutes les équations différentielles linéaires et non-linéaires. Mais sa démonstration ne permet pas de résoudre explicitement les équations différentielles non-linéaires mais seulement (et c'est déjà remarquable) de justifier qu'elles ont une unique solution.

6 Exercices

———— Équation du premier ordre ————

Exercice 1. [Correction] Résoudre les équations différentielles.

- | | |
|---|---|
| 1. Sur $]0, +\infty[$, $(1+x^2) y'(x) + 2x y(x) = \frac{1}{x}$
2. Sur $]0, +\infty[$, $2xy' - 3y = \sqrt{x}$ | 3. sur $]0, 1[$, $xy' + 2y = \frac{1}{1-x^2}$
4. Sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\cos t y' + \sin t y = 1$ |
|---|---|

Exercice 2. [Correction] Trouver une équation différentielle d'ordre 1 dont les solutions sont les fonctions définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x+A}{1+x^2}$$

1. Identifier qui doit être la solution de l'équation homogène et la solution particulière.
2. Déterminer l'équation différentielle homogène.
3. Déterminer le second membre.

Exercice 3. Soit $\lambda \neq -1$ et f l'unique fonction solution de l'équation différentielle $y' + y = e^{\lambda x}$ et tel que $f(0) = 1$.

Déterminer f puis trouver les réels λ tels que la fonction f est bornée sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 4. [Correction] Trouver les fonctions f de $[0, 1]$ à valeur dans $\mathbb{R}$ telle que

$$f' + f = f(0) + f(1).$$

Exercice 5. [Correction] On considère sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) .

$$y' + y - xy^2 = 0 \quad (E)$$

On suppose que la fonction y est une solution de (E) et on suppose que la fonction y ne s'annule pas.

On considère sur $\mathbb{R}$ la fonction z par la formule $z(x) = \frac{1}{y(x)}$

1. Déterminer l'équation (E') vérifiée par la fonction z .
2. Déterminer $z(x)$ puis $y(x)$.

Exercice 6. [Correction] Soit f une fonction dérivable vérifiant

$$\forall x, y \text{ dans } \mathbb{R}, \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

Pour une rédaction propre et claire, on utilisera la phrase : "J'applique l'égalité avec"

1. Montrer que $f(0) = 0$.
2. Pour la suite, on note $\alpha = f'(0)$.
 - (a) Montrer que : $\forall t, \quad f'(t) = \alpha$.
 - (b) Déterminer f .

Exercice 7. [Correction] Soit f une fonction dérivable vérifiant

$$f(x+y) = f(x)f(y) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R} \quad (E)$$

Pour une rédaction propre et claire, on utilisera la phrase : "J'applique l'égalité avec"

1. Calculer $f(0)$ et que la fonction f est positive.
2. On suppose que $f(0) = 0$.
Montrer que : la fonction f est constante égale à 0.
3. On suppose que $f(0) = 1$. Et on note $\alpha = f'(0)$.
 - (a) Montrer que : $\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = \alpha f(t)$
 - (b) Résoudre l'équation différentielle
 - (c) Déterminer f .

Exercice 8. Le but est de déterminer les fonctions f définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R}_+^*$, vérifiant

$$\forall x, y > 0, f(xy) = f(x)f(y)$$

1. Généralité.
 - (a) Montrer $f(1) = 0$ ou $f(1) = 1$.
 - (b) Montrer que la fonction f est positive.
 - (c) On suppose que $f(1) = 0$.
Déterminer f .

On suppose dorénavant que $f(1) = 1$

2. On suppose que f est dérivable et que $f(1) = 1$. On note $f'(1) = \alpha$.
Déterminer f .
Indication : on montrera que f est solution d'une équation différentielle.
3. On suppose que f est simplement continue et que $f(1) = 1$.
Montrer que la fonction f est dérivable puis déterminer f .
Indication : Comme f est continue alors elle admet des primitives puis on primitive.

—— Équation du deuxième ordre ——

Exercice 9. Résoudre, sur $\mathbb{R}$, les équations différentielles suivantes

$$\begin{array}{ll} y'' = 0 & y'' = g \\ y'' - y = 0 & y'' + 4y' = 0 \\ y'' + y = 0 & y'' + 4y = 0 \\ y'' - 4y' + 3y = 0 & y'' - 6y' + 9y = 0 \quad \text{avec } y(0) = 1 \text{ et } y'(0) = 1 \end{array}$$

Exercice 10. Trouver une solution particulière pour les équations différentielles suivante

$$\begin{array}{l} y'' + y' + y = 3 \\ y'' + y' + y = 2x \\ y'' + y = x \quad \text{et} \quad y'' + y = e^{4x} \quad \text{puis} \quad y'' + y = x + e^{4x} \\ y'' + y = \cos(2x) \end{array}$$

Exercice 11. Soit f une fonctions vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f(-x)$

1. Montrer que f est solution d'une équation différentielle d'ordre 2.
2. Trouver f .

Exercice 12. [\[Correction\]](#) On suppose que la fonction y est solution de l'équation différentielle

$$\forall x > 0, x^2 \cdot y''(x) + 3x \cdot y'(x) + y(x) = x^3.$$

On considère la fonction z définie par $z: t \mapsto z(t) = y(e^t)$.

On dit en langage vulgaire que l'on fait le changement de variable $x = \sin t$.

1. Trouver l'équation différentielle vérifiée par la fonction z
2. Déterminer la fonction z puis la fonction y .

Exercice 13. [\[Correction\]](#) On considère l'équation différentielle (E)

$$\forall x > 0, y'' + 3y' + 2y = \frac{x-1}{x^2} e^{-x} \quad (E)$$

1. Résoudre l'équation homogène.
2. Chercher une solution particulière y_0 de la forme $y_0(x) = z(x)e^{-x}$, où z est une fonction à déterminer.
3. Conclure.

Exercice 14. Soit $y: x \mapsto y(x)$ une solution de l'équation différentielle (E)

$$\forall x \in]-1, 1[, (1-x^2)y'' - xy' + y = 0 \quad (E)$$

On considère la fonction z par $z(t) = y(\sin t)$.

On dit en langage vulgaire que l'on fait le changement de variable $x = \sin t$.

1. Déterminer $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ les ensembles de définition et de dérivabilité de z .
Déterminer l'équation (E') vérifiée par z .
2. Déterminer z puis y .

Exercice 15. [Correction] Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue deux fois dérivables vérifiant l'équation différentielle

$$\begin{cases} f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) \text{ pour tout } x > 0 \\ f(1) = 1 \end{cases}$$

1. Montrer que : pour tout $t > 0$, $t^2 f''(t) + f(t) = 0$.
2. On considère la fonction g définie par $g(u) = f(e^u)$.
 - (a) Déterminer l'ensemble de définition et de dérivabilité de g et montrer que g est solution d'une équation différentielle linéaire.
 - (b) Déterminer g .
3. Déterminer f .

Exercice 16. On cherche à déterminer les fonctions deux fois dérivables vérifiant

$$f'(x) = 2f(-x) + x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \quad (E)$$

1. On considère l'équation différentielle $(F) \quad y'' + 4y = 2x + 1$.
 - (a) Résoudre l'équation différentielle homogène.
 - (b) Déterminer une solution particulière de la forme $y_p : x \mapsto ax + b$
 - (c) Donner les solutions de (F) .
2. Résolution de (E) .
Soit f une solution de (E) .
 - (a) Démontrer que f est solution de (F) .
 - (b) Pourquoi ne peut-on pas conclure ?
 - (c) Démontrer que l'on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} + \lambda [\cos(2x) + \sin(2x)]$$

—— Principe-Processus de Cauchy. ——

Exercice 17. On veut que : $\forall x, y \in \mathbb{R}, e^{x+y} = e^x + e^y$

Montrer que les fonction $f : x \mapsto e^{x+y}$ et $g : x \mapsto e^x e^y$ vérifie le même 'processus de Cauchy'

$$y' - y = 0 \text{ et } y'(0) = e^y$$

Conclure

Exercice 18. Soit les fonction $f : x \mapsto \cos(x+a)$ et $g : x \mapsto \cos(x)\cos(a) - \sin(x)\sin(a)$

1. Vérifier f est solution de l'équa diff $y'' = -y$. Calculer $f(0)$ et $f'(0)$.
2. Vérifier g est solution de l'équa diff $y'' = -y$. Calculer $g(0)$ et $g'(0)$.
3. En déduire (à l'aide du principe de Cauchy) que : $\cos(x+a) = \cos(x)\cos(a) - \sin(x)\sin(a)$.

Exercice 19. [Correction] Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et h une fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$
On étudie l'équation différentielle : $(E) \quad y' + ay = h(x)$

1. Montrer que, si f est une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation (E) ,
alors la fonction $g : x \mapsto f(x+T)$ l'est aussi.
2. En déduire qu'une solution f est T -périodique si et seulement si $f(0) = f(T)$
3. Écrire toutes les solutions de l'équa diff (E) .
En déduire que l'équation (E) admet une unique solution T -périodique.

Correction.

Solution de l'exercice 1 (Énoncé)

1. A faire

2. On résout sur $]0, +\infty[$

$$\forall x > 0, 2xy' - 3y = \sqrt{x}$$

$$\Leftrightarrow y' - \frac{3}{2x}y = \frac{\sqrt{x}}{2x}$$

$$\text{Une primitive de } -\frac{3}{2x} \text{ est } -\frac{3}{2}\ln|x| = -\frac{3}{2}\ln x$$

$$\Leftrightarrow \left[y' - \frac{3}{2x}y \right] e^{-\frac{3}{2}\ln x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{-\frac{3}{2}\ln x}$$

$$\Leftrightarrow \left[y \cdot e^{-\frac{3}{2}\ln x} \right]' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot e^{-\frac{3}{2}\ln x} = \frac{1}{2x^{-2}}$$

$$\text{Ainsi il existe une constante } k \text{ telle que } x^{-\frac{3}{2}}y(x) = \frac{1}{2} \frac{x^{-1}}{(-1)} + k$$

$$\text{Conclusion : pour } x > 0, \quad y(x) = \left(-\frac{1}{2x} + k \right) x^{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2}\sqrt{x} + kx\sqrt{x}$$

3. On résout sur $]0, 1[$

$$\forall x \in]0, 1[, \quad xy'(x) + 2y(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\Leftrightarrow y'(x) + \frac{2}{x}y(x) = \frac{1}{x(1-x^2)}$$

$$\text{Une primitive de } \frac{2}{x} \text{ est } 2\ln|x| = 2\ln x$$

$$\Leftrightarrow \left(y'(x) + \frac{2}{x}y(x) \right) e^{2\ln x} = \frac{1}{x(1-x^2)} e^{2\ln x}$$

$$\Leftrightarrow \left[y(x)e^{2\ln x} \right]' e^{-2\ln x} = \frac{1}{x(1-x^2)} x^2$$

$$\Leftrightarrow \left[y(x)e^{2\ln x} \right]' = \frac{x}{(1-x^2)} = -\frac{x}{(x^2-1)}$$

$$\text{Ainsi } \forall x \in]0, 1[, \quad x^2 y(x) = -\frac{1}{2} \ln|x^2-1| + K = -\frac{1}{2} \ln(1-x^2) + K$$

$$\text{Conclusion : } \forall x \in]0, 1[, \quad y(x) = -\frac{1}{2} \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} + \frac{K}{x^2}$$

4. On résout sur $]0, \pi[$ > **Méthode classique.**

$$\forall x \in]0, \pi[, \quad \sin(x) y'(x) - \cos(x) y(x) = 1$$

$$\Leftrightarrow y'(x) - \frac{\cos x}{\sin x} y(x) = \frac{1}{\sin(x)}$$

$$\text{Une primitive de } -\frac{\cos x}{\sin x} \text{ est } -\ln|\sin(x)| = -\ln(\sin(x))$$

$$\Leftrightarrow \left[y'(x) - \frac{\cos x}{\sin x} y(x) \right] e^{-\ln \sin x} = \frac{1}{\sin(x)} e^{-\ln \sin x}$$

$$\Leftrightarrow \left[y(x)e^{-\ln \sin x} \right]' = \frac{1}{\sin^2(x)}$$

Après tout ces calculs, il y a un gros problème, c'est

$$\frac{1}{\sin^2 x} \quad \text{Une Primitive} \quad \text{BOF}$$

Remarque : une primitive de $\frac{1}{\sin^2(x)}$ est $-\frac{\cos(x)}{\sin(x)}$ donc on peut continuer.

> **Méthode astucieuse.**

On a

$$\forall x \in]0, \pi[, \sin(x) y'(x) + \cos(x) y(x) = 1 \iff [\sin(x) y(x)]' = 1$$

Ainsi il existe une constante k telle que : $\sin x \cdot y = x + k$

$$\iff \forall x \in]0, \pi[, y(x) = \frac{x}{\sin(x)} + \frac{k}{\sin(x)}$$

Solution de l'exercice 2 (Énoncé) On doit avoir

$$f(x) = \frac{x+A}{1+x^2} = \underbrace{\frac{x}{1+x^2}}_{\text{Sol particulière}} + \underbrace{\frac{A}{1+x^2}}_{\text{Sol de l'eq Homogène}}$$

On commence par trouver l'équation homogène Comme $\left[\frac{1}{1+x^2} \right]' = 2x \frac{-1}{(1+x^2)^2}$

Ainsi l'équation homogène est : $(1+x^2)y' + 2xy = 0$

Puis trouve le second membre pour que $\frac{x}{1+x^2}$ soit une sol particulière

$$\text{On a : Second Membre} = (1+x^2) \left[\frac{x}{1+x^2} \right]' + 2x \frac{x}{1+x^2}$$

Solution de l'exercice 4 (Énoncé) Les fonctions f sont des solutions de l'équation différentielle $y' + y = K$ où K est une constante, ainsi avec la théorie classique on trouve

$$\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = \lambda e^{-x} + K$$

De plus f soit effectivement une solution Ssi

$$\begin{aligned} K &= f(0) + f(1) = (\lambda e^{-0} + K) + (\lambda e^{-1} + K) \\ &\iff K = -(1 + e^{-1})\lambda \end{aligned}$$

Conclusion : Les fonctions cherchées sont : $\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = \lambda e^{-x} - (1 + e^{-1})\lambda$

Solution de l'exercice 5 (Énoncé) On suppose que la fonction y est solution de l'équation différentielle

$$y' + y = x y^2.$$

Remarque : Il y a y^2 donc l'équation différentielle n'est pas linéaire et Donc les théories classiques ne s'appliquent pas.

1. On suppose que la fonction y ne s'annule pas sur $\mathcal{D}$.

On considère la fonction z définie par $z(x) = \frac{1}{y(x)}$.

$$\text{On a } z(x) = \frac{1}{y(x)}$$

comme la fonction y ne s'annule pas sur $\mathcal{D}$

La fonction z est bien définie et ne s'annule pas sur $\mathcal{D}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{On a donc } y(x) &= \frac{1}{z(x)} \text{ et } y'(x) = [y(x)]' \\ &= \left[\frac{1}{z(x)} \right]' \\ &= \frac{-z'(x)}{[z(x)]^2} \end{aligned}$$

$$\textbf{Conclusion : } y'(x) + y(x) = [y(x)]^2$$

On remplace $y(x)$ et $y'(x)$

$$\Rightarrow \frac{-z'(x)}{[z(x)]^2} + \frac{1}{z(x)} = \left[\frac{1}{z(x)} \right]^2$$

$$\Rightarrow -z'(x) + z(x) = 1$$

2. l'équation différentielle vérifiée par la fonction z est classique donc

Avec la théorie classique s'applique, on détermine la fonction z puis la fonction y .

Solution de l'exercice 6 (Énoncé) Soit f une fonction C^∞ vérifiant

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R} \quad (E)$$

Pour une rédaction propre et claire, on utilisera la phrase

"J'applique l'égalité avec

1. J'applique l'égalité avec $x=0$ et $y=0$, ainsi

$$\begin{aligned} f(0+0) &= f(0) + f(0) \\ \Rightarrow f(0) &= 0 \end{aligned}$$

2. Pour la suite, on note $\alpha = f'(0)$.

(a) je dérive l'égalité par rapport à x

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [f(x+y)] &= \frac{d}{dx} [f(x) + f(y)] \\ \text{Ainsi on a } 1.f'(x+y) &= f'(x) + 0 \end{aligned}$$

J'applique l'égalité avec $x=0$ et $y=t$,

ainsi on a $f'(t) = \alpha$.

(b) On a maintenant

$$\begin{aligned} f'(t) &= \alpha \\ \Rightarrow \text{Il existe } k \text{ tel que } f(t) &= \alpha t + k \end{aligned}$$

Attention : on n'a pas trouver f mais seulement la forme "possible", CàD $f(x) = \alpha x + k$

En effet on sait que $f(0) = 0$ donc forcément $k = 0$, CàD $f(x) = \alpha x$

Enfin lorsque $f(x) = \alpha x$, on a

$$f(x+y) = \alpha(x+y) \text{ et } f(x) + f(y) = \alpha x + \alpha y$$

Conclusion : les fonctions dérivable vérifiant (E)
Sont : $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \alpha t$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$

Solution de l'exercice 7 (Énoncé) Soit f une fonction C^∞ vérifiant

$$f(x+y) = f(x)f(y) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R} \quad (E)$$

Pour une rédaction propre et claire, on utilisera la phrase

"J'applique l'égalité avec

1. J'applique l'égalité avec $x=0$ et $y=0$

Ainsi on a $f(0) =$

$$f(0) \cdot f(0) = [f(0)]^2$$

$$\Leftrightarrow f(0) - [f(0)]^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow f(0)[1 - f(0)] = 0$$

$$\Leftrightarrow f(0) = 0 \text{ ou } f(0) = 1$$

2. On suppose que $f(0) = 0$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$

On veut montrer que $f(x) = 0$

J'applique l'égalité avec $x=x$ et $y=0$

Ainsi on a $f(x) = f(x) \cdot f(0) = f(x) \cdot 0 = 0$

Conclusion : la fonction est constante égale à 0.

3. On suppose que $f(0) = 1$. Et on note $\alpha = f'(0)$.

- (a) Pour tout $y \in \mathbb{R}$. On dérive l'égalité (E) par rapport à x

$$\begin{aligned} \text{Ainsi on a } \frac{d}{dx} [f(x+y)] &= \frac{d}{dx} [f(x)f(y)] \\ &\Rightarrow 1f'(x+y) = f'(x)f(y) \end{aligned}$$

On a donc la nouvelle égalité $\forall x, y \in \mathbb{R}, f'(x+y) = f'(x)f(y)$

J'applique cette nouvelle égalité avec $x=0$ et $y=t$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi on a } f'(t) &= f'(0)f(t) = \alpha f(t) \\ &\Rightarrow f'(t) - \alpha f(t) = 0 \end{aligned}$$

- (b) On résout l'équation différentielle $f'(t) - \alpha f(t) = 0$

On trouve que $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = Ke^{\alpha t}$

- (c) On sait que $f(0) = Ke^{\alpha 0} = 1$ donc forcément $K = 1$, CàD $f(x) = e^{\alpha x}$

De plus, il est facile de vérifier que

$$\text{Lorsque } f(x) = e^{\alpha x}, \text{ alors on a bien } f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$$

Conclusion : les fonctions dérivable vérifiant (E)
Sont : $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = e^{\alpha t}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$

Solution de l'exercice 12 (Énoncé) On suppose que la fonction y est solution de l'équation différentielle

$$x^2 \cdot y''(x) + 3x \cdot y'(x) + y(x) = x^3.$$

1. L'équation est linéaire du 2-ième ordre **MAIS les coefficients ne sont pas constants**

Donc les théories classiques ne s'appliquent pas.

2. On considère la fonction z définie par $z(t) = y(e^t)$.

$$\text{On a } z(t) = y(e^t).$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{On a donc } z'(t) &= [y(e^t)]' = e^t y'(e^t), \text{ et } z''(t) = [y(e^t)]'' \\ &= [e^t \cdot y'(e^t)]' \\ &= e^t \cdot y'(e^t) + e^t \cdot e^t \cdot y''(e^t) \\ &= e^t \cdot y'(e^t) + e^{2t} \cdot y''(e^t) \end{aligned}$$

On sait que $x^2 \cdot y''(x) + 3x \cdot y'(x) + y(x) = x^3$.

→ J'applique cette égalité avec $x = e^t$, ainsi

$$(e^t)^2 \cdot y''(e^t) + 3e^t \cdot y'(e^t) + y(e^t) = (e^t)^3$$

$$\text{On a donc } \left[\underbrace{(e^t)^2 \cdot y''(e^t) + 3e^t \cdot y'(e^t)}_{\text{C'est } z''(t)} \right] + 2 \left[\underbrace{e^t \cdot y'(e^t)}_{\text{C'est } z'(t)} \right] + y(e^t) = e^{3t}$$

Conclusion : $z''(x) + 2z'(x) + z(x) = e^{3t}$

A noter : Les calculs ci dessus sont possibles SSi on peut écrire $x = e^t$ CàD si $x > 0$. Donc $\mathcal{D} =]0, +\infty[$

Remarque : *l'équation différentielle vérifiée par la fonction z est classique.*

Solution de l'exercice 13 (Énoncé) Correction rapide

1. L'équation caractéristique $X^2 + 3X + 2 = 0$ a pour racine $r = -1$ et $r = -2$, ainsi d'après la théories des équations différentielles, il existe λ, μ tel que

$$\forall x \in]0, +\infty[, y_h(x) = \lambda e^{-x} + \mu e^{-2x}$$

2. On cherche une solution particulière de l'équation complète de la forme $y_p(x) = z(x) e^{-x}$.

$$\begin{aligned} \text{On a } y_p(x) &= z_p(x) e^{-x} \\ y_p'(x) &= z_p'(x) e^{-x} - z_p(x) e^{-x} \\ y_p''(x) &= z_p''(x) e^{-x} - 2 z_p'(x) e^{-x} + z_p(x) e^{-x} \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} y_p'' + 3y_p' + 2y_p &= \frac{x-1}{x^2} e^{-x} \\ \text{on replace} \\ \Leftrightarrow [z_p''(x) e^{-x} - 2 z_p'(x) e^{-x} + z_p(x) e^{-x}] \\ &\quad + 3 [z_p'(x) e^{-x} - z_p(x) e^{-x}] + 2 [z_p(x) e^{-x}] = \frac{x-1}{x^2} e^{-x} \\ \text{on factorise, on regroupe et on simplifie par } e^{-x} \neq 0 \\ \Leftrightarrow z_p''(x) + z_p'(x) &= \frac{x-1}{x^2} \end{aligned}$$

Donc z_p' est une solution d'une équation diff classique d'ordre 1 et on la résout avec la méthode classique

$$\begin{aligned} z_p'' + z_p' &= \frac{x-1}{x^2} \\ \Leftrightarrow [z_p' e^x]' &= \frac{x-1}{x^2} e^x \\ \text{Ainsi il existe } k \text{ tel que } [z_p' e^x] &= \frac{e^x}{x} + k \\ \text{On a donc : } \forall x > 0, z_p'(x) &= \frac{1}{x} + k e^{-x} \end{aligned}$$

Conclusion : $\forall x > 0, z_p(x) = \ln|x| - k e^{-x} + m$ est une solution particulière.

3. Comme l'équation différentielle est linéaire, les solutions sont la somme
- > d'une solution particulière par exemple $y_p(x) = z_p(x) e^{-x} = \ln(x) e^{-x}$ je veux une sol part et je choisis $k = m = 0$
 - > des solutions de l'équation homogène.

Conclusion : Les solutions y de l'équation différentielle sont de la forme

$$\forall x > 0, y(x) = \ln(x) e^{-x} + \lambda e^{-x} + \mu e^{-2x} \text{ avec } k, m \in \mathbb{R}$$

Solution de l'exercice 15 (Énoncé) Soit f une fonction de $]0, +\infty[$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ continue deux fois dérivables vérifiant l'équation différentielle

$$\begin{cases} f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) \text{ pour tout } x > 0 \\ f(1) = 1 \end{cases}$$

1. On sait que $f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.

→ On dérive cette égalité $[...]' = [...]'$,

$$\text{Ainsi } f''(x) = \frac{-1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right)$$

→ On applique $f'(\square) = f\left(\frac{1}{\square}\right)$ avec $\square = \frac{1}{x}$

$$\text{Ainsi } f'\left(\frac{1}{x}\right) = f(x), \text{ on a donc } f''(x) = \frac{-1}{x^2} f(x)$$

On a bien $t^2 f''(t) + f(t) = 0$. *Fini* [rq les calculs sont valides sur l'intervalle $]0, +\infty[$]

2. On considère la fonction g définie par $g(u) = f(e^u)$.

(a) On peut calculer le nombre $g(u)$ Ssi $e^u \in D_f =]0, +\infty[$ Donc pas de problème car $e^u > 0$.

Donc g est def, C^0 et même C^∞ sur $\mathbb{R}$

(b) On a $g(u) = f(e^u)$

$$\Rightarrow g'(u) = [f(e^u)]' = e^u f'(e^u) \text{ et } g''(u) = [e^u f'(e^u)]' = e^u f'(e^u) + (e^u)^2 f''(e^u)$$

On a donc

$$A g''(u) + B g'(u) + C g(u) = A (e^u f'(e^u) + (e^u)^2 f''(e^u)) + B e^u f'(e^u) + C f(e^u)$$

$$= A (e^u)^2 f''(e^u) + (A+B) e^u f'(e^u) + C f(e^u)$$

Je choisis $A=1$ et $A+B=0$ et $A=C$

$$= (e^u)^2 f''(e^u) + f(e^u) = 0$$

Car c'est l'équa diff de Q1 avec $t = e^u$.

(c) La fonction g est solution de l'équation différentielle

$$1 g''(u) + (-1) g'(u) + 1 g(u) = 0$$

On sait la résoudre.

3. On sait que $f(e^u) = g(u)$, on applique avec $u = \ln x$ ainsi

$$f(x) = g(\ln x)$$

→ **Attention** : Comme la résolution est longue, on a surement fait des $\Rightarrow$ donc il faut vérifier parmi les solutions trouvées, celles qui effectivement vérifient $f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ et $f(1) = 1$

Solution de l'exercice 19 (Énoncé)

1. ok

2. ok

3. Les sol de $(E) y' + a y = h(x)$ sont la somme

$$\text{On a donc } \forall x \in \mathbb{R}, y(x) = f(x) + K e^{-ax}$$

La fonction y est périodique Ssi $y(0) = y(T)$

$$\text{Ssi } f(0) + K = f(T) + K J e^{-aT} \text{ Ssi } T = \dots$$

Conclusion : l'équation (E) admet une unique solution T-périodique