

Continuité sur un intervalle

Dérivabilité sur un intervalle

Fonctions convexes

Définition, interprétation géométrique, inégalité de Jensen.
 Caractérisation de la convexité à l'aide de la croissance des pentes.
 Une fonction convexe est continue sur l'intérieur de I .
 Caractérisation des fonctions convexes dérivables, deux fois dérivables.
 Position de la courbe représentative d'une fonction convexe et de ses tangentes.
 Exemples d'inégalités de convexité.

Formules de Taylor

Formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral pour une fonction de classe \mathcal{C}^{n+1} .
 Formule de Taylor-Young à l'ordre n en $a \in I$ pour une fonction de classe \mathcal{C}^n sur I .
 Exemples avec les fonctions usuelles à différents ordres en $a = 0$.
 Application : méthode de Newton d'approximation d'un zéro d'une fonction.
 Majoration de l'erreur commise.

Questions de cours

- Q.1** Énoncer et démontrer la formule de Jensen.
- Q.2** Montrer que f est convexe sur I si et seulement si

$$\forall (x, y, z) \in I^3, x < y < z \Rightarrow \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$
- Q.3** Déterminer les positions relatives de la courbe représentative d'une fonction convexe et de ses tangentes.
- Q.4** Énoncer et démontrer l'inégalité entre les moyennes arithmétiques et géométriques.
- Q.5** A l'aide d'arguments de convexité, montrer que
 $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$ et que $\forall x > -1, \ln(1 + x) < x$.
- Q.6** Énoncé et démonstration de la formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral.
- Q.7** Démontrer que si $f \in \mathcal{C}^{(n+1)}(I, \mathbb{R})$, la formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral implique la formule de Taylor-Young en $a \in \overset{\circ}{I}$.
- Q.8** Exposé de la méthode de Newton de calcul approché d'un zéro d'une fonction : calcul de la valeur approchée, interprétation qualitative de l'approximation.
 Majoration de l'erreur commise, interprétation quantitative.
- Q.9** Démontrer que pour tout réel x , $e^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=0}^n a_k x^k \right]$, avec $a_k = \dots$.
- Q.10** À l'aide d'une formule de Taylor-Young, déterminer le développement limité à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ en 0 de $x \mapsto \ln(1 + x)$.
- Q.11** À l'aide d'une formule de Taylor-Young, déterminer le développement limité à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ en 0 de $x \mapsto (1 + x)^\alpha$.
- Q.12** À l'aide d'une formule de Taylor-Young, déterminer le développement limité à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ en 0 de \sin , \cos , sh et ch en 0.

À venir : développements limités, puis espaces vectoriels de dimension finie.