DS 2 - CORRECTION

Questions de cours

1. Voir cours.
2. La solution est $u(t) = U_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ avec $\tau = 0,5 \text{ s}$
3. Tracé du faisceau de lumière :

4. Voir cours.

Exercice 1 : chimie

1. Nous dressons le tableau d'avancement relatif à la réaction étudiée, avec $n_0 = 0,500 \text{ mol}$:

	$\text{COBr}_2(\text{g})$	=	$\text{CO}(\text{g})$	+	$\text{Br}_2(\text{g})$
EI/mol	n_0		0		0
EF/mol	$n_0 - \xi$		ξ		ξ

et nous exprimons la constante d'équilibre K° vérifiée dans l'état final (observation de l'équilibre chimique) :

$$K^\circ = \frac{p_{\text{CO}} \times p_{\text{Br}_2}}{p_{\text{COBr}_2} \times p^\circ}$$

avec chaque pression partielle exprimée sous la forme : $p_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}^{\text{g}}} P_{\text{tot}}^{\text{g}}$

Dans cette expression $n_{\text{tot}}^{\text{g}}$ désigne la quantité de matière totale gazeuse et $P_{\text{tot}}^{\text{g}}$ la pression totale.

$n_{\text{tot}}^{\text{g}} = n_0 + \xi$ donc :

$$K^\circ = \frac{n_{\text{CO}} \times n_{\text{Br}_2}}{n_{\text{COBr}_2} \times n_{\text{tot}}^{\text{g}}} \times \frac{P_{\text{tot}}^{\text{g}}}{p^\circ} = \frac{\xi_{\text{eq},1}^2}{(n_0 - \xi_{\text{eq},1})(n_0 + \xi_{\text{eq},1})} \left(\frac{P_{\text{tot}}^{\text{g}}}{p^\circ} \right)$$

2. On en déduit :

$$K^\circ = \frac{\xi_{\text{eq},1}^2}{(n_0 + \xi_{\text{eq},1})(n_0 - \xi_{\text{eq},1})} \left(\frac{n_0 + \xi_{\text{eq},1}}{V p^\circ} \right) RT$$

$$= \frac{\xi_{\text{eq},1}^2}{(n_0 - \xi_{\text{eq},1})} \left(\frac{RT}{V p^\circ} \right)$$

Numériquement :
$$5,46 = \frac{\xi_{\text{eq},1}^2}{(0,500 - \xi_{\text{eq},1})} \left(\frac{8,314 \times 293}{2,00 \times 10^{-3} \times 10^5} \right)$$

3. Cette équation du second degré conduit à la solution $\xi_{\text{eq},1} = 0,10 \text{ mol}$ (on élimine l'autre solution car elle est supérieure à $\xi_{\text{max}} = 0,500 \text{ mol}$).

La composition à l'équilibre est donc : 0,10 mol de monoxyde de carbone et de dibrome, et 0,40 mol de COBr₂.

Le pourcentage de COBr₂ décomposé à cette température est égal à :
$$\frac{0,10}{0,500} \times 100 = 20 \%$$

4. Le quotient de réaction juste après l'ajout s'écrit :

$$Q_r = \frac{\xi_{\text{eq},1}(\xi_{\text{eq},1} + n')}{(n_0 - \xi_{\text{eq},1})(n_0 + n' + \xi_{\text{eq},1})} \left(\frac{p}{p^\circ} \right) = \frac{\xi_{\text{eq},1}(\xi_{\text{eq},1} + n')}{(n_0 - \xi_{\text{eq},1})(n_0 + n' + \xi_{\text{eq},1})} \left(\frac{n_0 + n' + \xi_{\text{eq},1}}{Vp^\circ} \right) RT$$

$$= \frac{\xi_{\text{eq},1}(\xi_{\text{eq},1} + n')}{(n_0 - \xi_{\text{eq},1})} \left(\frac{RT}{Vp^\circ} \right)$$

Remarque : on ne peut pas juste répondre que seul $n(\text{CO})$ a changé donc on ne change qu'un $\xi_{\text{eq},1}$ en $(\xi_{\text{eq},1} + n')$ car n_{tot}^g a aussi changé en $(n_0 + n' + \xi_{\text{eq},1})$... Donc il faut au moins en parler dans le raisonnement (ou faire la démonstration comme ci-dessus).

5. $Q_r > K^\circ$ car $\xi_{\text{eq},1} + n' > \xi_{\text{eq},1}$

Donc le système évolue dans le sens indirect.

6. Lorsqu'un nouvel état d'équilibre est observé, Q_r est à nouveau égal à la constante d'équilibre et l'avancement $\xi_{\text{eq},2}$ de la réaction vérifie alors l'équation :

$$K^\circ = \frac{\xi_{\text{eq},2}(\xi_{\text{eq},2} + n')}{(n_0 - \xi_{\text{eq},2})} \left(\frac{RT}{Vp^\circ} \right)$$

Exercice 2 : étude d'un viseur

A- Système afocal

1. Le système est afocal si l'image par le système d'un point situé à l'infini A_∞ est elle-même à l'infini A'_∞ . Or, l'image A_1 de A_∞ est dans le plan focal image de (L_1) et pour que A_1 forme par (L_2) une image à A'_∞ à l'infini, il faut que A_1 soit dans le plan focal objet de (L_2) . En prenant A_∞ sur Δ , on a $A_1 = F'_1 = F_2$.

On peut résumer ainsi : $A_\infty \xrightarrow{(L_1)} A_1 = F'_1 = F_2 \xrightarrow{(L_2)} A'_\infty$

Par décomposition, $D = \overline{O_1O_2} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F'_1O_2} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F_2O_2} = f'_1 - f_2$ avec $f_2 = -f'_2$ la distance focale objet de (L_2) .

On a donc
$$D = f'_1 + f'_2 = 12 \text{ cm}$$

2. Dans les triangles $O_1A_1B_1$ et $A_1B_1O_2$, on lit successivement :

$$\tan \alpha \simeq \alpha = \frac{\overline{F'_1B_1}}{O_1F'_1} < 0 \text{ et } \tan \alpha' \simeq \alpha' = \frac{\overline{F_2B_1}}{O_2F_2} > 0$$

d'où
$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} \simeq -\frac{f'_1}{f'_2} = -5,0$$

Valeur dont on vérifie la cohérence sur la figure réalisée dans les questions de cours.

B- Objet à distance finie

3. On reprend le même raisonnement que dans la question 1 mais cette fois, A est à distance finie : $\overline{O_1A} = -20$ cm.

On peut résumer ainsi : $A \xrightarrow{(L_1)} A_1 = F_2 \neq F_1' \xrightarrow{(L_2)} A'_\infty$

L'image de A par (L_1) doit être F_2 et en appliquant la relation de conjugaison de Descartes à (L_1) , on obtient

$$\frac{1}{\overline{O_1F_2}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f_1'} \Rightarrow \overline{O_1F_2} = \frac{f_1' \cdot \overline{O_1A}}{f_1' + \overline{O_1A}} = \overline{O_1O_2} + \overline{O_2F_2} = D - f_2'$$

D'où $D = f_2' + \frac{f_1' \cdot \overline{O_1A}}{f_1' + \overline{O_1A}}$ et avec $\overline{O_1A} = -20$ cm, on obtient $D = 22$ cm

4. Tracé :

C- Observation avec un œil qui accomode

5. Toujours pour $D = \overline{O_1O_2} = 22$ cm.

(a) O' , le centre du cercle oculaire est l'image de O_1 par L_2 : $O_1 - (L_2) \rightarrow O'$ On applique donc la relation de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{O_2O'}} - \frac{1}{\overline{O_2O_1}} = \frac{1}{f_2'} \Rightarrow p' = \overline{O_2O'} = \frac{f_2' \cdot \overline{O_2O_1}}{f_2' + \overline{O_2O_1}} = \frac{f_2'D}{D - f_2'}$$

L'application numérique donne $p' = 2,2$ cm c'est à dire juste derrière F_2' .

6. Pour que $A'B'$ soit vu à travers l'oculaire par l'observateur placé en O' , il faut que la distance qui les sépare soit supérieure ou égale à d_m .

Or ici, $\overline{O'A'} < 0$ d'où $-\infty < \overline{O'A'} \leq -d_m$.

On décompose ensuite $\overline{O'A'} = \overline{O'O_2} + \overline{O_2F_2'} + \overline{F_2'A'} = -p' + f_2' + \overline{F_2'A'}$.

On a donc $-\infty < -p' + f_2' + \overline{F_2'A'} \leq -d_m \Rightarrow -\infty < \overline{F_2'A'} \leq d_m + p' - f_2'$ soit $l \leq \overline{A'F_2'} < +\infty$

en posant $l = d_m + f_2' - p'$.

7. Question bonus :

La relation de conjugaison de Newton appliquée à (L_2) donne $\overline{F_2A_1} \overline{F_2'A'} = -f_2'^2 \Rightarrow \overline{F_2A_1} = \frac{f_2'^2}{\overline{A'F_2'}}$
 $\overline{F_2F_1'} + \overline{F_1'A_1}$

d'où $\overline{F_1'A_1} = \frac{f_2'^2}{\overline{A'F_2'}} - \overline{F_2F_1'} = \frac{f_2'^2}{\overline{A'F_2'}} - (\overline{F_2O_2} + \overline{O_2O_1} + \overline{O_1F_1'}) \Rightarrow \overline{F_1'A_1} = \frac{f_2'^2}{\overline{A'F_2'}} - f_2' + D - f_1'$

En reprenant l'inégalité obtenue dans la question précédente, $l \leq \overline{A'F'_2} < +\infty$, on a donc $-f'_2 + D - f'_1 \leq \overline{F'_1A_1} \leq \frac{f_2'^2}{l} - f'_2 + D - f'_1$: relation (1).

De même, la relation de conjugaison de Newton appliquée à (L_1) donne $\overline{F_1A} \cdot \overline{F'_1A_1} = -f_1'^2 \Rightarrow \overline{F_1A} = -\frac{f_1'^2}{\overline{F'_1A_1}}$ et comme (d'après la relation 1), $\frac{-1}{-f'_2+D-f'_1} \leq \frac{-1}{\overline{F'_1A_1}} \leq \frac{-1}{\frac{f_2'^2}{l}-f'_2+D-f'_1}$, on a bien

$$\boxed{-\frac{f_1'^2}{D - f'_1 - f'_2} \leq \overline{F_1A} \leq -\frac{f_1'^2}{D - f'_1 - f'_2 + \frac{f_2'^2}{l}}}$$

8. AN : $\overline{F_1A}_{\min} = -10$ cm correspond à A_1 en F_2 , l'œil n'accommode pas et $\overline{F_1A}_{\max} = -9,8$ cm : $-10 \leq \overline{F_1A} \leq -9,8$ cm d'où une latitude de mise au point $\Delta\overline{F_1A} \approx 2$ mm

Exercice 3 : capteur d'empreintes

1. Voir TD.
2. Tracé :

3. Voir TD.