

Notes de révision du cours de mathématiques

MPSI

Walter NGAMBOU, walter.ngambou@ac-versailles.fr

Lycée Pasteur, 2024–2025
Version du 16 février 2025

Chapitre 15

Matrices 1

Sommaire

1	Opérations sur les matrices	1
1.1	Définitions	1
1.2	Addition, multiplication par un scalaire	4
1.3	Produit matriciel	7
1.4	Transposition	16
1.5	Opérations élémentaires	18
2	Systèmes linéaires	21
2.1	Écriture matricielle d'un système linéaire	21
2.2	Structure de l'ensemble des solutions	22
2.3	Opérations élémentaires et méthode du pivot	23
3	Matrices carrées	29
3.1	Formes particulières de matrices carrées	29
3.2	Structure d'anneau non commutatif	34
3.3	Matrices carrées inversibles : groupe linéaire	37
3.4	Inversibilité et matrices triangulaires	42
3.5	Trace d'une matrice carrée	44

Cadre de travail.

Dans tout le chapitre, on désigne par

- ▷ \mathbb{K} un des deux corps \mathbb{R} et \mathbb{C} .
- ▷ $n, p, q,$ et r des entiers naturels tous non nuls.

1 Opérations sur les matrices

1.1 Définitions

Définition 1 : *Matrice, taille/format, coefficient, ligne, colonne, diagonale.*

1. On appelle *matrice* à n lignes et p colonnes à coefficients dans \mathbb{K} toute famille d'éléments de \mathbb{K} indexée par $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$; c'est-à-dire tout élément de l'ensemble $\mathbb{K}^{\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket}$.
2. On parle de matrice de *taille* ou de *format* (n, p) .
3. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, la composante d'indice (i, j) de A est appelée *coefficient* d'indice (i, j) de A , et est notée

$$M_{i,j} \text{ ou } (M)_{i,j} \text{ ou } [M]_{i,j}.$$

4. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la matrice

$$M_{i,\cdot} \stackrel{\text{def.}}{=} \begin{bmatrix} M_{i,1} & M_{i,2} & \cdots & M_{i,p} \end{bmatrix}$$

est appelée *ligne* d'indice i de M ou i -ème ligne de M .

5. Pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, la matrice

$$M_{\cdot, j} \stackrel{\text{def.}}{=} \begin{bmatrix} M_{1,j} \\ M_{2,j} \\ \vdots \\ M_{n,j} \end{bmatrix}$$

est appelée *colonne* d'indice j de M ou j -ème colonne de M .

6. Dans le cas où $n = p$, la n -liste

$$(M_{1,1}, M_{2,2}, \dots, M_{n,n})$$

est appelée *diagonale* de M .

Représentation.

On représente visuellement une matrice sous la forme

$$M = \begin{bmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} & \cdots & M_{1,j} & \cdots & M_{1,p} \\ M_{2,1} & M_{2,2} & \cdots & M_{2,j} & \cdots & M_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ M_{i,1} & M_{i,2} & \cdots & M_{i,j} & \cdots & M_{i,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ M_{n,1} & M_{n,2} & \cdots & M_{n,j} & \cdots & M_{n,p} \end{bmatrix}$$

Notation.

1. On peut définir une matrice M en posant $M = (m_{i,j} : (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket)$ ou $M = (m_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.
2. On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, ou $\mathbb{K}^{n \times p}$, l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans \mathbb{K} .
3. Dans le cas où $n = p$, on note simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et on parle de matrices carrées d'ordre n .

Remarque.

Lorsqu'on aura à parler de matrices extraites, ou de sous-matrices, on pourra aussi indexer une matrice par un produit cartésien de parties non vides des entiers naturels. Ici, les indices 1, 2, 3 etc sont à regarder comme les ordinaux 1^{er} , 2^e , 3^e etc.

Exemple 1.1.

1. Si $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $A \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.

2. Si $B = \begin{bmatrix} 1 & e^{\frac{i\pi}{3}} \\ -i & 2 + 3i \end{bmatrix}$, $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

3. Si on définit $C = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3}$ par

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, 3 \rrbracket^2, c_{ij} = i + j,$$

$$\text{alors } C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

Exo 1.

Représenter la matrice $D = (d_{ij})_{1 \leq i, j \leq 5}$ définie par, pour tout (i, j) dans $\llbracket 1, 5 \rrbracket^2$, $d_{ij} = \begin{pmatrix} j - 1 \\ i - 1 \end{pmatrix}$.

Définition 2 : *Vecteur ligne, vecteur colonne.*

Les éléments de $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ sont appelés vecteurs (ou matrices) lignes ; ceux de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ sont appelés vecteurs (ou matrices) colonnes.

Remarque.

Des conventions aident à mieux manipuler les matrices

▷ La notation en tableau plutôt qu'en np -uplet.

▷ L'utilisation de coefficients ayant la même lettre que la matrice : on écrira $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n, \\ 1 \leq j \leq p}}$,
 $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n, \\ 1 \leq j \leq p}}$, etc.

▷ La confusion de $\mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{K})$ et \mathbb{K} .

1.2 Addition, multiplication par un scalaire

Définition 3 : *Matrice somme.*

On considère deux matrices A et B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle matrice somme de A et B , qu'on note $A + B$, la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie comme suit :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad (A + B)_{i,j} \stackrel{\text{def.}}{=} (A)_{i,j} + (B)_{i,j}.$$

Représentation.

Si $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1p} + b_{1p} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2p} + b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \cdots & a_{np} + b_{np} \end{bmatrix}$$

Définition 4 : *Produit par un scalaire.*

On considère une matrice A de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$. On appelle matrice produit de A par λ , qu'on note λA ou $A \cdot \lambda$ ou λA ou $A \lambda$, la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie comme suit :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad (\lambda A)_{i,j} \stackrel{\text{def.}}{=} \lambda (A)_{i,j} = (A)_{i,j} \lambda \stackrel{\text{def.}}{=} (A \cdot \lambda)_{i,j}.$$

Représentation.

Si $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$,

$$\lambda \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1p} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \cdots & \lambda a_{np} \end{bmatrix}$$

Définition 5 : *Matrice nulle.*

La matrice nulle de taille (n, p) est la matrice $0_{n,p} \stackrel{\text{def.}}{=} (0)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$

Propriété 1 (Structure d'espace vectoriel).

Le triplet $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur le corps $(\mathbb{K}, +, \times)$:

1. $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe **commutatif** qui admet pour élément neutre $0_{n,p}$;
2. $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathbb{K} \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $(M, \lambda) \mapsto M \cdot \lambda$ est une LCE externe sur $\mathcal{M}_{n,p}$ telle que :
 - a) la LCE \cdot est compatible avec \times :
 - i. $\forall M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad M = M \cdot 1_{\mathbb{K}}$.
 - ii. $\forall M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda_1 \in \mathbb{K}, \forall \lambda_2 \in \mathbb{K}, \quad (M \cdot \lambda_1) \cdot \lambda_2 = M \cdot (\lambda_1 \times \lambda_2)$.
 - b) la LCE \cdot est doublement distributive :
 - iii. $\forall M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda_1 \in \mathbb{K}, \forall \lambda_2 \in \mathbb{K}, \quad M \cdot \lambda_1 + M \cdot \lambda_2 = M \cdot (\lambda_1 + \lambda_2)$.
 - iv. $\forall M_1 \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall M_2 \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad M_1 \cdot \lambda + M_2 \cdot \lambda = (M_1 + M_2) \cdot \lambda$.

Définition 6 : *Symbole de Kronecker.*

On considère $(i, j) \in \mathbb{N}^2$. On définit $\delta_{i,j} \stackrel{\text{def.}}{=} 1_{\{i=j\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

Remarque.

On a noté 1_P la *valeur numérique* d'une proposition P : 1 si P est vraie, 0 si P est fausse. On rappelle que $1_{\neg P} = 1 - 1_P$ et $1_{P \wedge Q} = 1_P 1_Q$.

Exemple 1.2.

$$\delta_{2024,2025} = \cdots, \quad \delta_{2025,2024} = \cdots, \quad \delta_{2025,2025} = \cdots$$

Définition 7 : matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

On considère $a \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $b \in \llbracket 1, p \rrbracket$. On appelle matrice élémentaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ d'indice (a, b) , qu'on note $E_{a,b}$, la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls, sauf le coefficient de la ligne a et de la colonne b qui est égal à 1 :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad (E_{a,b})_{i,j} \stackrel{\text{def.}}{=} 1_{\{(i,j)=(a,b)\}} = \delta_{i,a} \delta_{b,j}.$$

Remarque.

Il faut avoir précisé n et p pour parler de $E_{a,b}$.

Exo 2.

Représenter visuellement les matrices élémentaires pour

$$n = 1 \text{ et } p = 1,$$

$$n = 1 \text{ et } p = 2,$$

$$n = 1 \text{ et } p = 3$$

$$n = 2 \text{ et } p = 1,$$

$$n = 2 \text{ et } p = 2,$$

$$n = 2 \text{ et } p = 3,$$

$$n = 3 \text{ et } p = 1,$$

$$n = 3 \text{ et } p = 2,$$

$$n = 3 \text{ et } p = 3.$$

Propriété 2 (Décomposition canonique).

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors

$$M = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p (M)_{i,j} E_{i,j}$$

Et pour toute famille de scalaires $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n, \\ 1 \leq j \leq p}}$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p \lambda_{i,j} E_{i,j} = M \implies \forall (k, \ell) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \lambda_{k,\ell} = (M)_{k,\ell}$$

Remarque.

C'est que toute matrice se décompose de manière unique comme une combinaison linéaire des matrices élémentaires de la base canonique de même taille. Cette décomposition est dite *canonique* et on parle de *base canonique* de décomposition.

Commentaire : Dans la suite, les matrices élémentaires seront appelées matrices élémentaires de la base canonique ou simplement matrices de la base canonique.

Exo 3.

Décomposer canoniquement la matrice $M = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 0 \\ 8 & 2 & 1 \end{bmatrix}$;

puis la matrice $(1_{\{i=j\}} : 1 \leq i, j \leq n)$

1.3 Produit matriciel

1.3.1 Définitions et propriétés

Définition 8 : *Produit d'un couple de matrices.*

On considère A dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et B dans $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On appelle matrice produit A par B , qu'on note $A \times B$ ou AB , la matrice de $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ définie comme suit :

$$\begin{aligned} \forall (i, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket, \quad (A \times B)_{i,k} &\stackrel{\text{def.}}{=} A_{i,1}B_{1,k} + A_{i,2}B_{2,k} \\ &+ \cdots + A_{i,j}B_{j,k} + \cdots \\ &+ A_{i,p-1}B_{p-1,k} + A_{i,p}B_{p,k} \\ &= \sum_{j=1}^p A_{i,j}B_{j,k}. \end{aligned}$$

Représentation.

Visuellement, on écrit

$$AB = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^p A_{1,j}B_{j,1} & \sum_{j=1}^p A_{1,j}B_{j,2} & \cdots & \sum_{j=1}^p A_{1,j}B_{j,k} & \cdots & \sum_{j=1}^p A_{1,j}B_{j,q} \\ \sum_{j=1}^p A_{2,j}B_{j,1} & \sum_{j=1}^p A_{2,j}B_{j,2} & \cdots & \sum_{j=1}^p A_{2,j}B_{j,k} & \cdots & \sum_{j=1}^p A_{2,j}B_{j,q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \sum_{j=1}^p A_{i,j}B_{j,1} & \sum_{j=1}^p A_{i,j}B_{j,2} & \cdots & \sum_{j=1}^p A_{i,j}B_{j,k} & \cdots & \sum_{j=1}^p A_{i,j}B_{j,q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \sum_{j=1}^p A_{n,j}B_{j,1} & \sum_{j=1}^p A_{n,j}B_{j,2} & \cdots & \sum_{j=1}^p A_{n,j}B_{j,k} & \cdots & \sum_{j=1}^p A_{n,j}B_{j,q} \end{bmatrix}$$

Exo 4.

Soient une matrice ligne L une matrice colonne C à coefficients dans \mathbb{K} .

1. Calculer CL .
2. Calculer LC si L et C sont de même taille.

Remarque.

Le coefficient d'indice (i, k) de AB est égal au produit de la ligne d'indice i de A par la colonne d'indice j de B :

$$(AB)_{i,k} = A_{i,\cdot} \cdot B_{\cdot,k}$$

Ce qui donne l'écriture

$$AB = \begin{bmatrix} A_{1,\cdot}B_{\cdot,1} & A_{1,\cdot}B_{\cdot,2} & \cdots & A_{1,\cdot}B_{\cdot,k} & \cdots & A_{1,\cdot}B_{\cdot,q} \\ A_{2,\cdot}B_{\cdot,1} & A_{2,\cdot}B_{\cdot,2} & \cdots & A_{2,\cdot}B_{\cdot,k} & \cdots & A_{2,\cdot}B_{\cdot,q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{i,\cdot}B_{\cdot,1} & A_{i,\cdot}B_{\cdot,2} & \cdots & A_{i,\cdot}B_{\cdot,k} & \cdots & A_{i,\cdot}B_{\cdot,q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{n,\cdot}B_{\cdot,1} & A_{n,\cdot}B_{\cdot,2} & \cdots & A_{n,\cdot}B_{\cdot,k} & \cdots & A_{n,\cdot}B_{\cdot,q} \end{bmatrix}$$

On a aussi la relation suivante, en multipliant chaque colonne de gauche par la ligne de droite

de même rang :

$$AB = A_{.,1}B_{1.} + A_{.,2}B_{2.} + \cdots + A_{.,p}B_{p.}$$

Définition 9 : *Matrice identité.*

On appelle matrice identité d'ordre n , qu'on note I_n la matrice de carrée $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie comme suit :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad (I_n)_{i,j} \stackrel{\text{def.}}{=} \delta_{i,j} = 1_{\{i=j\}} .$$

Représentation.

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & (0) & & \\ & \ddots & & & \\ (0) & & & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & & 1 \end{bmatrix}$$

Exo 5.

1. Soient $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Calculer $\sum_{j=i}^n \delta_{k,j} x_j$ et $\sum_{i=1}^n x_i \delta_{i,k}$.

2. Soit $(i, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. Calculer $\sum_{i=1}^n \delta_{i,j} \delta_{j,k}$

Remarque.

A priori on ne peut pas commuter un produit de matrices : les formats ne sont même pas compatibles !

Et même lorsque les formats sont les mêmes ! Contre-exemple avec $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Exo 6 *Deux applications importantes du produit matriciel.*

1. Soit $x, y, z \in \mathbb{K}$. Le système d'égalité suivant

$$\begin{cases} x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - z = 0 \\ 4x + 5y - 2z = -3 \end{cases}$$

peut s'écrire matriciellement $AX = b$ où ...

2. Suites récurrentes linéaires. Soit u une suite complexe telle que pour tout n dans \mathbb{N} , $u_{n+2} +$

$2u_{n+1} - u_n = 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $U_n = \begin{bmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{bmatrix}$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$U_{n+1} = AU_n \quad \text{où} \quad A = \dots$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$U_{n+1} = A^n U_0$$

Propriété 3 (Multiplication).

1. (associativité) Pour toutes matrices A de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, B de $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et C de $\mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$,
 $A(BC) = (AB)C$.
2. (distributivité) Pour toutes matrices A et B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, C et D de $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$,
 $A(C + D) = AC + AD$ et $(A + B)C = AC + BC$
3. (comportement avec les scalaires) Pour toutes matrices A de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, B de
 $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et pour tous scalaires λ de \mathbb{K} et μ de \mathbb{K} , $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$.
4. (élément neutre) $I_n A = A$ et $A I_p = A$.

► Démonstration.

Déjà, chaque produit est bien défini : $AB \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$, donc $(AB)C \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$. De même, $BC \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ donc $A(BC) \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, r \rrbracket$. Alors

$$\begin{aligned}
 [(AB)C]_{ij} &= \sum_{k=1}^q [AB]_{ik} [C]_{kj} \\
 &= \sum_{k=1}^q \sum_{\ell=1}^p [A]_{i\ell} [B]_{\ell k} [C]_{kj} \\
 &= \sum_{\ell=1}^p \sum_{k=1}^q [A]_{i\ell} [B]_{\ell k} [C]_{kj} \\
 &= \sum_{\ell=1}^p [A]_{i\ell} \sum_{k=1}^q [B]_{\ell k} [C]_{kj} \\
 &= \sum_{\ell=1}^p [A]_{i\ell} [BC]_{\ell j} \\
 &= [A(BC)]_{ij},
 \end{aligned}$$

d'où l'égalité des coefficients, donc des matrices.

QED ◀

1.3.2 Produit et matrices élémentaires de la base canonique

Propriété 4 (Produit de matrices élémentaires de la base canonique).

On note, pour cette proposition $E_{a,b}^{(n,p)}$ la matrice élémentaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ d'indice (a, b) . Alors

$$E_{a,b}^{(n,p)} \times E_{c,d}^{(p,q)} = \delta_{bc} E_{a,d}^{(n,q)}.$$

► **Démonstration.**

On écrit $E_{a,b}^{(n,p)} = (\delta_{ia} \delta_{jb})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $E_{c,d}^{(p,q)} = (\delta_{ic} \delta_{jd})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$, d'où, si $E_{a,b}^{(n,p)} \times E_{c,d}^{(p,q)} = (m_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$,

on a

$$\begin{aligned} m_{ij} &= \sum_{k=1}^n \delta_{ia} \delta_{kb} \delta_{kc} \delta_{jd} \\ &= \delta_{ia} \delta_{jd} \sum_{k=1}^n \delta_{kb} \delta_{kc} \\ &= \delta_{ia} \delta_{jd} \delta_{bc} \end{aligned}$$

Donc

$$(m_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \delta_{bc} (\delta_{ia} \delta_{jd})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}},$$

i.e.

$$E_{a,b}^{(n,p)} \times E_{c,d}^{(p,q)} = \delta_{bc} E_{a,d}^{(n,q)}.$$

QED ◀

Exo 7 VECTEURS LIGNES/COLONNES ÉLÉMENTAIRES.

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, on pose

$$\hat{e}_i^{(n)} \stackrel{\text{def.}}{=} E_{i,1}^{(n,1)} \quad \text{et} \quad \hat{e}_j^{(p)} \stackrel{\text{def.}}{=} E_{1,j}^{(1,p)}.$$

Calculer $\hat{e}_i^{(n)} \hat{e}_j^{(p)}$ pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$. Calculer $\hat{e}_i^{(n)} \hat{e}_{i'}^{(n)}$ pour $(i, i') \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.

Propriété 5 (Multiplication par une matrice élémentaire).

Soit une matrice A de taille (p, q) .

1. Multiplier par la droite la matrice A par $E_{i,j}^{(q,r)}$ revient à ajouter à colonne j de $0_{p,r}$ la colonne i de A .
2. Multiplier par la gauche par une matrice par $E_{i,j}^{(n,p)}$ revient à ajouter à ligne i de $0_{n,q}$ la ligne j de A .

Propriété 6 (Égalité de deux matrices et produit).

Soient deux matrices A, B de taille $\mathbb{K}^{n \times p}$. Ainsi, les propositions suivantes sont équi-

valentes :

1. $\forall \hat{X} \in \mathbb{K}^{1 \times n}, \forall \vec{X} \in \mathbb{K}^{p \times 1}, \hat{X}A\vec{X} = \hat{X}B\vec{X}.$
2. $\forall \vec{X} \in \mathbb{K}^{p \times 1}, A\vec{X} = B\vec{X}.$
3. $\forall \hat{X} \in \mathbb{K}^{1 \times n}, \hat{X}A = \hat{X}B.$
4. $A = B.$

Remarque.

Pour tout $\hat{X} \in \mathbb{K}^{1 \times n}$ et pour tout $\vec{X} \in \mathbb{K}^{p \times 1}$, $\hat{X}A$ est une combinaison linéaire des lignes de A , $A\vec{X}$ est une combinaison linéaire des colonnes de A , et $\hat{X}A\vec{X}$ est un élément de $\mathbb{K}^{1 \times 1}$, confondu avec un scalaire du corps \mathbb{K} .

1.3.3 Produit par blocs

Propriété 7 (Lignes et colonnes d'un produit).

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

1. Si $A_{1,\cdot}, A_{2,\cdot}, \dots, A_{n,\cdot}$ désignent les lignes de A , alors

$$A \times B = \begin{bmatrix} A_{1,\cdot} \\ \vdots \\ A_{n,\cdot} \end{bmatrix} \times B = \begin{bmatrix} A_{1,\cdot} \times B \\ A_{2,\cdot} \times B \\ \vdots \\ A_{n,\cdot} \times B \end{bmatrix}$$

2. Si $B_{\cdot,1}, B_{\cdot,2}, \dots, B_{\cdot,q}$ les colonnes de B , alors

$$A \times B = A \times \begin{bmatrix} B_{\cdot,1} & B_{\cdot,2} & \cdots & B_{\cdot,q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB_{\cdot,1} & AB_{\cdot,2} & \cdots & AB_{\cdot,q} \end{bmatrix}.$$

Commentaire : Plus généralement, on a les propriétés ci-après, qu'il faut savoir mettre en oeuvre, en faisant un produit de deux matrices 3×3 par exemple !

Propriété 8 (Produit par blocs, coupe à gauche horizontale).

Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, avec

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix},$$

où $A_1 \in \mathcal{M}_{n_1,p}(\mathbb{K})$, $A_2 \in \mathcal{M}_{n_2,p}(\mathbb{K})$, alors

$$AB = \begin{bmatrix} A_1B \\ A_2B \end{bmatrix}.$$

Propriété 9 (Produit par blocs, coupe à droite verticale).

Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, avec

$$B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix},$$

où $B_1 \in \mathcal{M}_{p,q_1}(\mathbb{K})$, $B_2 \in \mathcal{M}_{p,q_2}(\mathbb{K})$, alors

$$AB = \begin{bmatrix} AB_1 & AB_2 \end{bmatrix}.$$

Propriété 10 (Produit par blocs, coupe verticale – horizontale).

Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, avec

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A'_1 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B'_1 \end{bmatrix},$$

où $A'_1 \in \mathcal{M}_{n,p_1}(\mathbb{K})$, $A_1 \in \mathcal{M}_{n,p'_1}(\mathbb{K})$, $B_1 \in \mathcal{M}_{p_1,q}(\mathbb{K})$, $B'_1 \in \mathcal{M}_{p'_1,q}(\mathbb{K})$, alors

$$AB = \begin{bmatrix} A_1B_1 + A'_1B'_1 \end{bmatrix}.$$

Propriété 11 (Produit par blocs, coupe horizontale – verticale).

Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, avec

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix},$$

où $A_1 \in \mathcal{M}_{n_1,p}(\mathbb{K})$, $A_2 \in \mathcal{M}_{n_2,p}(\mathbb{K})$; et où $B_1 \in \mathcal{M}_{p,q_1}(\mathbb{K})$, $B_2 \in \mathcal{M}_{p,q_2}(\mathbb{K})$,

$$AB = \begin{bmatrix} A_1B_1 & A_1B_2 \\ A_2B_1 & A_2B_2 \end{bmatrix}.$$

Propriété 12 (Produit par blocs, découpe).

Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, avec

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A'_1 \\ A_2 & A'_2 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B'_1 & B'_2 \end{bmatrix},$$

où $A_1 \in \mathcal{M}_{n_1,p_1}(\mathbb{K})$, $A_2 \in \mathcal{M}_{n_2,p_1}(\mathbb{K})$, $A'_1 \in \mathcal{M}_{n_1,p'_1}(\mathbb{K})$ et $A'_2 \in \mathcal{M}_{n_2,p'_1}(\mathbb{K})$; et où

$B_1 \in \mathcal{M}_{p_1,q_1}(\mathbb{K})$, $B_2 \in \mathcal{M}_{p_1,q_2}(\mathbb{K})$, $B'_1 \in \mathcal{M}_{p'_1,q_1}(\mathbb{K})$, et $B'_2 \in \mathcal{M}_{p'_1,q_2}(\mathbb{K})$; alors

$$AB = \begin{bmatrix} A_1B_1 + A'_1B'_1 & A_1B_2 + A'_1B'_2 \\ A_2B_1 + A'_2B'_1 & A_2B_2 + A'_2B'_2 \end{bmatrix}.$$

Remarque.

$$\begin{bmatrix} A_1B_1 + A'_1B'_1 & A_1B_2 + A'_1B'_2 \\ A_2B_1 + A'_2B'_1 & A_2B_2 + A'_2B'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1B_1 & A_1B_2 \\ A_2B_1 & A_2B_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A'_1B'_1 & A'_1B'_2 \\ A'_2B'_1 & A'_2B'_2 \end{bmatrix}.$$

Exo 8.

Soient $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{K}^{n \times p}$, $C \in \mathbb{K}^{p \times n}$ et $D \in \mathbb{K}^{p \times p}$.

Calculer

$$\begin{bmatrix} I_n & 0_{n,p} \\ 0_{p,n} & D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_n & B \\ 0_{p,n} & I_p \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & 0_{n,p} \\ 0_{p,n} & I_p \end{bmatrix}.$$

Et factoriser

$$\begin{bmatrix} A & 0_{n,p} \\ C & D \end{bmatrix}.$$

1.4 Transposition

Définition 10 : *Matrice transposée.*

On considère A dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle transposée de A , qu'on note A^T ou tA , la matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ définie comme suit :

$$\forall (k, \ell) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (A^T)_{k,\ell} \stackrel{\text{def.}}{=} A_{\ell,k}.$$

Exemple 1.3.

$$\text{Si } X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ et } X' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}, \text{ alors } X^T \times X' = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = xx' + yy' + zz'. \text{ On reconnaît}$$

alors le « produit scalaire des deux vecteurs X et X' ».

Exo 9.

Soient $A \in \mathbb{K}^{3 \times 2}$ et $B \in \mathbb{K}^{2 \times 3}$. Soient $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{K}$.

1. Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$, alors $A^T = \dots$
2. Si $B = \begin{bmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{bmatrix}$, alors $B^T = \dots$

Exo 10.

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on pose $P_\sigma \stackrel{\text{def.}}{=} (1_{\{i=\sigma(j)\}} : 1 \leq i, j \leq n)$. Exprimer P_σ^T .

Propriété 13 (Composition, combinaison linéaire et produit).

Soient A et A' deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, B dans $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Alors

(i) $(A^T)^T = A$

(ii) $(\lambda A + \mu A')^T = \lambda A^T + \mu A'^T$.

(iii) $(AB)^T = B^T A^T$.

► **Démonstration.**

3. Calculons le coefficient (i, j) de chaque matrice. Déjà les formats coïncident : $(AB)^T$ et $B^T A^T$ sont toutes deux dans $\mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})$. Soit $(i, j) \in \llbracket 1, q \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors

$$\begin{aligned} [(AB)^T]_{i,j} &= [AB]_{j,i} \\ &= \sum_{k=1}^p [A]_{j,k} [B]_{k,i} \\ &= \sum_{k=1}^p [A^T]_{k,j} [B^T]_{i,k} \\ &= \sum_{k=1}^p [B^T]_{i,k} [A^T]_{k,j} \\ &= [B^T A^T]_{i,j}, \end{aligned}$$

d'où l'égalité des deux matrices.

QED ◀

1.5 Opérations élémentaires

Définition 11 : *Opération élémentaire sur les lignes.*

On appelle opération élémentaire sur les lignes d'une matrice à n lignes l'une des opérations décrites symboliquement par :

1. $L_{i'} \leftrightarrow L_i$, pour $(i', i) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, avec $i' \neq i$; opérations appelées *échanges ou permutations* (élémentaires sur les lignes).
2. $L_{i'} \leftarrow L_{i'} + \lambda L_i$, pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $(i', i) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, avec $i' \neq i$; opérations appelées *transvections* (élémentaires sur les lignes).
3. $L_i \leftarrow \mu L_i$, pour $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ et $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$; opérations appelées *dilatations* (élémentaires sur les lignes).

Définition 12 : *Opération élémentaire sur les colonnes.*

On appelle opération élémentaire sur les colonnes d'une matrice à p colonnes l'une des opérations décrites symboliquement par :

1. $C_{j'} \leftrightarrow C_j$, pour $(j, j') \in \llbracket 1, p \rrbracket^2$, avec $j \neq j'$; opérations appelées *échanges ou permutations* (élémentaires sur les colonnes).
2. $C_{j'} \leftarrow C_{j'} + C_j \lambda$, pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $(j, j') \in \llbracket 1, p \rrbracket^2$, avec $j \neq j'$; opérations appelées *transvections* (élémentaires sur les colonnes).
3. $C_j \leftarrow C_j \mu$, pour $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ et $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$; opérations appelées *dilatations* (élémentaires sur les colonnes).

Définition 13 : *Matrice d'opération élémentaire.*

On appelle matrice d'opération élémentaire d'ordre q l'une des matrices :

1. $P_{k,\ell} = I_q - E_{k,k} - E_{\ell,\ell} + E_{k,\ell} + E_{\ell,k}$, pour $(k, \ell) \in \llbracket 1, q \rrbracket^2$, avec $k \neq \ell$; appelées

puis

$$D_k(\mu) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \mu & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

le μ est à la position (k, k)

Exo 11.

Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Écrire les matrices $T_{1,2}(5)$, $D_3(-2)$ et $P_{1,3}$ et effectuer rapidement les produits

- a) $T_{1,2}(5)A$ b) $D_3(-2)A$ c) $P_{1,3}A$ d) $AT_{1,2}(5)$ e) $AD_3(-2)$ f) $AP_{1,3}$

Commentaire : Les deux propriétés suivantes disent qu’effectuer une opération élémentaire sur les lignes (resp. sur les colonnes) est comme multiplier par la gauche (resp. par la droite) par une certaine matrice carrée. Laquelle ? La matrice obtenue en effectuant l’opération sur la matrice identité du bon ordre.

Propriété 14 (Opération élémentaire sur les lignes et produit).

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; $(i', i) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $i' \neq i$; $\lambda \in \mathbb{K}$; et $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Si $P_{i',i}$, $T_{i',i}(\lambda)$ et $D_i(\mu)$ sont respectivement trois matrices de permutation, de transvection et de dilatation **d’ordre n** comme définie ci-haut, alors

1. La matrice $P_{i',i} \times A$ est obtenue à partir de A en effectuant $L_{i'} \leftrightarrow L_i$.
2. La matrice $T_{i',i}(\lambda) \times A$ est obtenue à partir de A en effectuant $L_{i'} \leftarrow L_{i'} + \lambda L_i$.
3. La matrice $D_i(\mu) \times A$ est obtenue à partir de A en effectuant $L_i \leftarrow \mu L_i$.

Ce système d'égalités entre scalaires peut s'écrire matriciellement :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Commentaire : Cela motive la définition suivante.

Définition 14 : *Système linéaire matriciel.*

Un *système linéaire matriciel* à n équations et p inconnues est la donnée d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et d'un vecteur-colonne $b \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Une **solution** du système est un vecteur-colonne $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = b$.

Le vecteur-colonne b est le **second membre** du système. Si $b = 0$, on dit que le système est homogène.

Exo 12.

Soit le système linéaire

$$\begin{cases} x + 2y - z + t = 4 \\ 3x - 8y = 2 \\ 2t = -1 \end{cases}$$

Écrire ce système sous la forme $AX = b$.

2.2 Structure de l'ensemble des solutions

Soit $A \in \mathbb{K}^{n \times p}$, $b \in \mathbb{K}^{n \times 1}$. On considère le système linéaire $AX = b$ d'inconnue $X \in \mathbb{K}^{p \times 1}$.

Définition 15 : *Système linéaire compatible.*

On dit que le système linéaire $AX = b$ est compatible si, et seulement si, le vecteur colonne b est une combinaison linéaire des colonnes de A .

Propriété 17 (Système complet et système homogène).

Si le système linéaire $AX = b$ est compatible alors l'ensemble de ses solutions est

$$\{X_0 + X_h : X_h \in \mathbb{K}^{p \times 1}, AX_h = 0\}.$$

où $X_0 \in \mathbb{K}^{p \times 1}$ en est une solution particulière : $AX_0 = b$.

« Les solutions du système complet »

=

« UNE solution particulière » + « les solutions du système homogène »

Remarque.

Interprétation géométrique des équations de droites, de plans, et des recherches d'intersection.

2.3 Opérations élémentaires et méthode du pivot

Propriété 18 (Préservation des solutions).

Dans un système linéaire, faire des opérations élémentaires **sur les lignes** ne change pas l'ensemble de solutions.

► **Démonstration.**

Soit $AX = b$ un système linéaire d'inconnue X . Si on fait une série d'opérations élémentaires sur le système linéaire, cela signifie que l'on dispose de B_1, \dots, B_p p matrices d'opérations élémentaires telles que le système soit transformé en $(B_p \dots B_1)AX = (B_p \dots B_1)b$. Or, ces matrices étant toutes inversibles, on a leur produit $B_p \dots B_1$ qui est inversible, donc $(B_p \dots B_1)AX = (B_p \dots B_1)b \Leftrightarrow AX = b$. **QED** ◀

Définition 16 : *Matrice échelonnée en lignes/colonnes.*

On considère $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. Soient L_1, \dots, L_n les n lignes de A . On dit que A est échelonnée en lignes

si, et seulement si, il existe $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(i) \quad (i \leq r \Rightarrow L_i \neq 0_{1,p}) \wedge (i > r \Rightarrow L_i = 0_{1,p}),$$

$$(ii) \quad i < r \implies \text{val}(L_i) < \text{val}(L_{i+1}),$$

où $\text{val}(L_i)$ est l'indice du premier coefficient non nul de L_i , pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

2. Soient C_1, \dots, C_p les p colonnes de A . On dit que A est échelonnée en colonnes

si, et seulement si, il existe $r \in \llbracket 1, p \rrbracket$ tel que pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$,

$$(i) \quad (j \leq r \Rightarrow C_j \neq 0_{n,1}) \wedge (j > r \Rightarrow C_j = 0_{n,1}).$$

$$(ii) \quad j < r \implies \text{val}(C_j) < \text{val}(C_{j+1}).$$

où $\text{val}(C_j)$ est l'indice du premier coefficient non nul de C_j , pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

Définition 17 : *Système linéaire échelonné en lignes/en colonnes.*

On dit qu'un système linéaire est échelonné en lignes (resp. en colonnes) si, et seulement si, sa matrice est échelonnée en lignes (resp. en colonnes).

On dit absolument qu'un système linéaire est échelonné pour dire qu'il est échelonné en lignes.

Propriété 19 (Echelonnement par opérations élémentaires).

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Par des opérations élémentaires sur les lignes (resp. sur les colonnes), on peut transformer A en une matrice échelonnée en lignes (resp. en colonnes) :

Il existe une matrice B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$), *produit de matrices d'opérations élémentaires*, telle que BA (resp. AB) est échelonnée en lignes (resp. en colonnes).

Commentaire : C'est le résultat central de ce chapitre.

Méthode 1 [Méthode du pivot, Gauss].

Voici une procédure pour échelonner en lignes (resp. en colonnes) une matrice donnée suivant la méthode du pivot de Gauss :

TANT QUE la table matrice est non vide, REPETER :

- ▷ SI la première colonne (resp. la première ligne) est nulle, considérer la sous-matrice obtenue en supprimant la première colonne (resp. la première ligne) ;
- ▷ SINON,
 - par un échange et/ou des transvections sur les lignes (resp. sur les colonnes), transformer la matrice en une matrice dont les coefficients de la première colonne (resp. la première ligne) sont nuls à l'exception du premier ;
 - considérer la sous-matrice obtenue en supprimant et la première colonne et la première ligne.
- ▷ FIN SI.

FIN TANT QUE.

Cela donne une méthode pour résoudre un système linéaire : on échelonne sa matrice à l'aide du pivot de Gauss, et on répercute les opérations sur le second membre.

Remarque.

Echelonner une matrice en lignes (resp. en colonnes) revient à échelonner sa transposée en colonnes (resp. en lignes).

► **Démonstration.** *Non exigible.*

On démontre ce résultat par récurrence. Plus précisément, on montre que pour tout k

dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, il existe B_k , produit de matrices d'opérations élémentaires, tel que $B_k A$ est une matrice dont les k premières colonnes forment une matrice échelonnée.

Initialisation. On considère la première colonne de A . Ou bien elle est nulle et alors $B_1 = I_n$ convient (la première colonne de A constitue une matrice échelonnée). Sinon, alors A possède une ligne i_0 telle que $a_{i_0,1} \neq 0$. On multiplie alors A par P_{1,i_0} . On obtient donc une matrice dont le premier coefficient est non nul. Ensuite, on multiplie la matrice $P_{1,i_0} A$ par $D_1 \left(\frac{1}{a_{i_0,1}} \right)$. Ceci permet de transformer la matrice en une matrice dont le premier coefficient est égal à 1. On note $D_1 \left(\frac{1}{a_{i_0,1}} \right) P_{1,i_0} A = A'$, de coefficients (a'_{ij}) . On effectue alors sur A' , pour tout i dans $\llbracket 2, n \rrbracket$, les opérations $L_i \leftarrow L_i - a'_{i1} L_1$. Cela permet

de transformer la première colonne de A en $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$.

En posant B_1 comme le produit de toutes les matrices de transvection correspondantes, de $D_1 \left(\frac{1}{a_{i_0,1}} \right)$ et de P_{1,i_0} , on a donc le résultat.

Hérédité. On suppose que l'on dispose, pour un certain k dans $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$, de B_k produit de matrices d'opérations élémentaires tel que les k premières colonnes de $B_k A$ constituent une matrice échelonnée. Notons $M = B_k A$, $M = (m_{ij})$.

On considère alors la colonne $k+1$:

▷ ou bien tous les coefficients $m_{k+1,k+1}, m_{k+2,k+1}, \dots, m_{n,k+1}$ sont nuls, et alors la matrice

$B_k A$ est déjà échelonnée.

▷ ou bien ça n'est pas le cas. On prend alors k_0 tel que $k_0 \geq k+1$ et $m_{k_0,k+1} \neq 0$, et on effectue les opérations suivantes

- $L_{k+1} \leftrightarrow L_{k_0}$,
- $L_{k_0} \leftarrow L_{k_0}/m_{k_0,k+1}$,

i.e. on multiplie $B_k A$ par $D_{k+1} \left(\frac{1}{a_{k_0,k+1}} \right) P_{k+1,k_0}$, afin d'obtenir une matrice M' de coefficients $(m'_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$, dont le coefficient $(k+1, k+1)$ est égal à 1. On effectue enfin les opérations suivantes : pour tout i dans $[[k+2, n]]$, on fait $L_i \leftarrow L_i - m'_{i,k+1} L_{k+1}$. Cela permet de supprimer tous les coefficients de la colonne $k+1$, et d'avoir une matrice dont les $k+1$ premières colonnes forment une matrice échelonnée.

En posant B_{k+1} le produit de toutes ces matrices de transvection, de $D_{k+1} \left(\frac{1}{a_{k_0,k+1}} \right)$, de P_{k+1,k_0} et de B_k , on a le résultat !

Conclusion. D'où l'hérédité et le résultat, en particulier au rang n : on dispose d'une matrice B_n , **inversible**, telle que $B_n A$ est échelonnée. **QED** ◀

Propriété 20 (Matrice non carrée).

Soit $A \in \mathbb{K}^{n \times p}$.

1. Si $p > n$ alors on peut trouver un vecteur colonne $\vec{X} \in \mathbb{K}^{p \times 1}$ tel que

$$A\vec{X} = \vec{0}_n \quad \text{ET} \quad \vec{X} \neq \vec{0}_p .$$

C'est que l'équation $A\vec{X} = \vec{0}_n$, d'inconnue $\vec{X} \in \mathbb{K}^{p \times 1}$, admet au moins une solution non nulle.

2. Si $n > p$ alors on peut trouver un vecteur ligne $\hat{Y} \in \mathbb{K}^{1 \times n}$ tel que

$$\hat{Y} \neq \hat{0}_n \quad \text{ET} \quad \hat{Y}A = \hat{0}_p .$$

C'est que l'équation $\hat{Y}A = \hat{0}_p$, d'inconnue $\hat{Y} \in \mathbb{K}^{1 \times n}$, admet au moins une solution non nulle.

► **Démonstration.** *Non exigible.*

1. On échelonne en colonnes.
2. On échelonne en lignes ou on applique ce qui précède à la transposée.

QED ◀**Exo 13.**

Soit $A \in \mathbb{K}^{n \times p}$. Donner une condition nécessaire portant sur la taille de A pour que la fonction $\mathbb{K}^{p \times 1} \rightarrow \mathbb{K}^{n \times 1}$, $\vec{X} \mapsto A\vec{X}$ soit injective/surjective/bijective.

Propriété 21 (Système linéaire non carré).

Soit un système linéaire de taille (n, p) .

1. Si $p > n$ alors le système admet plus d'une solution.
2. Si $n > p$ alors on peut changer le second membre en sorte que le système soit incompatible.

Propriété 22 (Forme d'une matrice carrée échelonnée).

Soit T une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Si T est échelonnée en lignes, alors T est triangulaire supérieure.
2. Si T est échelonnée en colonnes, alors T est triangulaire inférieure.

► **Démonstration.**

Par récurrence, on montre que pour tout k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, \mathcal{P}_k : les $k - 1$ premiers termes de la ligne L_k sont nuls.

QED ◀

Commentaire : Les notions ci-après seront notamment utiles pour décrire simplement la transformation d'une matrice par un enchaînement d'opérations élémentaires.

Définition 18 : *Équivalence en lignes/en colonnes.*

On considère deux matrices M et M' de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. On dit que M est équivalente en lignes à M' , et on note $M \underset{\text{L}}{\sim} M'$ pour dire qu'il existe $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ tel que $M' = Q \times M$.
2. On dit que M est équivalente en colonnes à M' , et on note $M \underset{\text{C}}{\sim} M'$ pour dire qu'il existe $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tel que $M \times P = M'$.

Propriété 23 (Deux relations d'équivalence).

Sur l'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'équivalence en lignes et l'équivalence en colonnes sont deux relations d'équivalence.

Définition 19 : *Équivalence.*

On considère deux matrices M et M' de $\mathbb{K}^{n \times p}$. On dit que M est équivalente à M' , et on note $M \sim M'$ pour dire qu'il existe $(Q, P) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tel que $M \times P = Q \times M'$.

3 Matrices carrées

3.1 Formes particulières de matrices carrées

Cadre de travail.

Dans cette section on désigne par M un élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exo 14.

En termes de cardinalité et d'opérations, quelles sont les qualités de la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{K} &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ ?} \\ \lambda &\longmapsto \lambda I_n \end{aligned}$$

Définition 20 : *Matrice scalaire.*

On dit que M est scalaire si, et seulement si, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ telle que $M = \lambda I_n$.

Exo 15.

Montrer que les PSSE :

- (i) La matrice M est scalaire.
- (ii) La matrice M commute avec toute matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$.
- (iii) Pour tout $\vec{X} \in \mathbb{K}^{n \times 1}$, $M\vec{X} \in \mathbb{K} \cdot \vec{X}$.
- (iv) La matrice M^T est scalaire.

Définition 21 : *Matrice diagonale.*

On dit que M est diagonale si, et seulement si,

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i \neq j \Rightarrow (M)_{i,j} = 0$$

Notation.

On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales d'ordre n à coefficients dans \mathbb{K} .

Notation.

Pour tous $d_1, d_2, \dots, d_n \in \mathbb{K}$, la matrice diagonale de diagonale (d_1, d_2, \dots, d_n) est notée

$$\text{Diag}(d_1, d_2, \dots, d_n).$$

Représentation.

Pour tous $d_1, d_2, \dots, d_n \in \mathbb{K}$, on écrit

$$\begin{bmatrix} d_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & d_n \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & & d_n \end{bmatrix}$$

Propriété 24 (Caractérisation des matrices diagonales).

On a l'équivalence :

$$M \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K}) \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad M\vec{e}_k \in \mathbb{K}\vec{e}_k.$$

On a noté, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, \vec{e}_k la matrice élémentaire de $\mathbb{K}^{n \times 1}$ d'indice $(k, 1)$.

Exo 16.

Écrire la décomposition canonique de toute matrice diagonale.

Exo 17.

Par la donnée de combien de coefficients une matrice diagonale est-elle déterminée ?

Exo 18.

Soit D une matrice diagonale à coefficient diagonaux deux à deux distincts. Décrire les matrices qui commute avec D .

Définition 22 : *Matrice triangulaire.*

On dit que M est

1. triangulaire supérieure si, et seulement si,

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i > j \Rightarrow (M)_{i,j} = 0.$$

2. triangulaire inférieure si, et seulement si,

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad j > i \Rightarrow (M)_{i,j} = 0.$$

Notation.

On note respectivement $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ et $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures et l'ensemble des matrices triangulaires inférieures d'ordre n à coefficients dans \mathbb{K} .

Exemple 3.1.

La matrice $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ est triangulaire supérieure et la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 9 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ est triangulaire inférieure.

Propriété 25 (Caractérisation des matrices triangulaires).

On a les deux équivalences :

$$M \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad M\vec{e}_k \in (\mathbb{K}\vec{e}_k + \cdots + \mathbb{K}\vec{e}_1).$$

$$M \in \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K}) \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad M\vec{e}_k \in (\mathbb{K}\vec{e}_k + \cdots + \mathbb{K}\vec{e}_n).$$

On a noté, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, \vec{e}_k la matrice élémentaire de $\mathbb{K}^{n \times 1}$ d'indice $(k, 1)$.

Exo 19.

Exprimer de telles caractérisations avec les matrices élémentaires de $\mathbb{K}^{1 \times n}$, transposées des matrices élémentaires de $\mathbb{K}^{n \times 1}$.

Exo 20.

Ecrire la décomposition canonique de toute matrice triangulaire.

Exo 21.

Par la donnée de combien de coefficients une matrice triangulaire est-elle déterminée ?

Remarque.

La transposition réalise une bijection de $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$ et $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) \cap \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K}) = \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$.

Définition 23 : *Matrice symétrique, antisymétrique.*

On dit que M est

1. symétrique si, et seulement si, $M^T = M$:

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad M_{j,i} = M_{i,j}.$$

2. antisymétrique si, et seulement si, $A^T = -A$:

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad M_{j,i} = -M_{i,j}.$$

Notation.

On note respectivement $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n à coefficients dans \mathbb{K} .

Exemple 3.2.

Toute matrice diagonale est symétrique.

Remarque.

Toute matrice antisymétrique a nécessairement ses coefficients diagonaux nuls.

Exo 22.

Ecrire la décomposition canonique de toute matrice symétrique (resp. antisymétrique).

Exo 23.

Par la donnée de combien de coefficients une matrice symétrique (resp. antisymétrique) est-elle déterminée ?

Propriété 26 (Partie symétrique et partie antisymétrique).

il existe un unique couple (S, A) dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ tel que $M = S + A$.

► **Démonstration.**

On va raisonner par analyse-synthèse.

Analyse. Soit (S, A) dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ tel que $M = S + A$. Alors

$$\begin{cases} M = S + A \\ M^T = S^T + A^T = S - A \end{cases}$$

Ainsi, en sommant et en soustrayant les deux lignes, $S = \frac{1}{2}(M + M^T)$ et $A = \frac{1}{2}(M - M^T)$.

D'où l'unicité.

Synthèse. Posons $S = \frac{1}{2}(M + M^T)$ et $A = \frac{1}{2}(M - M^T)$. Alors

$$\triangleright S^T = \frac{1}{2}(M^T + (M^T)^T) = \frac{1}{2}(M^T + M) = S, \text{ donc } S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K}),$$

$$\triangleright A^T = \frac{1}{2}(M^T - (M^T)^T) = \frac{1}{2}(M^T - M) = -A, \text{ donc } A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K}),$$

$$\triangleright S + A = \frac{1}{2}(M + M^T) + \frac{1}{2}(M - M^T) = M,$$

d'où l'existence!

QED ◀

Exo 24.

Effectuer la décomposition « symétrique + antisymétrique » de $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -4 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$.

3.2 Structure d'anneau non commutatif

Propriété 27.

L'ensemble $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau **non commutatif**, de neutre pour $+$ 0_n et

de neutre pour \times I_n . On notera alors $A^k = I_n \times \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{k \text{ fois}}$ pour $k \in \mathbb{N}$.

Remarque.

Attention! $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ possède des diviseurs de 0 : $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Définition 24 : *Matrice nilpotente.*

On dit que M est nilpotente s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^k = 0_n$.

Exo 25.

Parmi les matrices élémentaires de la base canonique, lesquelles sont nilpotentes ?

Exo 26.

Montrer que toute matrice triangulaire à diagonale nulle est nilpotente.

Comme dans tout anneau, on a les formules ci-après.

Propriété 28 (Différence de puissances d'un même ordre, formule de Bernoulli).

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $AB = BA$, alors pour tout $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$,

$$A^k - B^k = (A - B) \left(\sum_{\ell=0}^{k-1} A^{k-1-\ell} B^\ell \right).$$

Exo 27.

Montrer que si on ajoute à I_n ou si on soustrait de I_n une matrice nilpotente alors on obtient encore une matrice inversible.

Propriété 29 (Puissance d'une somme, formule du binôme de Newton).

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $AB = BA$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$(A + B)^k = \sum_{\ell=0}^k \binom{k}{\ell} A^{k-\ell} B^\ell.$$

Remarque.

Remarque importante : la distributivité de \times permet de factoriser une somme de matrices. Ainsi,

$$A^2 + A \times B + 2A = A \times (A + B + 2I_n)$$

Attention ! On ne peut pas faire n'importe quoi ! Ainsi,

$$AB + BA$$

n'est pas factorisable par A .

Exo 28.

Montrer que la somme de deux matrices nilpotentes qui commutent est une matrice nilpotente.

Exo 29.

Calculer les puissances successives des matrices suivantes :

$$J_n = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \text{ où } n \in \mathbb{N}^*, \text{ et } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Propriété 30 (Sous-anneaux).

$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$, $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$ et $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ sont des sous-anneaux de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

De plus, si $(A, B) \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})^2$, $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})^2$ ou $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})^2$, alors les coefficients diagonaux de AB sont obtenus en faisant le produit des coefficients diagonaux de A et de B .

► **Démonstration.**

On ne fait la démonstration que pour $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$. Soient A et B dans $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$. Notons $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $AB = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. Alors

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

▷ si $i > j$, alors

- $\forall k \in \llbracket 1, i-1 \rrbracket$, $k < i$, donc $a_{ik} = 0$, donc $\sum_{k=1}^{i-1} a_{ik} b_{kj} = 0$,
- $\forall k \in \llbracket i, n \rrbracket$, $k > j$ donc $b_{kj} = 0$, donc $\sum_{k=i}^n a_{ik} b_{kj} = 0$.

Donc $c_{ij} = 0$.

▷ si $i = j$, alors

- $\forall k \in \llbracket 1, i-1 \rrbracket$, $k < i$, donc $a_{ik} = 0$, donc $\sum_{k=1}^{i-1} a_{ik}b_{ki} = 0$,
- $\forall k \in \llbracket i+1, n \rrbracket$, $k > i$ donc $b_{kj} = 0$, donc $\sum_{k=i}^n a_{ik}b_{ki} = 0$.

Donc $c_{ii} = a_{ii}b_{ii}$.

D'où le résultat désiré!

QED ◀

3.3 Matrices carrées inversibles : groupe linéaire

Définition 25 : *Groupe linéaire d'ordre n sur un corps.*

Les éléments inversibles (pour \times) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont appelées matrices inversibles. On appelle leur ensemble groupe linéaire d'ordre n sur le corps \mathbb{K} et on le note $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Propriété 31 (Matrices inversibles élémentaires).

Les matrices d'opérations élémentaires sont inversibles.

Remarque.

Si $n > 1$ alors les matrices élémentaires de la base canonique de $\mathbb{K}^{n \times n}$ ne sont pas inversibles.

Exo 30.

Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on pose $P_\sigma \stackrel{\text{def.}}{=} (1_{\{i=\sigma(j)\}} : 1 \leq i, j \leq n)$. Montrer que la fonction $\mathcal{S}_n \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\sigma \mapsto P_\sigma$ induit un homomorphisme de groupes.

Propriété 32 (Inverse d'une matrice d'ordre 2).

Soit $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$. Dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Propriété 33 (Comportement de l'inversion).

Soient A et B deux matrices de $GL_n(\mathbb{K})$. Alors

- (i) $I_n \in GL_n(\mathbb{K})$ et $I_n^{-1} = I_n$.
- (ii) A^{-1} est inversible d'inverse A : $A = (A^{-1})^{-1}$.
- (iii) AB est inversible d'inverse $B^{-1}A^{-1}$.
- (iv) Pour tout entier naturel k , $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.
- (v) A^T est inversible, d'inverse $(A^{-1})^T$.

Exo 31.

Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. Calculer $A^3 + A$, en déduire que A est inversible et déterminer son inverse.

Propriété 34 (Inversion par résolution de système.)

Soit A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a l'équivalence :

$$A \in GL_n(\mathbb{K}) \iff \left(\forall b \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists ! x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), Ax = b \right).$$

Méthode 2.

Soit A une matrice carrée. On peut décider de l'inversibilité de A et calculer son inverse le cas échéant en résolvant le système $Ax = b$ d'inconnue $x \in \mathbb{K}^{n \times 1}$ et de paramètre $b \in \mathbb{K}^{n \times 1}$.

Commentaire : Étant donné les résultats des sections précédentes, on est en droit de se demander si les opérations élémentaires ne nous permettraient pas d'obtenir l'inverse d'une matrice. La réponse est oui!

Propriété 35 (Inversibilité et équivalence en lignes/en colonnes).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors les propositions suivantes sont équivalentes :

1. A est inversible.
2. A est équivalente en lignes à I_n .
3. A est équivalente en colonnes à I_n .

Propriété 36 (Inversibilité et opérations élémentaires).

La multiplication par une matrice inversible préserve l'inversibilité. Par suite, les opérations élémentaires préservent l'inversibilité de toute matrice.

Propriété 37 (Léminaire à la continuation de l'inversion par pivot total).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, avec

$$A = \begin{bmatrix} a & L \\ 0_{n-1,1} & A' \end{bmatrix}$$

où $a \in \mathbb{K}$, $L \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{K})$, $A' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$. Ainsi, si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ alors $a \in \mathbb{K}^*$ et $A' \in \text{GL}_{n-1}(\mathbb{K})$.

► **Démonstration.**

- (1) On peut montrer que le scalaire a est non nul en montrant que la première colonne de toute matrice inversible est non nulle.
- (2) On peut montrer **séparément**, en écrivant des systèmes d'égalités entre scalaires, que

la fonction ci-après est injective et qu'elle est surjective :

$$\mathbb{K}^{(n-1) \times 1} \longrightarrow \mathbb{K}^{(n-1) \times 1}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \longmapsto A' \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} .$$

QED ◀

Commentaire : On peut aussi démontrer propriété ci-avant en utilisant des produits par blocs comme dans la démonstration de la propriété 40 de la page 42.

Propriété 38 (Inversion par opérations élémentaires).

Par des opérations élémentaires sur les lignes,

1. On peut transformer toute matrice inversible en une matrice triangulaire supérieure de même ordre dont tous les coefficients diagonaux valent 1.
2. On peut transformer toute matrice inversible en la matrice identité de même ordre.

(Adaptation avec les colonnes en considérant la transposition.)

Méthode 3.

Soit A une matrice carrée. Une méthode pour déterminer l'inverse de A est de partir de la matrice A , à laquelle on accole la matrice identité, d'essayer de transformer A en la matrice identité à l'aide d'une méthode de pivot de Gauss, et de répercuter les opérations sur la matrice identité. La matrice obtenue à droite est alors l'inverse de A .

Explications : Si on transforme A en I_n par des opérations élémentaires, c'est que l'on a des matrices d'opérations élémentaires B_1, \dots, B_q telles que

$B_q B_{q-1} B_{q-2} \dots B_1 A = I_n$. Donc $A^{-1} = B_q \dots B_1$. Mais si on a reporté les opérations sur I_n , cela signifie que la matrice obtenue à droite est $B_q \dots B_1 I_n$, donc A^{-1} .

ATTENTION! On ne fait que des opérations sur les lignes, OU que des opérations sur les colonnes. On ne mêle surtout pas les deux façons!

En exemple, visons à calculer la matrice carrée inverse, si elle existe, de la matrice carrée

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

▷ *Invariant de boucle au cours du temps avec* $\left[\begin{array}{c} D_t \\ P_t \end{array} \right]$:

$$\ll A \times P_t = D_t \text{ ET } P_t \in \text{GL}_2(\mathbb{K}). \gg$$

$$\begin{array}{c} \left[\begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ \hline 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right] \underset{\text{C}}{\sim} \left[\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ \hline 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{array} \right] \quad (C_2 \leftarrow C_2 - C_1) \\ \\ \underset{\text{C}}{\sim} \left[\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \hline 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{array} \right] \quad (C_1 \leftarrow C_1 - C_2) \end{array}$$

▷ *Invariant de boucle au cours du temps avec* $\left[G_t \mid Q_t \right]$:

$$\ll G_t = Q_t \times A \text{ ET } Q_t \in \text{GL}_2(\mathbb{K}). \gg$$

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] &\stackrel{\sim}{\sim} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] & (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \\ &\stackrel{\sim}{\sim} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] & (L_1 \leftarrow L_1 - L_2) \end{aligned}$$

Suivant les deux procédures, on trouve que :

$$A \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) \quad \text{ET} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

C'est bien ce qu'on trouve par la propriété d'inversion d'une matrice carrée d'ordre 2.

Commentaire : Comme pour la décomposition des permutations d'un ensemble fini en produits de transpositions, on trouve ainsi le résultat suivant.

Propriété 39 (Génération du groupe linéaire).

Les produits de matrices d'opérations élémentaires d'un même ordre décrivent toutes les matrices inversibles de cet ordre.

3.4 Inversibilité et matrices triangulaires

Propriété 40 (Caractérisation des inversibles parmi les triangulaires).

Soit $A \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$. Ainsi,

1. La matrice A est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.
2. Si A est inversible, alors A^{-1} est aussi triangulaire supérieure et ses coefficients diagonaux sont les inverses des coefficients diagonaux de A .

Remarque.

Le résultat est bien sûr tout aussi vrai pour les matrices triangulaires inférieures (il n'y a qu'à

prendre la transposée) et pour les matrices diagonales (comme elles sont triangulaires supérieures et inférieures, c'est évident).

► **Démonstration.**

Cependant On démontre le résultat par récurrence sur n en appliquant le lemme 37 de la page 39. Cependant voici une autre démonstration par les produits par blocs.

Initialisation. Toute matrice triangulaire supérieure de taille 1 est une matrice de la forme (a) avec $a \in \mathbb{K}$, inversible ssi $a \neq 0$. Dans ce cas, $(a)^{-1} = (a^{-1})$.

Hérédité. Supposons le résultat vrai pour un certain n dans \mathbb{N}^* . Soit A dans $\mathcal{T}_{n+1}(\mathbb{K})$.

On peut écrire A sous la forme $A = \begin{bmatrix} B & C \\ 0_{1,n} & d \end{bmatrix}$ avec $B \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, $d \in \mathbb{K}$.

1. si A est inversible, alors on peut écrire son inverse sous la forme $\begin{bmatrix} B' & C' \\ L' & d' \end{bmatrix}$ où

$B' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $C' \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$, $L' \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $d' \in \mathbb{K}$. On a alors

$$\triangleright AA^{-1} = I_{n+1}, \text{ donc, par produit par blocs, comme } \begin{bmatrix} B & C \\ 0_{1,n} & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B' & C' \\ L' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & 0_{n,1} \\ 0_{1,n} & 1 \end{bmatrix},$$

- $dd' = 1$ donc $d' \neq 0$ et $d' = \frac{1}{d}$,
- $dL' = 0_{1,n}$ donc $L' = 0_{1,n}$,
- $BB' + CL' = I_n$ donc $BB' = I_n$

$\triangleright A^{-1}A = I_{n+1}$, donc de Même, $B'B = I_n$, donc B est triangulaire supérieure inversible, donc tous ses coefficients diagonaux sont non nuls

Donc, comme $d \neq 0$, tous les coefficients diagonaux de A sont non nuls.

2. si A est à coefficients diagonaux non nuls, alors par hypothèse de récurrence, B est inversible. On pose alors

$$M = \begin{bmatrix} B^{-1} & -\frac{1}{d}B^{-1}C \\ 0_{1,n} & \frac{1}{d} \end{bmatrix},$$

et on vérifie aisément que $MA = AM = I_{n+1}$. Le fait que les coefficients diagonaux de M soient les inverses de ceux de A est alors évident, car B^{-1} est triangulaire supérieure à coefficients diagonaux inverses de ceux de B , et le dernier coefficient de M est $\frac{1}{d}$ qui est bien l'inverse du dernier coefficient diagonal de A .

QED ◀

3.5 Trace d'une matrice carrée

Définition 26 : *Trace d'une matrice carrée.*

On considère $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle trace de A , qu'on note $\text{Tr}(A)$, l'élément de \mathbb{K} défini par

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n (A)_{i,i}$$

Exemple 3.3.

Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 8 \\ 0 & -3 & 8 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$, alors $\text{Tr}(A) = \dots$.

Propriété 41 (Trace d'une combinaison linéaire et d'un produit).

1. (linéarité) $\forall (A, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \text{Tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{Tr}(A) + \mu \text{Tr}(B)$,
2. (rapport au produit) $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}), \text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

► **Démonstration.**

2. On écrit

$$\begin{aligned}
\operatorname{Tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n [AB]_{ii} \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^p [A]_{ik} B_{ki} \\
&= \sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^n [A]_{ik} B_{ki} \\
&= \sum_{k=1}^p [BA]_{kk} \\
&= \operatorname{Tr}(BA).
\end{aligned}$$

QED ◀**Exo 32.**

1. Quelles sont les solutions de l'équation $XY - YX = I_n$, d'inconnue $(X, Y) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$?
2. Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Démontrer que s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $AP = PB$, alors $\operatorname{Tr}(B) = \operatorname{Tr}(A)$. La réciproque est-elle vraie ?

Exo 33.Pour $A, B \in \mathbb{K}^{n \times p}$, exprimer $\operatorname{Tr}(A^T B)$ en fonction des coefficients des deux matrices.**Propriété 42** (Sommes des carrés des coefficients).Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Alors

$$\operatorname{Tr}(A^T A) = 0 \iff A = 0.$$

► **Démonstration.**

Pour le sens indirect, il suffit de l'écrire.

Pour le sens direct, notons $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$. Alors

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}(A^T A) &= \sum_{i=1}^p [A^T A]_{ii} \\ &= \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^n [A^T]_{ik} [A]_{ki} \\ &= \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ki} a_{ki} \\ &= \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ki}^2. \end{aligned}$$

Or, comme les (a_{ki}) sont réels, $a_{ki}^2 \geq 0$. Une somme de termes positifs est nulle si et seulement si chacun des termes est nul, donc $\operatorname{Tr}(A^T A) = 0$ si et seulement si $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, $a_{ij} = 0$. **QED** ◀

SOMMAIRE

15 Matrices 1

1 Opérations sur les matrices	1
1.1 Définitions	1
1.2 Addition, multiplication par un scalaire	4
1.3 Produit matriciel	7
1.3.1 Définitions et propriétés	7
1.3.2 Produit et matrices élémentaires de la base canonique	11
1.3.3 Produit par blocs	13
1.4 Transposition	16
1.5 Opérations élémentaires	18
2 Systèmes linéaires	21
2.1 Écriture matricielle d'un système linéaire	21
2.2 Structure de l'ensemble des solutions	22
2.3 Opérations élémentaires et méthode du pivot	23
3 Matrices carrées	29
3.1 Formes particulières de matrices carrées	29

3.2	Structure d'anneau non commutatif	34
3.3	Matrices carrées inversibles : groupe linéaire	37
3.4	Inversibilité et matrices triangulaires	42
3.5	Trace d'une matrice carrée	44