MPSI 1

Mathématiques DS 09

Samedi 4 mai – 8h-12h

- Durée : 4 heures.
- Toute calculatrice ou appareil électronique est interdit.
- Le sujet est composé d'un petit exercice de cours/calculs et d'un problème de probabilités (avec un peu de matrices à la fin).
- Prenez **10-15 minutes** pour lire le sujet en entier et décider de la stratégie que vous adopterez.
- **Encadrez, soulignez vos résultats et numérotez vos pages.**
Le soin apporté à la copie est un paramètre qui sera pris en compte dans l'évaluation.
- À tout moment, vous pouvez admettre le résultat d'une question pour pouvoir continuer : il suffit de le préciser clairement sur la copie.
- Si vous voyez ce qui semble être une erreur d'énoncé, indiquez-le sur la copie.
- Essayez de changer de copie, au moins de page, lorsque vous changez d'exercice.
- Laissez de la place dans une marge à gauche pour pouvoir noter plus facilement le devoir.
- Une réponse fautive, si elle ne laisse pas paraître de calculs intermédiaires, compte 0 points ; avec calculs intermédiaires elle peut rapporter quelques points.

♪ Bon courage! ♪

Exercice 1. Cours et calculs.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner, en le justifiant, la décomposition en éléments simples de $\frac{nX^{n-1}}{X^n - 1}$.

Correction

En posant $P(X) = X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega)$, on a

$$\frac{nX^{n-1}}{X^n - 1} = \frac{P'}{P} = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{1}{X - \omega}$$

2. Calculer une primitive de $x \mapsto \frac{2}{x^3 - x^2 + x - 1}$.

Correction

On remarque que $x^3 - x^2 + x - 1 = (x - 1)(x^2 + 1)$. Ainsi, on sait qu'il existe a, b, c tels que

$$\frac{2}{x^3 - x^2 + x - 1} = \frac{a}{x - 1} + \frac{bX + c}{x^2 + 1}.$$

On trouve $a = 1$, puis, en évaluant en 0, $c = -2 + a = -1$ et en multipliant par x et en faisant tendre x vers $+\infty$, $a + b = 0$. Donc $b = -1$. Donc

$$\frac{2}{x^3 - x^2 + x - 1} = \frac{1}{x - 1} - \frac{x + 1}{x^2 + 1}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int^x \frac{2}{t^3 - t^2 + t - 1} dt &= \ln|x - 1| - \int^x \frac{t}{t^2 + 1} dt - \int^x \frac{1}{t^2 + 1} dt \\ &= \ln|x - 1| - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \text{Arctan}(x). \end{aligned}$$

3. Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, donner une matrice de rang 1, une matrice de rang 2, une matrice de rang 3 chaque matrice ne contenant aucun coefficient nul. Justifier rapidement le rang de chaque matrice.

4. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & (1) & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer l'image de A , son rang, la dimension et une base de son noyau.

Problème 1. Marches aléatoires**A. Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$**

On modélise une marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ de la façon suivante :

- on travaille tout du long dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$;

- on se donne une suite $(X_n)_{n \geq 1}$ de variables aléatoires mutuellement indépendantes, de même loi donnée par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \mathbb{P}(X_n = -1) = \mathbb{P}(X_n = +1) = \frac{1}{2}.$$

- On pose $S_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

S_n correspond la position du « marcheur aléatoire » à l'instant n : à chaque instant il a une chance sur deux de faire un pas en avant, une chance sur deux de faire un pas en arrière. À ω fixé, on peut représenter graphiquement la réalisation d'une marche aléatoire comme l'ensemble des points $(n, S_n(\omega))$, que l'on relie afin de former une ligne brisée. On remarque qu'entre deux instants, $S_n(\omega)$ ne peut que augmenter de 1 ou diminuer de 1.

Figure 1 – Un exemple de trajectoire reliant $(0, 0)$ à $(9, -1)$.

Un tel type de ligne brisée est appelé **trajectoire** reliant un point à un autre (ce vocabulaire sera utile dans la sous-partie A-III., où on dénombre certains types de trajectoires).

Le but de cette ce qui suit est d'étudier la variable aléatoire $|S_n|$ exprimant, en fonction du temps, la distance du marcheur à son point d'origine et, notamment, de calculer un équivalent de son espérance et de sa variance. La dernière sous-partie relie la probabilité de ne jamais revenir à l'origine à la variable $|S_n|$.

- 1. Lemme technique, utile pour la suite.** Démontrer que pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, pour tout k dans $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$,

$$\binom{2n-1}{n+k-1} - \binom{2n-1}{n+k} = \frac{2k}{2n} \binom{2n}{n+k}$$

On admettra que, de même, $\binom{2n}{n+k} - \binom{2n}{n+k+1} = \frac{2k+1}{2n+1} \binom{2n+1}{n+k}$.

Correction

On a juste à calculer...

$$\begin{aligned}
 \binom{2n-1}{n+k-1} - \binom{2n-1}{n+k} &= \frac{(2n-1)!}{(n+k-1)!(n-k)!} - \frac{(2n-1)!}{(n+k)!(n-k-1)!} \\
 &= \frac{(2n-1)!}{(n+k-1)!(n-k-1)!} \left(\frac{1}{n-k} - \frac{1}{n+k} \right) \\
 &= \frac{(2n-1)!}{(n+k-1)!(n-k-1)!} \frac{2k}{(n+k)(n-k)} \\
 &= \frac{2k}{2n} \frac{2n}{(n+k)(n-k)} \frac{(2n-1)!}{(n+k-1)!(n-k-1)!} \\
 &= \frac{2k}{2n} \binom{2n}{n+k}.
 \end{aligned}$$

Pour le résultat admis, je le démontre quand même :

$$\begin{aligned}
 \binom{2n}{n+k} - \binom{2n}{n+k+1} &= \frac{(2n)!}{(n+k)!(n-k)!} - \frac{(2n)!}{(n+k+1)!(n-k-1)!} \\
 &= \frac{(2n)!}{(n+k+1)!(n-k)!} ((n+k+1) - (n-k)) \\
 &= \frac{(2n)!}{(n+k+1)!(n-k)!} (2k+1) \\
 &= \frac{2k+1}{2n+1} \frac{(2n+1)!}{(n+k+1)!(n-k)!} = \frac{2k+1}{2n+1} \binom{2n+1}{n+k+1}
 \end{aligned}$$

A-I. Quelques bases

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Quelle est la loi suivie par $Y_n = \frac{X_n + 1}{2}$? En déduire la loi de $\frac{S_n + n}{2}$ pour tout entier n non nul.

Correction

Comme X_n est à valeurs dans $\{-1, 1\}$, Y_n est à valeurs dans $\{0, 1\}$ et

$$\mathbb{P}(Y_n = 0) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, $X_n \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$.

On en déduit que

$$\frac{S_n + n}{2} = \sum_{i=1}^n \frac{X_n + 1}{2} = \sum_{i=1}^n Y_i,$$

donc $\frac{S_n + n}{2} \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$ comme somme de variables de Bernoulli mutuellement indépendantes.

3. Déterminer $\mathbb{E}(S_n)$, $\mathbb{V}(S_n)$ et $\mathbb{E}(S_n^2)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Correction

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(Y_i) = 0,$$

car pour $i \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{E}(Y_i) = \frac{1}{2} \times (-1) + \frac{1}{2} \times 1 = 0$.

Comme $Y_1, \dots, Y_n$ sont mutuellement indépendantes, on en déduit que

$$\mathbb{V}(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i).$$

Or, $\mathbb{V}(X_i) = \mathbb{E}(X_i^2) - \mathbb{E}(X_i)^2 = 1 - 0$, car $X_i^2 = 1$. Donc $\mathbb{V}(S_n) = n$.

4. Démontrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}\left(|S_n| \geq n^{\frac{1}{2} + \varepsilon}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Correction

Soit $\varepsilon > 0$. Soit n dans $\mathbb{N}$. Alors, par l'inégalité de Bienaymé-Tchebycheff,

$$\mathbb{P}\left(|S_n - \mathbb{E}(S_n)| \geq n^{\frac{1}{2} + \varepsilon}\right) \leq \frac{\mathbb{V}(S_n)}{(n^{\frac{1}{2} + \varepsilon})^2},$$

i.e.

$$\mathbb{P}\left(|S_n| \geq n^{\frac{1}{2} + \varepsilon}\right) \leq \frac{n}{n^{1+2\varepsilon}} = \frac{1}{n^{2\varepsilon}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Que vaut $\mathbb{P}(S_{2n+1} = 0)$? On justifiera la réponse.

Correction

Pour que $S_{2n+1} = 0$, il faut avoir autant de X_i égaux à 1 qu'à -1 parmi $X_1, \dots, X_{2n+1}$, ce qui est impossible ! Donc $\mathbb{P}(S_{2n+1} = 0) = 0$.

6. On pose, pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, $u_n = \mathbb{P}(S_{2n} = 0)$. Déterminer une expression de u_n et un équivalent simple, quand n tend vers $+\infty$, de u_n .

Correction

Posons $T_n = \frac{S_n + n}{2}$. Alors on a vu que $T_n \sim \mathcal{B}(n, 1/2)$. Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_{2n} = 0) &= \mathbb{P}(2T_{2n} - 2n = 0) \\ &= \mathbb{P}(2T_{2n} = 2n) \\ &= \mathbb{P}(T_{2n} = n) \\ &= \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

On a alors

$$u_n = \frac{1}{4^n} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4^n} \frac{\sqrt{2\pi 2n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{2\pi n \left(\frac{n}{e}\right)^{2n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

A-II. Étude de l'éloignement

Comme S_n est à valeurs dans $\llbracket -n, n \rrbracket$ (plus précisément $\{-n, -n+2, -n+4, \dots, n-2, n\}$), $|S_n|$ est à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$. On remarque de plus que si $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\mathbb{P}(|S_n| = k) = 0$ lorsque k n'est pas de la même parité que n .

7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\frac{1}{2n} \mathbb{E}(|S_{2n}|) = \mathbb{P}(S_{2n} = 0)$ et que $\frac{1}{2n+1} \mathbb{E}(|S_{2n+1}|) = \mathbb{P}(S_{2n} = 0)$.

Correction

Faisons le calcul (et croisons les doigts!). On sait que $|S_{2n}|$ est à valeurs dans

$\{0, 2, 4, \dots, 2n\}$. On peut donc écrire que

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2n} \mathbb{E}(|S_{2n}|) &= \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^n 2k \mathbb{P}(|S_{2n}| = 2k) \\
 &= \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^n 2k (\mathbb{P}(S_{2n} = 2k) + \mathbb{P}(S_{2n} = -2k)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{2k}{2n} (\mathbb{P}(S_{2n} = 2k) + \mathbb{P}(S_{2n} = -2k)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} (\mathbb{P}(2T_{2n} - 2n = 2k) + \mathbb{P}(2T_{2n} - 2n = -2k)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} (\mathbb{P}(T_{2n} = n+k) + \mathbb{P}(T_{2n} = n-k)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} \frac{1}{4^n} \left(\binom{2n}{n+k} + \binom{2n}{n-k} \right) \\
 &= \frac{2}{4^n} \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} \binom{2n}{n+k} \\
 &= \frac{2}{4^n} \sum_{k=0}^n \left(\binom{2n-1}{n+k-1} - \binom{2n-1}{n+k} \right) \text{ par le lemme technique.} \\
 &= \frac{2}{4^n} \binom{2n-1}{n-1} \text{ par télescopage}
 \end{aligned}$$

Or, $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} = \frac{1}{4^n} \frac{2n}{n} \binom{2n-1}{n-1} = \frac{2}{4^n} \binom{2n-1}{n-1} = \frac{1}{2n} \mathbb{E}(|S_{2n}|)$, d'où le résultat.

De même, $|S_{2n+1}|$ est à valeurs dans $\{1, 3, \dots, 2n+1\}$, donc

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2n+1} \mathbb{E}(|S_{2n+1}|) &= \frac{1}{2n+1} \sum_{k=0}^n (2k+1) \mathbb{P}(|S_{2n+1}| = 2k+1) \\
 &= \frac{1}{2n+1} \sum_{k=0}^n 2k (\mathbb{P}(S_{2n+1} = 2k+1) + \mathbb{P}(S_{2n+1} = -2k-1)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{2k+1}{2n+1} (\mathbb{P}(S_{2n+1} = 2k+1) + \mathbb{P}(S_{2n+1} = -2k-1)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{2k+1}{2n+1} (\mathbb{P}(2T_{2n+1} - 2n - 1 = 2k+1) + \mathbb{P}(2T_{2n+1} - 2n - 1 = -2k-1)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{2k+1}{2n+1} (\mathbb{P}(T_{2n+1} = n+k+1) + \mathbb{P}(T_{2n+1} = n-k)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{2k+1}{2n+1} \frac{1}{2^{2n+1}} \left(\binom{2n+1}{n+k+1} + \binom{2n+1}{n-k} \right) \\
 &= \frac{2}{2^{2n+1}} \sum_{k=0}^n \frac{2k+1}{2n+1} \binom{2n+1}{n+k+1} \\
 &= \frac{1}{4^n} \sum_{k=0}^n \left(\binom{2n}{n+k} - \binom{2n}{n+k+1} \right) \text{ par le lemme technique.} \\
 &= \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} = \mathbb{P}(S_{2n} = 0) \text{ par télescopage}
 \end{aligned}$$

8. En déduire un équivalent de $\mathbb{E}(|S_n|)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Correction

On sait déjà que

$$\mathbb{E}(|S_{2n}|) = 2n \mathbb{P}(S_{2n} = 0) = 2n u_{2n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2n}{\sqrt{\pi n}} = 2\sqrt{\frac{n}{\pi}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{2n}.$$

De même,

$$\mathbb{E}(|S_{2n+1}|) = (2n+1) \mathbb{P}(S_{2n+1} = 0) = (2n+1) u_{2n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2n+1}{\sqrt{\pi n}} = 2\sqrt{\frac{n}{\pi}}.$$

Donc (astuce)

$$\mathbb{E}(|S_{2n+1}|) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{2n+1},$$

donc, comme les suites extraites des termes pairs et impairs de la suite $\left(\frac{\mathbb{E}(|S_n|)}{\sqrt{\frac{2n}{\pi}}} \right)$

tendent toutes deux vers 1, on en déduit que

$$\mathbb{E}(|S_n|) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2n}{\pi}}$$

A-III. Probabilité de non-retour en zéro

On cherche à déterminer $\mathbb{P}(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0)$. On note, pour $m \leq n$,

- $\mathcal{T}((m, a), (n, b))$ le nombre de trajectoires reliant (m, a) et (n, b) .
- $\mathcal{C}((m, a), (n, b))$ le nombre de trajectoires reliant (m, a) et (n, b) sans intersecter l'axe des abscisses.
- $\mathcal{A}((m, a), (n, b))$ le nombre de trajectoires reliant (m, a) et (n, b) en intersectant l'axe des abscisses.

Une trajectoire partant de l'abscisse m allant à l'abscisse n est modélisée par une suite de déplacements $(x_m, x_{m+1}, \dots, x_n)$ où pour tout i , $x_i = \pm 1$.

Ainsi, si on part de a en m , on arrive, en n , à $a + \sum_{i=m}^n x_i$.

9. Soient $b > 0$, $n \geq b$. Démontrer que

$$\mathcal{T}((1, 1), (2n, 2b)) = \binom{2n-1}{n+b-1} \text{ et } \mathcal{T}((1, -1), (2n, 2b)) = \binom{2n-1}{n+b}.$$

Correction

Une trajectoire est, comme donné par l'énoncé, une succession de 1 et de -1 . Comme on va de l'abscisse 1 à l'abscisse $2n$, il y a $2n-1$ « ± 1 ». S'il y a k « 1 », alors il y a $2n-1-k$ « -1 », donc la trajectoire passe de 1 à $2k+2-2n$. Or, on veut que l'ordonnée finale soit $2b$, donc que $2k-2n+2=2b$, donc $k=n+b-1$.

Choisir un chemin qui va de $(1, 1)$ à $(2n, 2b)$, c'est donc choisir la position des $n+b-1$

« 1 » dans la trajectoire, d'où $\binom{2n-1}{n+b-1}$ choix possibles.

On fait de même pour aller de $(1, -1)$ à $(2n, 2b)$, sauf que l'ordonnée finale est $2k-2n$, d'où $k=n+b$.

10. Soit $b > 0$. Démontrer que pour tout $n \geq b$,

$$\begin{aligned} \mathcal{C}((1, 1), (2n, 2b)) &= \mathcal{T}((1, 1), (2n, 2b)) - \mathcal{A}((1, 1), (2n, 2b)) \\ &= \mathcal{T}((1, 1), (2n, 2b)) - \mathcal{T}((1, -1), (2n, 2b)). \end{aligned}$$

$$\text{et en déduire que } \mathcal{C}((1, 1), (2n, 2b)) = \binom{2n-1}{n+b-1} - \binom{2n-1}{n+b} = \frac{2b}{2n} \binom{2n}{n+b}.$$

Des dessins seront + que bienvenus!

Correction

La première égalité est évidente. Pour la seconde, il suffit de remarquer que, moyennant une réflexion, les chemins qui relient $(1, -1)$ à $(2n, 2b)$ sont en bijection avec ceux qui relient $(1, 1)$ et $(2n, 2b)$ en passant par l'axe des abscisses.

En effet, si on prend un chemin qui va de $(1, 1)$ à $(2n, 2b)$ en passant par l'axe des abscisses (chemin en trait plein), on lui associe le chemin (en pointillés) allant de $(1, -1)$ à $(2n, 2b)$ en procédant de la sorte : on note k la première fois que le chemin en trait plein rencontre l'axe des abscisses. On fait alors la symétrie de la portion de chemin de 1 à k , puis ensuite on suit le chemin original.

On en déduit le résultat par la question précédente.

11. Justifier que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) &= \mathbb{P}(S_1 > 0, S_2 > 0, \dots, S_{2n} > 0) + \mathbb{P}(S_1 < 0, S_2 < 0, \dots, S_{2n} < 0) \\ &= 2\mathbb{P}(S_1 > 0, S_2 > 0, \dots, S_{2n} > 0) \end{aligned}$$

Correction

Comme à chaque étape on avance de 1 ou on recule de 1, avoir $S_i \neq 0$ pour tout i revient à avoir $S_i > 0$ pour tout i ou bien $S_i < 0$ pour tout i (si $S_i > 0$ et $S_j < 0$, nécessairement, il existe k tel que $S_k = 0$). Donc

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) \\ &= \mathbb{P}(S_1 > 0, S_2 > 0, \dots, S_{2n} > 0) + \mathbb{P}(S_1 < 0, S_2 < 0, \dots, S_{2n} < 0) \end{aligned}$$

Or, par symétrie, il y a autant de chemins au-dessus de l'axe des abscisses que en-dessous de l'axe des abscisses, donc

$$\mathbb{P}(S_1 < 0, S_2 < 0, \dots, S_{2n} < 0) = \mathbb{P}(S_1 > 0, S_2 > 0, \dots, S_{2n} > 0),$$

d'où le résultat désiré.

12. En déduire que pour tout n ,

$$\mathbb{P}(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) = \frac{1}{2n} \mathbb{E}(|S_{2n}|).$$

Interpréter ce résultat : quelle serait la probabilité de ne jamais repasser par 0 ?

Correction

On écrit alors que

$$\mathbb{P}(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) = \mathbb{P}(S_1 > 0, S_2 > 0, \dots, S_{2n} > 0) + \mathbb{P}(S_1 < 0, S_2 < 0, \dots, S_{2n} < 0).$$

Ensuite, si $b > 0$

$$\mathbb{P}(S_1 > 0, S_2 > 0, \dots, S_{2n} > 0, S_{2n} = 2b) = \frac{\mathcal{T}_+((1, 1), (2n, 2b))}{2^n} = \frac{2b}{2n} \mathbb{P}(S_{2n} = 2b),$$

et, de même,

$$\mathbb{P}(S_1 < 0, S_2 < 0, \dots, S_{2n} < 0, S_{2n} = -2b) = \frac{2b}{2n} \mathbb{P}(S_{2n} = -2b),$$

et donc, par la formule des probabilités totales, $\mathbb{P}(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) = \mathbb{E}(|S_n|)$.

Ainsi, la probabilité de ne jamais atteindre 0 jusqu'au rang n est

$$\frac{1}{2n} \mathbb{E}(|S_n|) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n} \sqrt{\frac{2n}{\pi}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 0.$$

Ainsi, quand n tend vers $+\infty$, la probabilité de ne jamais atteindre 0 tend vers 0 : on va presque sûrement rencontrer l'axe des abscisses dans une marche aléatoire 1-D.

B. Marche aléatoire sur le cercle

On considère cette fois-ci une marche aléatoire sur un « cercle », modélisé par ℓ points numérotés de 0 à $\ell - 1$.

Les déplacements successifs du marcheur sont modélisés par une suite $(S_n)_{n \geq 0}$, la position initiale étant $S_0 = 0$. La probabilité de faire un pas dans le sens direct est $\frac{1}{2}$, celle de faire un pas dans le sens rétrograde est $\frac{1}{2}$.

13. Justifier proprement que, si l'on note, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$C_n = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(S_n = 0) \\ \mathbb{P}(S_n = 1) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(S_n = \ell - 1) \end{pmatrix}, \text{ alors } C_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} \quad C_{n+1} = AC_n,$$

où

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & \cdots & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & & 0 \\ 0 & 1/2 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1/2 & 0 \\ 0 & & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & \cdots & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(J + J^T), \text{ où } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Correction

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $k \in \llbracket 1, \ell - 2 \rrbracket$. Alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_{n+1} = k) &= \mathbb{P}_{S_n=k-1}(S_n = k)\mathbb{P}(S_n = k-1) + \mathbb{P}_{S_n=k+1}(S_n = k)\mathbb{P}(S_n = k+1) \\ &= \frac{1}{2}\mathbb{P}(S_n = k-1) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(S_n = k+1). \end{aligned}$$

De même

$$\mathbb{P}(S_{n+1} = 0) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(S_n = \ell - 1) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(S_n = 1)$$

et

$$\mathbb{P}(S_{n+1} = \ell - 1) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(S_n = \ell - 2) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(S_n = 0)$$

D'où

$$C_{n+1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \mathbb{P}(S_n = 1) + \mathbb{P}(S_n = \ell - 1) \\ \mathbb{P}(S_n = 0) + \mathbb{P}(S_n = 2) \\ \mathbb{P}(S_n = 1) + \mathbb{P}(S_n = 3) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(S_n = \ell - 2) + \mathbb{P}(S_n = 0) \end{pmatrix} = AC_n.$$

D'où le résultat désiré !

14. Représenter les matrices $J^2, \dots, J^{\ell-1}$ et J^ℓ . Laquelle des matrices précédentes est-elle égale à $J^\top$?

Correction

C'est pénible à taper...

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & & & \\ & 0 & 0 & 1 & & (0) \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & (0) & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & & & & \ddots & & 0 \\ 0 & 1 & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

et on obtient tous les J^k en décalant les diagonales de 1. En particulier,

$$J^\ell = I_n, \quad J^{\ell-1} = J^\top = J^{-1}$$

Dans toute la suite, on pose $\omega = e^{2i\pi/\ell}$ et

$$\forall k \in \llbracket 0; \ell - 1 \rrbracket \quad U_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \omega^k \\ \omega^{2k} \\ \vdots \\ \omega^{(\ell-1)k} \end{pmatrix}$$

15. On considère la matrice P ayant pour colonnes $(U_0, \dots, U_{\ell-1})$. Démontrer que l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{C}_{\ell-1}[X] \rightarrow \mathbb{C}^\ell \\ Q \mapsto (Q(1), Q(\omega), \dots, Q(\omega^{\ell-1})) \end{cases}$$

est un isomorphisme et en déduire que $P^\top$ est inversible, puis que $(U_0, \dots, U_{\ell-1})$ est une base de $\mathcal{M}_{\ell,1}(\mathbb{C})$.

Correction

Comme $(1, \omega, \dots, \omega^{\ell-1})$ sont deux à deux distincts (éléments de $\mathbb{U}_\ell$), le théorème d'interpolation de Lagrange assure que φ est un isomorphisme. Ainsi, $P^\top$, qui est la matrice de φ dans les bases canoniques de $\mathbb{C}_{\ell-1}[X]$ au départ et $\mathbb{C}^\ell$ à l'arrivée, est inversible. Donc P est aussi inversible, donc ses colonnes forment une base de $\mathcal{M}_{\ell,1}(\mathbb{C})$.

16. Déterminer la matrice de l'application linéaire canoniquement associée à J dans la base $(U_0, \dots, U_{\ell-1})$ (au départ et à l'arrivée). En déduire, en utilisant le cours de cette semaine, que

$$P^{-1}JP = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \omega & & (0) \\ & & \omega^2 & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & & \omega^{\ell-1} \end{pmatrix}$$

Correction

Soit k dans $\llbracket 0, \ell - 1 \rrbracket$. Alors

$$JU_k = \begin{pmatrix} \omega^k \\ \omega^{2k} \\ \vdots \\ \omega^{(\ell-1)k} \\ 1 \end{pmatrix} = \omega^k U_k.$$

Ainsi, la matrice de cette application linéaire est $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \omega & & (0) \\ & & \omega^2 & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & & \omega^{\ell-1} \end{pmatrix}$. Par le cours, cette matrice est semblable à J , et la matrice de passage est la matrice de

$(U_0, \dots, U_{\ell-1})$ dans la base canonique, i.e. P . Donc

$$P^{-1}JP = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \omega & & (0) \\ & & \omega^2 & \\ (0) & & & \ddots \\ & & & & \omega^{\ell-1} \end{pmatrix}$$

17. En remarquant que $A = \frac{1}{2}(J + J^T)$, montrer que $\Delta = P^{-1}AP$ est diagonale; expliciter Δ en fonction des $\lambda_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{\ell}\right)$.

Correction

Même si on n'a pas compris le cours de cette semaine, on peut rattraper cette question. On en déduit que

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \frac{1}{2}P^{-1}(J + J^T)P \\ &= \frac{1}{2}(P^{-1}JP + P^{-1}J^T P) \\ &= \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \omega & & (0) \\ & & \omega^2 & \\ (0) & & & \ddots \\ & & & & \omega^{\ell-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \omega^{-1} & & (0) \\ & & \omega^{-2} & \\ (0) & & & \ddots \\ & & & & \omega^{-(\ell-1)} \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 & & & \\ e^{\frac{2i\pi}{\ell}} + e^{-\frac{2i\pi}{\ell}} & & (0) & \\ & e^{\frac{4i\pi}{\ell}} + e^{-\frac{4i\pi}{\ell}} & & \\ (0) & & \ddots & \\ & & & e^{\frac{2(\ell-1)i\pi}{\ell}} + e^{-\frac{2(\ell-1)i\pi}{\ell}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(0) & & & \\ & \cos\left(\frac{2\pi}{\ell}\right) & & (0) \\ & & \cos\left(\frac{4\pi}{\ell}\right) & \\ (0) & & & \ddots \\ & & & & \cos\left(\frac{2(\ell-1)\pi}{\ell}\right) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

donc Δ est la matrice diagonale formée des λ_k !

On dit qu'une suite de matrices converge si chacun de ses coefficients converge. Par exemple, on

peut écrire que

$$\begin{pmatrix} 1/n & 1 - e^{-n} \\ 0 & \frac{n+1}{n} \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On admet que si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites de matrices, si $A_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} A$ et $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} B$, alors $A_n + B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} A + B$ et $A_n B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} A \times B$.

18. Montrer que la suite $(\Delta^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et expliciter sa limite.

Correction

Si $k \in \llbracket 1, \ell - 1 \rrbracket$, $|\lambda_k| < 1$ donc $\lambda_k^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc

$$\Delta^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} E_{11}$$

(matrice de la base canonique de $\mathcal{M}_\ell(\mathbb{K})$).

19. En déduire que la suite $(A^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et déterminer, sous forme d'un produit de matrice, sa limite (en particulier, on ne demande pas de calculer P^{-1}).

Correction

On en déduit que $A^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P^{-1} E_{11} P$.

20. Calculer $P U_0$, puis en déduire $P^{-1} C_0$.

Correction

On calcule

$$P U_0 = \begin{pmatrix} 1 + 1 + \dots + 1 \\ \sum_{k=0}^n \omega^k \\ \sum_{k=0}^n (\omega^2)^k \\ \vdots \\ \sum_{k=0}^n (\omega^{\ell-1})^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \boxed{\ell C_0},$$

car pour $p \in \llbracket 1, \ell - 1 \rrbracket$, $\sum_{k=0}^{\ell-1} (\omega^p)^k = 0$. Donc $P^{-1} C_0 = \frac{1}{\ell} U_0$.

21. Exprimer C_n en fonction de A et de C_0 . En déduire que $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = \frac{1}{\ell} U_0$. Interpréter ce résultat du point de vue de la marche aléatoire sur le « cercle ».

Correction

On en déduit alors que

$$C_n = A^n C_0 = P \Delta^n P^{-1} C_0 = \frac{1}{\ell} P \Delta^n U_0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ell} P E_{11} U_0 = \frac{1}{\ell} P U_0 = \frac{1}{\ell} C_0.$$

Cela signifie qu'en temps long, la loi de la position sur le cercle est presque une loi uniforme.