MPSI 1

Mathématiques DS 02

Samedi 7 octobre – 8h-12h

- Durée : 4 heures.
- Toute calculatrice ou appareil électronique est interdit.
- Le sujet est composé d'un problème constitué de questions de cours indépendantes, et d'un problème constitué de parties sur la trigonométrie, les complexes et les fonctions usuelles.
- Le sujet est **long** : il **ne faut pas** essayer de tout faire. Un sujet long vous permet de **choisir** ce qui vous inspire le plus. Repérez les questions indépendantes, les parties indépendantes des autres, etc.
- Les questions avec le cadre **COURS** sont des questions où il y a du cours brut à recracher (peut-être que la deuxième partie de la question demande de la réflexion, mais il y aura une partie de cours pur). Les questions avec le cadre **EXO** sont des questions qui sont **très proches** d'un exercice fait en cours. Cet indicateur doit vous inciter à vous lancer dans cette question en vous rappelant une méthode vue en classe.
- Prenez **10-15 minutes** pour lire le sujet en entier et décider de la stratégie que vous adopterez.
- **Encadrez, soulignez vos résultats et numérotez vos pages.**
- À tout moment, vous pouvez admettre le résultat d'une question pour pouvoir continuer : il suffit de le préciser clairement sur la copie.
- Si vous voyez ce qui semble être une erreur d'énoncé, indiquez-le sur la copie.
- Essayez de changer de copie, au moins de page, lorsque vous changez d'exercice.
- Laissez de la place dans une marge à gauche pour pouvoir noter plus facilement le devoir.
- Une réponse fautive, si elle ne laisse pas paraître de calculs intermédiaires, compte 0 points ; avec calculs intermédiaires elle peut rapporter quelques points.

♪ Bon courage! ♪

Problème 1. Le cours, le cours, le cours

Toutes les questions de ce problème sont indépendantes.

A. Cours brut

1. Si $z \in \mathbb{C}$. Définir e^z . Donner le module et un argument de e^z en fonction de z .
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Définir $\mathbb{U}_n$. Donner la valeur de $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega$.
3. Si f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définir « f est périodique ».
4. Raconter le cours sur les fonctions puissances $x \mapsto x^a$: définition, ensemble de définition, prolongement éventuel, dérivabilité, allure des graphes en fonction des valeurs de a .

B. Exercices du cours

5. Écrire sous la forme $\rho e^{i\theta}$, où $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$, les complexes $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$.

Correction

$$1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ et } \sqrt{3} - i = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}.$$

6. Déterminer les racines carrées de $3 + 4i$.

Correction

On trouve $2 + i$ et $-2 - i$.

7. Déterminer le module et un argument de $z_3 = 1 - e^{i\frac{\pi}{7}}$.

Correction

$1 - e^{i\frac{\pi}{7}} = e^{i\frac{\pi}{14}} \times (-2i) \sin \frac{\pi}{14} = 2 \sin \frac{\pi}{14} e^{i\frac{\pi}{14} - i\frac{\pi}{2}}$. Donc, comme $\frac{\pi}{14} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on en déduit que

$$|z_3| = 2 \sin \frac{\pi}{14} \text{ et } \arg(z_3) = -\frac{3\pi}{7} [2\pi].$$

8. Étudier la fonction $x \mapsto x^x$ et dessiner, à main levée, son graphe.

Problème 2. Théorème de Niven et entiers de Gauss

Ce problème est consacré au théorème de Niven, s'intéressant à la rationalité de $\cos(r\pi)$, $\sin(r\pi)$ et $\tan(r\pi)$, lorsque r est rationnel, ainsi qu'à ses applications. Il est constitué de quatre parties assez indépendantes.

La **partie A**, utilisant de la trigonométrie et des polynômes, s'attache à démontrer le théorème de Niven. Seuls les résultats des questions 6., 7., 8. et 9. seront utilisés pour la suite.

La **partie B** donne une application à une équation polynomiale dans $\mathbb{C}$.

La **partie C**, très orientée « fonctions usuelles » et complètement indépendante des parties précédentes, donne une approximation rationnelle de π .

Enfin, la **partie D** est consacrée à l'étude algébrique et géométrique des entiers de Gauss.

On rappelle que l'ensemble des rationnels est noté $\mathbb{Q}$, et que l'on a les deux définitions suivantes (équivalentes)

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\} = \left\{ \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*, \text{pgcd}(p, q) = 1 \right\}.$$

A. Théorème de Niven

A-1. Une suite de polynômes

On définit la suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes comme suit : pour tout z dans $\mathbb{C}$,

$$P_0(z) = 2, P_1(z) = z \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, P_{n+2}(z) = zP_{n+1}(z) - P_n(z).$$

1. Calculer P_2 et P_3 .

Correction

On calcule ! Soit $z \in \mathbb{C}$. Alors

$$P_2(z) = zP_1(z) - P_0(z) = z^2 - 2 \text{ et } P_3(z) = zP_2(z) - P_1(z) = z^3 - 2z - z = z^3 - 3z.$$

2. **EXO** Démontrer que pour tout θ dans $\mathbb{R}$, pour tout n dans $\mathbb{N}$, $P_n(2 \cos(\theta)) = 2 \cos(n\theta)$.

Correction

On montre le résultat par récurrence double sur n . Soit, pour tout n dans $\mathbb{N}$,

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, P_n(2 \cos(\theta)) = 2 \cos(n\theta). \quad (\mathcal{P}_n)$$

Initialisation. Pour $n = 0$, si $\theta \in \mathbb{R}$, $P_0(2 \cos(\theta)) = 2 = 2 \cos(0\theta)$. Pour $n = 1$, si $\theta \in \mathbb{R}$, $P_1(2 \cos(\theta)) = 2 \cos(\theta)$.

Hérédité. Soit n dans $\mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{P}_{n+1}$ soient vraies. Démontrons $\mathcal{P}_{n+2}$. Soit θ dans

$\mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned}
 P_{n+2}(2 \cos(\theta)) &= 2 \cos(\theta) P_{n+1}(2 \cos(\theta)) - P_n(2 \cos(\theta)) \\
 &= 2 \cos(\theta) \times 2 \cos((n+1)\theta) - 2 \cos(n\theta) \\
 &= 2 (2 \cos(\theta) \cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta)) \\
 &= 2 \left(\cos(\theta + (n+1)\theta) + \underbrace{\cos(\theta - (n+1)\theta)}_{=0} - \cos(n\theta) \right) \\
 &= \boxed{2 \cos((n+2)\theta)},
 \end{aligned}$$

ce qui achève l'hérédité et qui démontre le résultat par le principe de récurrence.

3. Démontrer que pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, P_n est de degré n , à coefficients entiers et de coefficient dominant égal à 1.

Correction

On démontre aussi le résultat par récurrence !

L'**initialisation** est évidente car P_1 est de degré 1, à coefficients entiers et de coefficient dominant égal à 1. De même, P_2 est de degré 2, à coefficients entiers et de coefficient dominant égal à 1.

Pour l'**hérédité**, soit n dans $\mathbb{N}$ tel que la proposition soit vraie aux rangs n et $n+1$. Alors pour tout z dans $\mathbb{C}$,

$$P_{n+2}(z) = zP_{n+1}(z) - P_n(z).$$

P_n est de degré n , P_{n+1} est de degré $n+1$ (par hypothèse de récurrence), donc $zP_{n+1}(z)$ est de degré $n+2$, degré strictement supérieur à celui de P_n . Donc le degré de $zP_{n+1}(z) - P_n(z)$ est égal à $n+2$.

De plus, P_{n+1} et P_n étant à coefficients entiers par hypothèse de récurrence, on en déduit que P_{n+2} aussi.

Son coefficient dominant est le coefficient devant z^{n+2} , qui est égal au coefficient devant z^{n+1} dans P_{n+1} , donc son coefficient dominant est égal à 1.

On a donc démontré l'hérédité et on en déduit le résultat par le principe de récurrence.

4. Cette question est indépendante des deux précédentes, elle sera juste utile pour la suite.

Soit Q un polynôme de coefficient dominant égal à 1, à coefficients entiers : on suppose qu'il existe $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{Z}^n$ tels que pour tout z dans $\mathbb{C}$, $Q(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0$.

Soit α une racine rationnelle de Q , disons $\alpha = \frac{p}{q}$ avec p et q premiers entre eux. Démontrer que $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Correction

On suppose que $Q(\alpha) = 0$, donc

$$\frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0.$$

En multipliant par q^n , on en déduit que

$$p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + a_{n-2}p^{n-2}q^2 + a_1pq^{n-1} + a_0q^n = 0.$$

Mais q divise $a_{n-1}p^{n-1}q + a_{n-2}p^{n-2}q^2 + a_1pq^{n-1} + a_0q^n$, donc q divise p^n . Comme p et q sont premiers entre eux, on en déduit, par applications successives du théorème de Gauss, que q divise p , puis que, n nécessairement, $q = 1$.

Donc α est un entier!

A-II. Cosinus rationnels

Soit désormais $r \in \mathbb{Q}$ vérifiant $\cos(r\pi) \in \mathbb{Q}$. On veut démontrer que $\cos(r\pi) = 0, \pm 1$ ou $-\frac{1}{2}$.

5. Démontrer alors qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ vérifiant $P_n(2 \cos(r\pi)) - 2 = 0$, où $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est la suite définie à la partie précédente.

Correction

Écrivons $r = \frac{p}{q}$ avec p dans $\mathbb{Z}$ et q dans $\mathbb{N}^*$. Alors en posant $n = 2q$, on obtient

$$P_n(2 \cos(r\pi)) = 2 \cos(nr\pi) = 2 \cos(2qr\pi) = 2 \cos(2p\pi) = 2.$$

Donc $P_n(2 \cos(r\pi)) - 2 = 0$.

6. En déduire que $2 \cos(r\pi) \in \{-2, -1, 1, 2\}$, puis en déduire le premier théorème de Niven :

$$\cos(r\pi) \in \mathbb{Q} \text{ si et seulement si } \cos(r\pi) = -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \text{ ou } 1.$$

Ces valeurs ($\pm 1, 0$ ou $\pm \frac{1}{2}$) sont-elle effectivement des valeurs atteintes en un réel de la forme $r\pi$ avec $r \in \mathbb{Q}$?

Correction

Par la question 4., comme $2 \cos(r\pi)$ est racine d'un polynôme à coefficients entiers et à coefficient dominant égal à 1, on en déduit que $2 \cos(r\pi)$ est entier. Comme $2 \cos(r\pi) \in [-2, 2]$, on en déduit que $\cos(r\pi) = -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}$ ou 1 . Réciproquement, si $\cos(r\pi)$ prend une de ces 5 valeurs, il est bien sûr rationnel!

Ces valeurs sont atteintes car

$$\cos(0\pi) = 1, \cos(\pi) = -1, \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \text{ et } \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2}.$$

A-III. Extension aux autres fonctions circulaires

On considère toujours r un rationnel (mais on ne suppose plus que $\cos(r\pi) \in \mathbb{Q}$).

7. **COURS** Exprimer $\sin(r\pi)$ comme le cosinus d'un angle. En déduire le second théorème de Niven

$$\sin(r\pi) \in \mathbb{Q} \text{ si et seulement si } \sin(r\pi) = -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \text{ ou } 1.$$

Ces valeurs ($\pm 1, 0$ ou $\pm \frac{1}{2}$) sont-elle effectivement des valeurs atteintes en un réel de la forme $r\pi$ avec $r \in \mathbb{Q}$?

Correction

Là, pour le coup, c'est quasi-immédiat. On sait que $\sin(r\pi) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - r\pi\right) = \cos(s\pi)$ en posant $s = \frac{1}{2} - r$.

Ainsi, si $\sin(r\pi)$ est rationnel, $\cos(s\pi)$ aussi, et donc $\cos(s\pi) \in \left\{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\right\}$.

Donc, comme $\sin(r\pi) = \cos(s\pi)$, $\sin(r\pi)$ est aussi dans cet ensemble !

La réciproque est immédiate.

Ces valeurs sont atteintes car

$$\sin(0\pi) = 0, \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1, \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \text{ et } \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

8. **COURS** Exprimer $\cos(2r\pi)$ à l'aide de $\tan(r\pi)$. En déduire le troisième théorème de Niven

$$\tan(r\pi) \in \mathbb{Q} \text{ si et seulement si } \tan(r\pi) = -1, 0 \text{ ou } 1.$$

Ces valeurs ($-1, 0$ ou 1) sont-elle effectivement des valeurs atteintes en un réel de la forme $r\pi$ avec $r \in \mathbb{Q}$?

Correction

Enfin, $\cos(2r\pi) = 2\cos(r\pi)^2 - 1 = \frac{2}{1 + \tan(r\pi)^2} - 1 = \frac{1 - \tan(r\pi)^2}{1 + \tan(r\pi)^2}$.

Ainsi, si $\tan(r\pi) \in \mathbb{Q}$, $\cos(2r\pi) \in \mathbb{Q}$, donc $\cos(2r\pi) = -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}$ ou 1 .

- Si $\cos(2r\pi) = 1$, alors en notant $t = \tan(r\pi)$, $1 - t^2 = 1 + t^2$ donc $t = 0$.
- Si $\cos(2r\pi) = -1$, alors $1 - t^2 = -1 - t^2$ donc $2 = 0$, absurde.
- Si $\cos(2r\pi) = 0$, alors $t^2 = 1$ donc $t = \pm 1$
- Si $\cos(2r\pi) = \frac{1}{2}$, alors $2(1 - t^2) = 1 + t^2$ donc $3t^2 = 1$ donc $t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, impossible car $t \in \mathbb{Q}$.
- Si $\cos(2r\pi) = -\frac{1}{2}$, alors $2(1 - t^2) = -1 - t^2$ donc $t^2 = 3$ donc $t = \pm\sqrt{3}$, impossible car $t \in \mathbb{Q}$.

Donc, finalement, $t \in \{-1, 0, 1\}$.

La réciproque est évidente.

Ces valeurs sont atteintes car

$$\tan(0) = 0, \tan\left(\frac{1}{4}\pi\right) = 1, \tan\left(-\frac{1}{4}\pi\right) = -1.$$

9. Soient r et s des rationnels. On suppose que $\text{Arctan}(r) = s\pi$. Démontrer que, nécessairement, il existe k dans $\mathbb{N}$ vérifiant $s = \frac{k}{4}$.

Correction

Si $\text{Arctan}(r) = s\pi$, alors $r = \tan(s\pi)$. Donc, par la question 8., $\text{Arctan}(r) = -1, 0$ ou 1 . Donc $\tan(s\pi) = -1, 0$ ou 1 , donc $s\pi \equiv \pm\frac{\pi}{4}[\pi]$ ou $s\pi \equiv 0[\pi]$. Dans tous les cas, on peut dire que

$$s\pi \equiv 0 \left[\frac{\pi}{4} \right], \text{ i.e. } \exists k \in \mathbb{Z}, s = \frac{k}{4}.$$

B. Une équation polynomiale

On considère l'équation suivante, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$(1 + iz)^n = (1 - iz)^n. \quad (1)$$

10. **EXO** Résoudre cette équation. On vérifiera que les solutions obtenues sont réelles.
On devra peut-être distinguer selon la parité de n .

Correction

Déjà, on remarque que $-i$ n'est pas solution. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$. Alors on a les équivalences

suivantes

$$\begin{aligned}(1 + iz)^n = (1 - iz)^n &\Leftrightarrow \left(\frac{1 + iz}{1 - iz}\right)^n \text{ car } 1 - iz \neq 0. \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket, \frac{1 + iz}{1 - iz} e^{\frac{2ik\pi}{n}} \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket, 1 + iz = e^{\frac{2ik\pi}{n}} - iz e^{\frac{2ik\pi}{n}} \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket, i(1 + e^{\frac{2ik\pi}{n}})z = e^{\frac{2ik\pi}{n}} - 1.\end{aligned}$$

Si n est impair, $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ n'est jamais égal à -1 , donc

$$\begin{aligned}(1 + iz)^n = (1 - iz)^n &\Leftrightarrow \exists k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket, z = \frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}} - 1}{i(1 + e^{\frac{2ik\pi}{n}})} \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket, z = \frac{e^{\frac{ik\pi}{n}} (e^{\frac{ik\pi}{n}} - e^{-\frac{ik\pi}{n}})}{ie^{\frac{ik\pi}{n}} (e^{-\frac{ik\pi}{n}} + e^{\frac{ik\pi}{n}})} \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket, z = \tan\left(\frac{k\pi}{n}\right).\end{aligned}$$

Si n est impair, l'ensemble des solutions est donc

$$\left\{ \tan\left(\frac{k\pi}{n}\right), k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket \right\}.$$

Au contraire, si n est pair, $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ est égal à 1 pour $k = n/2$. Ainsi, avec le même raisonnement que précédemment, si n est pair, l'ensemble des solutions est donc

$$\left\{ \tan\left(\frac{k\pi}{n}\right), k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket \text{ et } k \neq \frac{n}{2} \right\}.$$

11. Quand l'équation (1) a-t-elle des solutions rationnelles non nulles ?

Correction

Par le théorème de Niven, on sait que $\tan\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ est rationnel si et seulement si $\tan\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 0, 1$ ou -1 . 0 est, bien sûr, toujours solution de l'équation. Maintenant, il faut savoir à quelle condition 1 peut être solution de l'équation. On peut partir de $\tan\frac{k\pi}{n} = 1$ ou simplement remarquer que

$$(1 + i \times 1)^n = \sqrt{2}^n e^{n \frac{i\pi}{4}}$$

De même, $(1 - i)^n = \sqrt{2}^n e^{-n\frac{i\pi}{4}}$. Ainsi, on a les équivalences

$$\begin{aligned}(1 + i)^n = (1 - i)^n &\Leftrightarrow \sqrt{2}^n e^{n\frac{i\pi}{4}} = \sqrt{2}^n e^{-n\frac{i\pi}{4}} \\ &\Leftrightarrow e^{n\frac{i\pi}{2}} = 1 \\ &\Leftrightarrow n \equiv 0[4].\end{aligned}$$

De même, -1 est solution de l'équation si et seulement si $n \equiv 0[4]$. Ainsi,

- si $n \equiv 0[4]$, (1) possède 2 solutions rationnelles non nulles : 1 et -1 .
- sinon, comme les solutions de (1) sont des $\tan(r\pi)$ avec $r \in \mathbb{Q}$, et qu'elles ne peuvent pas être égales à 1 ou -1 , on en déduit, par le théorème de Niven, qu'elles ne sont pas rationnelles.

C. Approximation de π par des rationnels

Dans cette partie, nous établissons une jolie identité pour approcher π .

12. **COURS** Dessiner le graphe de la fonction Arctan, en précisant les asymptotes, les valeurs en 0, 1 et -1 .
13. Démontrer que pour tout n dans $\mathbb{N}$, pour tout x dans $\mathbb{R}$,

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + \frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)}}{1+x^2}$$

Correction

Dans l'égalité, il y a un terme que l'on sait calculer, c'est la somme !
Soit $n \in \mathbb{N}$, soit $x \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} &= \sum_{k=0}^n (-x^2)^k \\ &= \frac{1 - (-x^2)^{n+1}}{1 - (-x^2)} \text{ car } -x^2 \neq 1. \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)}}{1+x^2}. \end{aligned}$$

D'où le résultat désiré.

14. En déduire que pour tout n dans $\mathbb{N}$,

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx.$$

Correction

On intègre l'égalité précédente entre 0 et 1 :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + \frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx + \int_0^1 \frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx \text{ par linéarité.} \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \left[\frac{x^{2k+1}}{2k+1} \right]_0^1 + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{2k+1} + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx. \end{aligned}$$

15. Démontrer que pour tout n dans $\mathbb{N}$, pour tout x dans $[0, 1]$, $0 \leq \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} \leq x^{2(n+1)}$, et en déduire que $\frac{\pi}{4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

Correction

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $x \in [0, 1]$. Alors $1 + x^2 \geq 1$ donc

$$0 \leq \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} \leq x^{2(n+1)}.$$

En intégrant l'inégalité entre 0 et 1,

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx \leq \int_0^1 x^{2(n+1)} dx = \frac{1}{2(n+1)+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

On en déduit, par théorème d'encadrement, que $\int_0^1 \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi, $(-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On en déduit donc que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{2k+1} = \frac{\pi}{4} - (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2(n+1)}}{1+x^2} dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4}.$$

D. Entiers de Gauss

On appelle ensemble des entiers de Gauss l'ensemble appelé $\mathbb{Z}[i]$ et défini par

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib, (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

D-I. Un lemme préliminaire

16. **EXO** Soient $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ et $z = a + ib$. On note $\arg(z)$ l'argument principal de z . Montrer que $\arg(z) = \text{Arctan}\left(\frac{b}{a}\right)$.

Correction

C'est un exercice du cours! En notant $\theta = \arg(z)$, on sait que $\frac{b}{a} = \tan(\theta)$. De plus, comme $a > 0$, on sait que $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. On en déduit donc que $\theta = \text{Arctan}\left(\frac{b}{a}\right)$.

D-II. Propriétés algébriques

17. Démontrer que pour tous z et z' dans $\mathbb{Z}[i]$, $z - z'$, $z \times z'$ et $\bar{z}$ sont dans $\mathbb{Z}[i]$.

Correction

Soient z et z' dans $\mathbb{Z}[i]$. On note $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$, où $(a, b, a', b') \in \mathbb{Z}^4$. Alors

$$z - z' = (a - a') + i(b - b') \in \mathbb{Z}[i] \text{ car } a - a' \in \mathbb{Z} \text{ et } b - b' \in \mathbb{Z}.$$

De même,

$$z \times z' = (aa' - bb') + i(ab' + ba') \in \mathbb{Z}[i] \text{ car } aa' - bb' \in \mathbb{Z} \text{ et } ab' + ba' \in \mathbb{Z}.$$

Enfin, $\bar{z} = a - ib \in \mathbb{Z}[i]$.

On note, si $z = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$, $N(z) = a^2 + b^2$. Un élément z de $\mathbb{Z}[i]$ est dit inversible s'il existe z' dans $\mathbb{Z}[i]$ vérifiant $zz' = 1$.

18. Démontrer qu'un élément z de $\mathbb{Z}[i]$ est inversible si et seulement si $N(z) = 1$. En déduire l'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$.

Correction

- Soit z un élément de $\mathbb{Z}[i]$, inversible. Alors on dispose de $z' \in \mathbb{Z}[i]$ vérifiant $zz' = 1$. Or, $N(zz') = |zz'|^2 = |z|^2|z'|^2 = N(z)N(z')$. Donc $N(z)N(z') = 1$, mais $N(z)$ et $N(z')$ sont deux entiers naturels, donc le produit vaut 1 : ils sont donc tous deux égaux à 1.

Ainsi, $N(z) = 1$.

- Réciproquement, si $z \in \mathbb{Z}[i]$ et $N(z) = 1$, alors $|z|^2 = 1$, donc $z\bar{z} = 1$. Donc z est inversible d'inverse $\bar{z} \in \mathbb{Z}[i]$.

Soit alors z un élément inversible de $\mathbb{Z}[i]$. Écrivons $z = a + ib$.

Par ce que l'on vient de faire, $N(z) = 1$ donc $a^2 + b^2 = 1$. Mais a^2 et b^2 sont deux entiers naturels, donc, nécessairement,

- $a = \pm 1$ et $b = 0$, i.e. $z = \pm 1$
- ou bien $a = 0$ et $b = \pm 1$, i.e. $z = \pm i$.

Réciproquement, comme $1 \times 1 = 1$, comme $(-1) \times (-1) = 1$, comme $i \times (-i) = 1$ et $(-i) \times i = 1$, les quatre complexes $(1, -1, i, -i)$ sont bien inversibles dans $\mathbb{Z}[i]$.

L'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ est donc $\{1, -1, i, -i\}$.

19. Soit z un élément non nul de $\mathbb{Z}[i]$. On suppose qu'il existe n dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant $z^n \in \mathbb{R}$.

Démontrer que nécessairement, $\arg(z) \equiv 0 \left[\frac{\pi}{4} \right]$.

On pourra distinguer les cas $\Re(z) > 0$, $\Re(z) = 0$, $\Re(z) < 0$ et utiliser des résultats précédents.

Correction

Notons $a = \Re(z)$ et $b = \Im(z)$.

- Si $a = 0$, alors $b \neq 0$ et $\arg(z) \equiv 0 \left[\frac{\pi}{2} \right]$ donc $\arg(z) \equiv 0 \left[\frac{\pi}{4} \right]$.
- Si $a > 0$, alors $\arg(z) = \text{Arctan} \left(\frac{b}{a} \right)$. Mais comme $z^n \in \mathbb{R}$, $n\arg(z) \equiv 0[\pi]$, donc on dispose de $k \in \mathbb{Z}$ vérifiant

$$n\text{Arctan} \left(\frac{b}{a} \right) = k\pi$$

Par la question 9., on en déduit que $\frac{k}{n}$ est un multiple de $\frac{1}{4}$, donc $\text{Arctan} \left(\frac{b}{a} \right)$ est un multiple entier de $\frac{\pi}{4}$. Donc $\arg(z) \equiv 0 \left[\frac{\pi}{4} \right]$.

- Enfin, si $a < 0$, on remarque juste que $(-z)^n$ est aussi réel. Donc, par le même argument que précédemment, $\arg(-z) \equiv 0 \left[\frac{\pi}{4} \right]$, donc $\arg(z) \equiv 0 \left[\frac{\pi}{4} \right]$.

D-III. Propriétés géométriques

On va s'intéresser à l'existence de certaines figures que l'on peut tracer sur $\mathbb{Z}[i]$.

Angles entre des points de $\mathbb{Z}[i]$ Soient A, B et C trois points du plan, d'affixes respectives a, b et c **que l'on suppose distinctes et dans $\mathbb{Z}[i]$** . On suppose que l'angle $\widehat{ABC}$ est de la forme $r\pi$, où r est un nombre rationnel, et on veut montrer que $\widehat{ABC}$ est un multiple entier (relatif) de $\frac{\pi}{4}$.

On rappelle que toutes les transformations géométriques du type $z \mapsto \alpha z + \beta$, avec α dans $\mathbb{C}^*$ et β dans $\mathbb{C}$, sont des transformations qui préservent les angles.

- 20. COURS** On note τ l'application qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $z - b$. Quel type de transformation géométrique est τ ?
On note $A_1(a_1)$, $B_1(b_1)$ et $C_1(c_1)$ les images respectives de A, B et C par cette transformation. Dessiner les points A, B, C et A_1, B_1 et C_1 .

Correction

Par le cours, τ est la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $-b$. On est donc dans la situation suivante.

21. **COURS** On note φ l'application qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $\bar{a}_1 z$. Quel type de transformation géométrique est φ ?
 On note $A_2(a_2)$, $B_2(b_2)$ et $C_2(c_2)$ les images respectives de A_1 , B_1 et C_1 par cette transformation φ .
 Dessiner (sur le même dessin que la question 20. si possible!) les points A_2 , B_2 et C_2 .

Correction

Par le cours, on sait que la transformation $z \mapsto \bar{a}_1 z$ est ou bien l'identité si $\bar{a}_1 = 1$, ou bien la composée d'une homothétie de rapport $|a_1|$ de centre O et d'une rotation de centre O et d'angle $\arg(\bar{a}_1) = -\arg(a_1)$. On a la figure ci-dessus !

22. Justifier que $\arg(c_2) = r\pi[2\pi]$, et que $c_2 \in \mathbb{Z}[i]$.

Correction

On sait que $b_2 = 0$, que $a_2 = a_1 \bar{a}_1 = |a_1|^2$. Ainsi, une mesure de l'angle $\widehat{A_2 B_2 C_2}$ est

$$\arg\left(\frac{c_2 - b_2}{a_2 - b_2}\right) = \arg\left(\frac{c_2}{|a_1|^2}\right) = \boxed{\arg(c_2)}.$$

Mais comme les deux transformations que nous avons faites préservent les angles, on en déduit que $\boxed{\arg(c_2) \equiv r\pi[2\pi]}$.

Enfin, $\boxed{c_2 = \bar{a}_1 c_1 = (a - b)(c - b) \in \mathbb{Z}[i]}$.

23. En déduire qu'il existe k dans $\mathbb{Z}$ tel que $r\pi \equiv 0 \left[\frac{\pi}{4} \right]$.

Correction

On en déduit que, si $r = \frac{p}{q}$, $\arg(c_2^q) \equiv qr\pi[2\pi] \equiv p\pi[2\pi]$, donc $c_2^q \in \mathbb{R}$.

Par la question 19., on en déduit que $\arg(c_2) \equiv 0 \left[\frac{\pi}{4} \right]$, c'est-à-dire qu'il existe k dans

$\mathbb{Z}$ tel que $r\pi = k \frac{\pi}{4}$.

Polygones réguliers dans $\mathbb{Z}[i]$ On se demande désormais s'il existe des polygones réguliers dont les sommets sont des éléments de $\mathbb{Z}[i]$. On rappelle qu'un polygone est régulier si tous ses côtés sont de la même longueur. Il est alors inscrit dans un cercle.

Soit un tel polygone régulier à n côtés ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$), dont les sommets sont des éléments de $\mathbb{Z}[i]$. On note ses sommets $A_1, \dots, A_n$ (on tourne dans le sens trigonométrique).

24. Démontrer que si $i \in \llbracket 3, n \rrbracket$, alors l'angle $\widehat{A_1 A_i A_2}$ vaut $\frac{\pi}{2n}$ et conclure que $n = 4$.

Correction

Il faut dessiner !

Soit $i \in \llbracket 3, n \rrbracket$. Il faut se rappeler qu'un polygone régulier est inscrit dans un cercle. Par le lien entre angle inscrit et angle au centre, on sait que $\widehat{A_1 A_i A_2} = \frac{1}{2} \widehat{A_1 O A_2}$. Mais par le caractère régulier du polygone, $\widehat{A_1 O A_2} = \frac{2\pi}{n}$, donc $\widehat{A_1 A_i A_2} = \frac{\pi}{n}$.

Mais $\widehat{A_1 A_i A_2}$ est un angle formé par des éléments de $\mathbb{Z}[i]$, qui est un multiple rationnel de π , donc il est multiple entier de $\frac{\pi}{4}$. Donc, nécessairement, par la question 23. $n = 4$ (car $n \geq 3$).

25. Établir la réciproque du résultat prouvé précédemment.

Correction

Réciproquement, il existe bien des carrés à coefficients dans $\mathbb{Z}[i]$!