

TD 6 Intégration

1 Exercices corrigés en classe – calculs avancés

NB : comme il y a eu beaucoup d'exercices dans le poly de cours, ces exercices sont difficiles. C'est normal !

Exercice 1. Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$, ...

- en effectuant le changement de variables $t = \tan \frac{x}{2}$,
- en écrivant que $\frac{1}{\cos(x)} = \frac{\cos(x)}{\cos^2(x)} = \frac{\cos(x)}{1 - \sin^2(x)}$ (et en faisant éventuellement le changement de variables $y = \sin(x)$ si on ne voit pas d'intégration directe).

Exercice 2. *Lemme de Riemann-Lebesgue.* Soit f une fonction $\mathcal{C}^1$ sur un segment $[a, b]$. Démontrer que, si $\omega \in \mathbb{R}^*$,

$$\int_a^b f(t) \sin(n\omega t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Exercice 3. Représenter la fonction $x \mapsto \int_0^1 \max(x, t) dt$.

Exercice 4. Démontrer que la fonction $x \mapsto \int_0^1 \frac{e^t}{t+x} dt$ est dérivable et déterminer l'expression de sa dérivée.

Exercice 5. À l'aide d'un joli dessin, expliquer pourquoi la suite $\left(\int_0^{4\pi n} \frac{\sin(t)}{t} dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

2 Exercices à faire en TD

Exercice 6. *Calculs directs.* ●○○ - ●●○○ Calculer les intégrales ou primitives suivantes, sans utiliser ni IPP, ni changement de variable.

- | | |
|---|---|
| <p>1. $\int_{-2}^3 (y^2 - y + 4) dy,$</p> <p>3. $\int_{-x}^x \frac{1}{(3t+2)^2} dt,$</p> <p>5. $\int_{-x}^x \frac{1}{t \ln(t)} dt,$</p> <p>7. $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \sin(x) \cos(x) dx,$</p> <p>9. $\int_{-x}^x \tan^2(t) dt,$</p> <p>11. $\int_{-x}^x \frac{\sin(2\theta)}{1 + \cos^2(\theta)} d\theta$</p> | <p>2. $\int_0^2 x e^{-3x^2} dx,$</p> <p>4. $\int_1^4 \frac{\ln(t)}{t} dt,$</p> <p>6. $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \sin(x) dx,$</p> <p>8. $\int_{-1}^1 \operatorname{sh}(t) dt,$</p> <p>10. $\int_{-x}^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2} \operatorname{Arcsin}(t)},$</p> <p>12. $\int_{-x}^x \frac{dt}{\cos^2(t) \tan(t)}.$</p> |
|---|---|

Correction

Ici il s'agit toujours d'intégration directe !

$$1. \int_{-2}^3 y^2 - y + 4 dy = \left[\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + 4y \right]_{-2}^3 = 9 - \frac{9}{2} + 36 - \frac{-8}{3} + \frac{4}{2} - 4 \times (-2) = \frac{175}{6}$$

$$2. \int_0^2 x e^{-3x^2} dx = \left[\frac{e^{-3x^2}}{-6} \right]_0^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{6e^{12}}$$

$$3. \int^x \frac{1}{(3t+2)^2} dt = -\frac{1}{3(3x+2)}$$

$$4. \int_1^4 \frac{\ln(t)}{t} dt = \left[\frac{(\ln(t))^2}{2} \right]_1^4 = 2 \ln(2)^2$$

$$5. \int^x \frac{1}{t \ln(t)} dt = \ln |\ln(x)|$$

$$6. \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$7. \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \sin(x) \cos(x) dx = \left[\frac{\sin(x)^2}{2} \right]_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{8}$$

$$8. \int_{-1}^1 \operatorname{sh}(t) dt = [ch(t)]_{-1}^1 = 0$$

$$9. \int^x \tan^2(t) dt = \int^x 1 + \tan^2(t) - 1 dt = \tan(x) - x$$

Exercice 7. *Intégration par parties.* ●○○ - ●●○ Calculer les intégrales suivantes, en utilisant une intégration par parties.

$$1. \int_0^2 t e^t dt,$$

$$2. \int_1^2 \ln \frac{t-1}{t+1} dt,$$

$$3. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\theta}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$4. \int^x t^2 e^t dt,$$

$$5. \int_0^y \ln(1+x^2) dx,$$

$$6. \int^x \operatorname{Arcsin}(t) dt,$$

$$7. \int^x t \operatorname{ch}(t) dt,$$

$$8. \int_0^1 e^{2t} \cos(t) dt.$$

Correction

1. Pour calculer

$$\int_0^2 t e^t dt,$$

Posons $u(t) = t$, $v'(t) = e^t$. Donc $u'(t) = 1$, $v(t) = e^t$. Donc, par intégration par parties,

$$\int_0^2 t e^t dt = [t e^t]_0^2 - \int_0^2 e^t dt = 2e^2 - e^2 + 1 = e^2 + 1.$$

2. Pour calculer

$$\int t^2 e^t dt,$$

Posons $u(t) = t^2$, $v'(t) = e^t$. Donc $u'(t) = 2t$, $v(t) = e^t$. Donc, par intégration par parties,

$$\int t^2 e^t dt = t^2 e^t - 2 \int t e^t dt.$$

Puis on fait une deuxième intégration par parties, en posant $u(t) = t$, $v'(t) = e^t$, donc $u'(t) = 1$ et $v(t) = e^t$. D'où

$$\int t^2 e^t dt = t^2 e^t - 2te^t + 2 \int e^t dt = e^t(t^2 - 2t + 2).$$

3. On pose $u(\theta) = \theta$, donc $u'(\theta) = 1$ et $v(\theta) = \tan(\theta)$ donc $v'(\theta) = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$. Ainsi, par IPP,

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\theta}{\cos^2(\theta)} d\theta = [\theta \tan(\theta)]_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan(\theta) d\theta = \frac{\sqrt{3}\pi}{3} - [-\ln(\cos(\theta))]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \ln(2).$$

4. On pose $u'(s) = 1$, $v(s) = \text{Arcsin}(s)$, alors $u(s) = s$ et $v'(s) = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}}$ donc

$$\int^x \text{Arcsin}(s) ds = x \text{Arcsin}(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = x \text{Arcsin}(x) + \sqrt{1-x^2}.$$

5. Posons $u(x) = x$, $v'(x) = \text{ch}(x)$. Alors $u'(x) = 1$, $v(x) = \text{sh}(x)$. Donc, par IPP,

$$\int x \text{ch}(x) dx = x \text{sh}(x) - \int \text{sh}(x) dx = x \text{sh}(x) - \text{ch}(x).$$

6. Posons $u(t) = e^{2t}$, $v'(t) = \cos(t)$, alors $u'(t) = 2e^{2t}$ et $v(t) = \sin(t)$. Donc

$$I = \int_0^1 e^{2t} \cos(t) dt = [e^{2t} \sin(t)]_0^1 - \int_0^1 2e^{2t} \sin(t) dt.$$

Dans la deuxième intégrale, on pose $u(t) = e^{2t}$ et $v'(t) = -\sin(t)$. Alors $u'(t) = 2e^{2t}$ et $v(t) = \cos(t)$ donc

$$I = e^2 \sin(1) + [2e^{2t} \cos(t)]_0^1 - \int_0^1 4e^{2t} \cos(t) dt = e^2 \sin(1) + 2e^2 \cos(1) - 2 - 4I,$$

$$\text{donc } 5I = e^2 \sin(1) + 2e^2 \cos(1) \text{ donc } I = \frac{e^2}{5} \sin(1) + \frac{2}{5} e^2 \cos(1) - \frac{2}{5}.$$

Exercice 8. *Changement de variable.* ●○○ - ●●○ Calculer les intégrales suivantes, en effectuant des changements de variable adéquats.

1. $\int_1^x \frac{dt}{t + \sqrt{t}},$

3. $\int_1^y \frac{1}{\text{ch}(t)} dt,$

5. $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin(t) + \cos(t)} dt,$

2. $\int_2^y \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx, \text{ où } y > 1,$

4. $\int_{-1}^1 \theta^2 \sqrt{1-\theta^2} d\theta,$

6. $\int^x \sqrt{e^t - 1} dt.$

Correction

1. Pour calculer $\int^x \frac{dt}{t + \sqrt{t}}$, effectuons un changement de variables :

- Posons $u = \sqrt{t}$. Alors $t = u^2$.
- $\frac{1}{t + \sqrt{t}} = \frac{1}{u^2 + u}$
- $\frac{dt}{du} = 2u$ donc $dt = 2u du$
- Donc $\int^x \frac{dt}{t + \sqrt{t}} = \int^{\sqrt{x}} \frac{2u}{u^2 + u} du = \int^{\sqrt{x}} \frac{2}{1 + u} = 2 \ln(1 + \sqrt{x})$.

2. Effectuons un changement de variables.

- Posons $u = \sqrt{x-1}$. Alors $x = u^2 + 1$.
- Quand $x = 2$, $u = 1$. Quand $x = y$, $u = \sqrt{y-1}$.
- $\frac{x}{\sqrt{x-1}} = \frac{u^2 + 1}{u}$.
- $x = u^2 + 1$ donc $dx = 2u du$.

Donc

$$\begin{aligned} \int_2^y \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx &= \int_1^{\sqrt{y-1}} \frac{u^2 + 1}{u} 2u du = 2 \int_1^{\sqrt{y-1}} u^2 + 1 du \\ &= 2 \left[\frac{u^3}{3} + u \right]_1^{\sqrt{y-1}} = \frac{\sqrt{y-1}^3}{3} + \sqrt{y-1} - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \end{aligned}$$

3. Pour calculer $\int_1^y \frac{1}{\text{ch}(t)} dt$, effectuons un changement de variables.

- Posons $s = e^t$.
- Quand $t = 1$, $s = e$. Quand $t = y$, $s = e^y$.
- $\frac{1}{\text{ch}(t)} = \frac{2}{e^t + e^{-t}} = \frac{2}{s + \frac{1}{s}}$.
- $y = \ln(s)$ donc $dy = \frac{ds}{s}$.

Comment peut-on penser à ce changement de variables ? Déjà on essaie de poser $\text{ch}(t)$ comme nouvelle variable, et on voit que ça n'aboutit à rien. Du coup on décompose $\text{ch}(t)$ pour voir si un de ses « morceaux » peut être la nouvelle variable : c'est le cas !
Donc

$$\begin{aligned} \int_1^y \frac{1}{\text{ch}(t)} dt &= \int_e^{e^y} \frac{2}{s + \frac{1}{s}} \frac{ds}{s} \\ &= \int_e^{e^y} \frac{2}{s^2 + 1} ds \\ &= 2\text{Arctan}(e^y) - 2\text{Arctan}(e). \end{aligned}$$

4. Pour calculer $\int_{-1}^1 \theta^2 \sqrt{1 - \theta^2} d\theta$, effectuons le changement de variables suivant

- posons $\theta = \sin(x)$, i.e. $x = \text{Arcsin}(\theta)$. (en cours on a fait avec cos, donc je change !)
- quand $\theta = -1$, $x = -\frac{\pi}{2}$. Quand $\theta = 1$, $x = \frac{\pi}{2}$.

- $\theta^2 \sqrt{1 - \theta^2} = \sin^2(x) \sqrt{1 - \sin^2(x)}$. Or, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right]$, donc $\cos(x) \geq 0$, donc $\sqrt{1 - \sin^2(x)} = \cos(x)$. Donc

$$\theta^2 \sqrt{1 - \theta^2} = \sin^2(x) \cos(x)$$

- $\theta = \sin(x)$, donc $d\theta = \cos(x)dx$.

Comment penser à ce changement de variables ? Là, c'est la formule $\sin^2 + \cos^2 = 1$ qui doit résonner dans votre tête quand vous voyez $\sqrt{1 - \theta^2}$!

Donc

$$\int_{-1}^1 \theta^2 \sqrt{1 - \theta^2} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos^2(x) dx.$$

Or, $\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$, donc

$$\sin^2(x) \cos^2(x) = \frac{1}{4} \sin^2(2x) = \frac{1}{8} (1 - \cos(4x)).$$

Donc

$$\int_{-1}^1 \theta^2 \sqrt{1 - \theta^2} d\theta = \frac{1}{8} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 - \cos(4x) dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{8} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(4x) dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{32} [\sin(4x)]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{8}$$

5. Pour calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin(t) + \cos(t)} dt$, effectuons le changement de variables suivant

- $u = \tan(t/2)$, donc $t = 2\text{Arctan}(u)$.
- quand $t = 0$, $u = 0$; quand $t = \frac{\pi}{2}$, $u = 1$.
- On sait que $\cos(t) = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}$ et que $\sin(t) = \frac{2u}{1 + u^2}$, donc

$$\frac{1}{\sin(t) + \cos(t)} = \frac{1}{\frac{2u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2}} = \frac{1+u^2}{1+2u-u^2}$$

- $t = 2\text{Arctan}(u)$ donc $dt = \frac{2du}{1+u^2}$.

Donc

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin(t) + \cos(t)} dt = \int_0^1 \frac{1+u^2}{1+2u-u^2} \frac{2du}{1+u^2} = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+2u-u^2} du.$$

Or, $1 + 2u - u^2 = -(u - 1 - \sqrt{2})(u - 1 + \sqrt{2})$, donc

$$\frac{1}{1+2u-u^2} = -\frac{1}{(u-1-\sqrt{2})(u-1+\sqrt{2})} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{u-1+\sqrt{2}} - \frac{1}{u-1-\sqrt{2}} \right),$$

donc

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin(t) + \cos(t)} dt &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \left(\frac{1}{u-1+\sqrt{2}} - \frac{1}{u-1-\sqrt{2}} \right) du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left[\ln(u-1+\sqrt{2}) \right]_0^1 - \left[\ln(u-1-\sqrt{2}) \right]_0^1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\ln(\sqrt{2}) - \ln(\sqrt{2}-1) - \ln(\sqrt{2}) + \ln(1+\sqrt{2}) \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} \right) \end{aligned}$$

Pour info, $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \text{Argth}(x)$, mais c'est totalement hors programme.

Exercice 9. *Orthogonalité des fonctions trigonométriques.* ●●○ Déterminer, en fonction de la valeur de m et n entiers, la valeur de l'intégrale

$$I_{m,n} = \int_0^{2\pi} \cos(mt) \cos(nt) dt.$$

Correction

Il faut pour cet exercice écrire $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$. Donc

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos((m+n)t) + \cos((m-n)t)) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos((m+n)t) dt + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos((m-n)t) dt. \end{aligned}$$

Or,

$$\int_0^{2\pi} \cos(\alpha t) dt = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha \neq 0 \\ 2\pi & \text{sinon} \end{cases}$$

Donc

$$I_{m,n} = \begin{cases} 0 & \text{si } m+n \neq 0 \text{ et } m-n \neq 0 \\ \pi & \text{si } m+n = 0 \text{ et } m-n \neq 0 \\ \pi & \text{si } m-n = 0 \text{ et } m+n \neq 0 \\ 2\pi & \text{si } m+n = 0 \text{ et } m-n = 0, \text{ i.e. } m = n = 0. \end{cases}$$

Exercice 10. ●●○ Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout x de $[a, b]$, $f(a+b-x) = f(x)$.

1. Interpréter l'égalité en termes de graphe de f .

Correction

Cela signifie que le graphe de f a pour axe de symétrie la droite d'équation $x = \frac{a+b}{2}$.

2. Montrer que

$$\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

Correction

Appelons I l'intégrale $\int_a^b x f(x) dx$. Effectuons dans cette intégrale le changement de variables $y = a+b-x$. Alors quand $x = a$, $y = b$ et quand $x = b$, $y = a$. Ensuite, $x f(x) = (a+b-y) f(a+b-y) = (a+b-y) f(y)$. Ensuite, $dx = -dy$. Donc

$$I = \int_b^a (a+b-y) f(y) (-dy) = \int_a^b (a+b-y) f(y) dy = \int_a^b (a+b) f(y) dy - \int_a^b y f(y) dy = (a+b) \int_a^b f(y) dy - I,$$

$$\text{donc } 2I = (a+b) \int_a^b f(y) dy \text{ donc } I = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(y) dy.$$

3. Application : calculer

$$\int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx.$$

Correction

On remarque que si on pose $f : x \mapsto \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)}$, alors pour tout x , $f(\pi - x) = \frac{\sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} = \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)}$, donc, d'après le lemme précédent,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx \\ &= \frac{\pi}{2} [-\text{Arctan}(\cos(x))]_0^\pi = \frac{\pi}{2} (-\text{Arctan}(-1) + \text{Arctan}(1)) = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

Exercice 11. ●●○ Pour tous entiers naturels n et p on pose

$$I_{n,p} = \int_0^1 t^n (1-t)^p dt.$$

1. Montrer que pour tout n non nul et pour tout p entier,

$$I_{n,p} = \frac{n}{p+1} I_{n-1,p+1}.$$

Correction

Soient n non nul et p dans $\mathbb{N}$. Posons, dans $I_{n,p}$, $u(t) = t^n$ et $v'(t) = (1-t)^p$. Alors $u'(t) = nt^{n-1}$ et $v(t) = -\frac{1}{p+1}(1-t)^{p+1}$. Donc, par intégration par parties,

$$I_{n,p} = \left[t^n \frac{1}{p+1} (1-t)^{p+1} \right]_0^1 - \int_0^1 nt^{n-1} \frac{(-1)}{p+1} (1-t)^{p+1} dt = \frac{n}{p+1} I_{n-1,p+1},$$

d'où le résultat.

2. En déduire une expression de $I_{n,p}$ pour tous n et p entiers.

Correction

Je ne fais pas les récurrences, mais on montre par récurrence sur n que pour tout n et p , $I_{n,p} = \frac{n!}{(p+1)(p+2)\dots(p+n)} I_{0,p+n} = \frac{n!}{(p+1)(p+2)\dots(p+n+1)} = \frac{n!p!}{(p+n+1)!}$.

Exercice 12. ●●● Calculer, pour tout n dans $\mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} dx$.

Correction

Effectuons une IPP, avec $u(x) = x^n$ et $v'(x) = \sqrt{1-x}$. Alors $u'(x) = nx^{n-1}$ et $v(x) = -\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}}$. Alors

$$\begin{aligned} I_n &= \left[x^n \frac{-2}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 + \int_0^1 nx^{n-1} \frac{2}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{2n}{3} \int_0^1 x^{n-1} (1-x) \sqrt{1-x} dx \\ &= \frac{2n}{3} (I_{n-1} - I_n), \end{aligned}$$

donc $3I_n = 2nI_{n-1} - 2nI_n$, i.e. $I_n = \frac{2n}{2n+3} I_{n-1}$. En poursuivant, on obtient

$$I_n = \frac{2n(2n-2) \dots 2}{(2n+3)(2n+1) \dots 5} I_0 = \frac{2^n n!}{(2n+3)(2n+1) \dots 3}.$$

Exercice 13. Une suite d'intégrales – extrait DS 2020-2021. ●●○ Pour tout k dans $\mathbb{N}^*$, on note φ_k la fonction

$$\varphi_k : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \int_0^x \frac{dt}{\operatorname{ch}^k(t)} \end{cases}$$

On admet l'existence de $\varphi_k(x)$ pour tout k de $\mathbb{N}^*$ et pour tout x de $\mathbb{R}$ étant donné que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $t \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}^k(t)}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $\varphi_1(x)$ et $\varphi_2(x)$, pour x fixé.

Correction

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= \int_0^x \frac{dt}{\operatorname{ch}(t)} = 2 \int_0^x \frac{dt}{e^t + e^{-t}} = 2 \int_0^x \frac{e^t}{1 + (e^t)^2} dt \\ &= 2[\operatorname{Arctan}(e^t)]_0^x = \boxed{2\operatorname{Arctan}(e^x) - \frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

Tiens, tiens, on reconnaît le gudermannien... souvenirs !

Ensuite, on rappelle que $\operatorname{th}' = \frac{\operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2}{\operatorname{ch}^2} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2}$, donc

$$\varphi_2(x) = \int_0^x \frac{dt}{\operatorname{ch}^2(t)} = [\operatorname{th}(t)]_0^x = \operatorname{th}(x).$$

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \varphi_{k+2}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{(k+1)\operatorname{ch}^{k+1}(x)} + \frac{k}{k+1} \varphi_k(x).$$

Correction

(Étant donnée l'indication, partons de $\varphi_k(x)$) **Soit** k dans $\mathbb{N}^*$. Alors

$$\varphi_k(x) = \int_0^x \frac{1}{\operatorname{ch}^k(t)} dt = \frac{\operatorname{ch}(t)}{\operatorname{ch}^{k+1}(t)}.$$

Posons $u'(t) = \operatorname{ch}(t)$, alors $u(t) = \operatorname{sh}(t)$, et $v(t) = \frac{1}{\operatorname{ch}^{k+1}(t)}$, alors $v'(t) = -(k+1)\frac{\operatorname{sh}(t)}{\operatorname{ch}^{k+2}(t)}$. Donc, par intégration par parties,

$$\begin{aligned} \varphi_k(x) &= \left[\operatorname{sh}(t) \frac{1}{\operatorname{ch}^{k+1}(t)} \right] + \int_0^x \operatorname{sh}(t)(k+1) \frac{\operatorname{sh}(t)}{\operatorname{ch}^{k+2}(t)} dt \\ &= \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^{k+1}(x)} + (k+1) \int_0^x \frac{\operatorname{sh}^2(t)}{\operatorname{ch}^{k+2}(t)} dt \\ &= \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^{k+1}(x)} + (k+1) \int_0^x \frac{\operatorname{ch}^2(t) - 1}{\operatorname{ch}^{k+2}(t)} dt \\ &= \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^{k+1}(x)} + (k+1) \int_0^x \frac{1}{\operatorname{ch}^k(t)} dt - (k+1) \int_0^x \frac{-1}{\operatorname{ch}^{k+2}(t)} dt \\ &= \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^{k+1}(x)} + (k+1)\varphi_k(x) - (k+1)\varphi_{k+2}(x), \end{aligned}$$

donc

$$-k\varphi_k(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^{k+1}(x)} - (k+1)\varphi_{k+2}(x),$$

donc

$$\varphi_{k+2}(x) = \frac{1}{k+1} \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^{k+1}(x)} + \frac{k}{k+1} \varphi_k(x)$$

3. En déduire les valeurs de $\varphi_3(x)$ et $\varphi_4(x)$.

Correction

On en déduit que

$$\varphi_3(x) = \varphi_{1+2}(x) = \frac{1}{2} \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^2(x)} + \operatorname{Arctan}(e^x) - \frac{\pi}{4},$$

et

$$\varphi_4(x) = \frac{1}{3} \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}^3(x)} + \frac{2}{3} \operatorname{th}(x).$$

Étude des fonctions φ_k Dans cette partie, k est un entier naturel non nul fixé.

4. Démontrer que φ_k est impaire.

Correction

Soit x dans $\mathbb{R}$. Alors

$$\varphi_k(-x) = \int_0^{-x} \frac{dt}{\operatorname{ch}^k(t)}.$$

Posons $s = -t$. Alors quand $t = 0$, $s = 0$ et quand $t = -x$, $s = x$.

Ensuite $\frac{1}{\text{ch}(t)} = \frac{1}{\text{sh}(-s)} = \frac{1}{\text{sh}(s)}$.

Enfin, $\frac{dt}{ds} = -1$ donc $dt = -ds$. Donc

$$\varphi_k(-x) = - \int_0^x \frac{ds}{\text{ch}(s)} = -\varphi_k(x).$$

Donc φ_k est impaire.

5. On admet la dérivabilité de φ_k . Calculer, pour tout x de $\mathbb{R}$, $\varphi'_k(x)$ et en déduire le sens de variation de φ_k sur $\mathbb{R}$. En déduire son signe sur $\mathbb{R}$.

Correction

Par définition, $x \mapsto \int_0^x \frac{1}{\text{ch}^k(t)} dt$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\text{ch}^k(x)}$ donc la dérivée de

φ_k est $x \mapsto \frac{1}{\text{ch}^k(x)} \geq 0$, positive de $\mathbb{R}$, donc φ_k est croissante sur $\mathbb{R}$.

On vient de voir que φ_k est croissante et $\varphi_k(0) = 0$ donc φ_k est négative sur $\mathbb{R}_-$ et positive sur $\mathbb{R}_+$.

6. Démontrer que φ_1 et φ_2 ont des limites en $+\infty$, et les déterminer.

Correction

On sait que $\varphi_1 : x \mapsto 2\text{Arctan}(e^x) - \frac{\pi}{2}$. Or, $e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $\text{Arctan}(y) \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$ donc

$$\varphi_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

De plus, $\varphi_2(x) = \text{th}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$. D'où les deux limites demandées.

7. En utilisant la question 2., démontrer que pour tout k dans $\mathbb{N}^*$, $\varphi_k(x)$ admet une limite quand x tend vers $+\infty$.

Correction

Soit pour tout k dans $\mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}_k$ la proposition « $\varphi_k(x)$ converge quand $x \rightarrow +\infty$. »
Démontrons $(\mathcal{P}_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ par récurrence double sur k .

Initialisation. $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont vraies par la question précédente.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}_k$ et $\mathcal{P}_{k+1}$ vraies pour un certain rang k . Alors $\varphi_k(x)$ a une limite quand x tend vers $+\infty$. Or, pour tout x ,

$$\varphi_{k+2}(x) = \frac{1}{k+1} \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}^{k+1}(x)} + \frac{k}{k+1} \varphi_k(x),$$

Or, $\text{sh}(x) \leq \frac{e^x}{2}$ et $\text{ch}(x) \geq \frac{e^x}{2}$, donc $\frac{1}{\text{ch}^{k+1}(x)} \leq \frac{2^{k+1}}{e^{(k+1)x}}$, donc pour tout $x \geq 0$,

$$0 \leq \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}^{k+1}(x)} \leq \frac{2^k}{e^{kx}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0,$$

donc, par encadrement, $\frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}^{k+1}(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Comme $\varphi_k(x)$ possède une limite finie quand x tend vers $+\infty$, cela démontre que $\varphi_{k+2}(x)$ possède une limite finie quand x

tend vers $+\infty$.
D'où l'hérédité, et le résultat par le principe de récurrence.

On note, pour tout k dans $\mathbb{N}^*$, $I_k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_k(x)$.

8. Toujours en utilisant la question 2., démontrer que pour tout k dans $\mathbb{N}^*$, $I_{k+2} = \frac{k}{k+1} I_k$.

Correction

Soit k dans $\mathbb{N}^*$. Par 2., pour tout x ,

$$\varphi_{k+2}(x) = \frac{1}{k+1} \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}^{k+1}(x)} + \frac{k}{k+1} \varphi_k(x),$$

Comme on a vu que $\frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}^{k+1}(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, on en déduit que $I_{k+2} = \frac{k}{k+1} I_k$.

9. Soit la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ définie par : $\forall k \in \mathbb{N}^*, a_k = k I_k I_{k+1}$. Démontrer que $(a_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est constante et préciser la valeur de cette constante.

Correction

Soit k dans $\mathbb{N}^*$. Alors

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= (k+1) I_{k+2} I_{k+1} \\ &= (k+1) \frac{k}{k+1} I_k I_{k+1} \text{ par la question précédente} \\ &= (k+1) I_{k+1} I_k = a_k, \end{aligned}$$

donc $(a_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est constante, égale à $a_1 = 2 I_0 I_1 = \pi$.

10. Déterminer, pour tout $k \geq 1$, les valeurs de I_{2k} et I_{2k+1} .

Correction

Démontrons par récurrence que pour tout k dans $\mathbb{N}^*$, la proposition $\mathcal{Q}_k : I_{2k} = \frac{4^k (k!)^2}{(2k)!(2k)}$ est vraie.

Initialisation. $I_2 = 1 = \frac{4^1 (1!)^2}{(2)!(2 \times 1)}$, donc l'initialisation est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{Q}_k$ vraie pour un certain rang k . Alors, par la question 8.,

$$\begin{aligned} I_{2(k+2)} &= I_{2k+2} = \frac{2k}{2k+1} I_{2k} \\ &= \frac{2k}{2k+1} \frac{4^k (k!)^2}{(2k)!(2k)} \\ &= \frac{4^k (k!)^2}{(2k+1)!} \\ &= \frac{4(k+1)^2}{(2k+2)(2k+2)} \frac{4^k (k!)^2}{(2k+1)!} \\ &= \frac{4^{k+1} ((k+1)!)^2}{(2(k+1))!(2(k+1))}, \end{aligned}$$

d'où l'hérédité, et, par le principe de récurrence, le résultat.
Soit alors k dans $\mathbb{N}$. Alors

$$(2k)I_{2k}I_{2k+1} = \pi,$$

donc

$$I_{2k+1} = \frac{\pi}{2kI_{2k}} = \frac{(2k)!(2k)}{2k4^k(k!)^2} \pi = \boxed{\frac{(2k)!}{4^k(k!)^2} \pi}$$

Exercice 14. ●●○ Notre but est de calculer l'intégrale suivante : $I = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\cos^2(t)}{\cos(2t)} dt$.

1. Montrer que cette intégrale est positive.

Correction

Pour tout x dans $[0, \pi/8]$, $\cos^2 t \geq 0$. Donc $\frac{\cos^2(t)}{\cos(2t)} \geq 0$, donc $I \geq 0$.

On pose $J = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\sin^2(t)}{\cos(2t)} dt$.

2. Calculer $I - J$.

Correction

On calcule

$$\begin{aligned} I - J &= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\cos^2(t)}{\cos(2t)} dt - \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\sin^2(t)}{\cos(2t)} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\cos^2(t) - \sin^2(t)}{\cos(2t)} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\cos(2t)}{\cos(2t)} dt = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

3. Calculer $I + J$.

Correction

$$I + J = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\cos^2(t)}{\cos(2t)} dt + \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\sin^2(t)}{\cos(2t)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{\cos^2(t) + \sin^2(t)}{\cos(2t)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{1}{\cos(2t)} dt.$$

Posons maintenant $s = \tan(t)$! Alors

- quand $t = 0$ $s = 0$; quand $t = \frac{\pi}{8}$, $\tan(t) = \tan(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$
- $\frac{1}{\cos(2t)} = \frac{1+s^2}{1-s^2}$.
- $t = \text{Arctan}(s)$ donc $dt = \frac{ds}{1+s^2}$

Donc

$$\begin{aligned} I + J &= \int_0^{\sqrt{2}-1} \frac{1+s^2}{1-s^2} \frac{ds}{1+s^2} \\ &= \int_0^{\sqrt{2}-1} \frac{ds}{1-s^2} \\ &= \int_0^{\sqrt{2}-1} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-s} + \frac{1}{1+s} \right) ds \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}-1} \frac{1}{1-s} ds + \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}-1} \frac{1}{1+s} ds \\ &= -\frac{1}{2} (\ln(2-\sqrt{2}) - \ln(1)) + \frac{1}{2} (\ln(\sqrt{2}) - \ln(1)) \\ &= -\frac{1}{2} \ln((2-\sqrt{2})(\sqrt{2})) \\ &= -\frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}-1). \end{aligned}$$

4. En déduire la valeur de I.

Correction

On en déduit que $I = \frac{I - J + I + J}{2} = \frac{\pi}{16} + -\frac{1}{4} \ln(\sqrt{2}-1)$.

Exercice 15. ●●○ Soit $\omega = a + ib$ un complexe, (a, b réels). Déterminer une primitive de

$$t \mapsto \frac{1}{t - \omega}.$$

Correction

Écrivons

$$\begin{aligned} \frac{1}{t - \omega} &= \frac{1}{t - a - ib} \\ &= \frac{t - a + ib}{(t - a)^2 + b^2} \\ &= \frac{t - a}{(t - a)^2 + b^2} + ib \frac{1}{(t - a)^2 + b^2}. \end{aligned}$$

Une primitive de $t \mapsto \frac{t - a}{(t - a)^2 + b^2}$ est

$$\frac{1}{2} \ln((t - a)^2 + b^2) = \ln \sqrt{(t - a)^2 + b^2} = \ln |t - \lambda|,$$

avec $\lambda = a + ib = \omega$. Reste à déterminer une primitive de $t \mapsto b \frac{1}{(t-a)^2 + b^2}$. On peut s'en sortir en calculant

$$\int_0^x b \frac{1}{(t-a)^2 + b^2} dt,$$

mais ici il y a plus simple si on utilise l'énoncé ! Dérivons $g : t \mapsto \operatorname{Arctan} \left(\frac{t-a}{b} \right)$:

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{1}{b} \frac{1}{1 + \left(\frac{t-a}{b} \right)^2} \\ &= \frac{1}{b} \frac{b^2}{(t-a)^2 + b^2} \\ &= \frac{b}{(t-a)^2 + b^2}. \end{aligned}$$

d'où le résultat !

Exercice 16. *Lemme de Riemann-Lebesgue.* ●●● Soient a et b deux réels, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction dérivable, de dérivée continue. Montrer que

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \left| \int_a^b f(t) e^{i\lambda t} dt \right| = 0.$$

On pourra effectuer une intégration par parties.

Correction

Exprimons $\int_a^b e^{it\lambda} f(t) dt$ d'une autre manière en effectuant une intégration par parties, avec

$$\begin{aligned} u(t) &= f(t), \quad u'(t) = f'(t), \\ v'(t) &= e^{it\lambda}, \quad v(t) = \frac{1}{i\lambda} e^{it\lambda}. \end{aligned}$$

On obtient donc, par intégration par parties,

$$\begin{aligned} \int_a^b e^{it\lambda} f(t) dt &= \left[f(t) \frac{1}{i\lambda} e^{it\lambda} \right]_a^b - \int_a^b f'(t) \frac{1}{i\lambda} e^{it\lambda} dt \\ &= \frac{f(b) e^{ib\lambda}}{i\lambda} - \frac{f(a) e^{ia\lambda}}{i\lambda} - \frac{1}{i\lambda} \int_a^b f'(t) e^{it\lambda} dt. \end{aligned}$$

Maintenant, étant donné que

$$|e^{i\omega}| = 1 \text{ pour tout réel } \omega,$$

on a

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \left| \frac{f(a) e^{ia\lambda}}{i\lambda} \right| = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{|f(a)|}{|\lambda|} = 0.$$

De même,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \left| \frac{f(b) e^{ib\lambda}}{i\lambda} \right| = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{|f(b)|}{|\lambda|} = 0.$$

Finalement,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{i\lambda} \int_a^b f'(t) e^{it\lambda} dt \right| &\leq \frac{1}{|\lambda|} \left| \int_a^b f'(t) e^{it\lambda} dt \right| \\ &\leq \frac{1}{|\lambda|} \int_a^b |f'(t) e^{it\lambda}| dt \\ &\leq \frac{1}{|\lambda|} \int_a^b |f'(t)| dt. \end{aligned}$$

Comme f' est continue, $\int_a^b |f'(t)| dt$ est un nombre réel fini, et

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{1}{|\lambda|} \int_a^b |f'(t)| dt = 0.$$

Donc, par le théorème d'encadrement,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{1}{i\lambda} \int_a^b f'(t) e^{it\lambda} dt = 0.$$

Finalement, on en déduit que

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b e^{it\lambda} f(t) dt = 0.$$

Indications. Pour cette feuille de TD, quelques indications, mais surtout, ensuite, les réponses brutes des calculs d'intégrale !

8 Voici des changements de variables à poser :

1. $s = \sqrt{t}$
2. $u = \sqrt{x-1}$
3. $s = e^t$
4. $\theta = \sin(x)$
5. Poser $u = \tan(t/2)$ et remarquer que

$$\frac{1}{1+2u-u^2} = -\frac{1}{(u-1-\sqrt{2})(u-1+\sqrt{2})} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{u-1+\sqrt{2}} - \frac{1}{u-1-\sqrt{2}} \right),$$

(passage délicat)

9 Linéariser le produit de sinus.

10 1.

2. Effectuer le changement de variables $y = a + b - x$.
- 3.

12 Poser $u(x) = x^n$ et $v'(x) = \sqrt{1-x}$.

14 1. Utiliser la propriété du cours qui parle d'intégrales positives.

2. Développer $\cos(2t)$.

3. Poser $s = \tan(t)$.

4. Remarquer que $I = \frac{I - J + I + J}{2}$

15 Utiliser la quantité conjuguée au dénominateur, puis faire apparaître ou bien du $\ln$, ou bien de l'arctangente. **Attention !** Une primitive de $t \mapsto \frac{1}{t+i}$ **n'est pas** $t \mapsto \ln|t+i|$!

16 Effectuer une intégration par parties, avec $u(t) = f(t)$ et $v'(t) = e^{it\lambda}$.

Réponses brutes.

6 1. $\frac{175}{6}$

2. $\frac{1}{6} - \frac{1}{6e^{12}}$

3. $-\frac{1}{t}$

4. $2\ln(2)^2$

5. $\ln|\ln(t)|$

7 1. $e^2 + 1$

2. $2(e^t - 1)$

3. $\frac{\pi}{\sqrt{3}} - \ln(2)$.

8 1. $\text{Arctan}(\sqrt{e^3 - 1}) - \text{Arctan}(\sqrt{e - 1})$

2. $2 \left(\frac{\sqrt{y-1}^3}{3} + \sqrt{y-1} - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \right)$

3. $2\text{Arctan}(e^y) - 2\text{Arctan}(e)$

6. $\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}$

7. $-\frac{1}{8}$

8. 0

9. $\tan(t) - t$

4. $\text{xsh}(x) - \text{ch}(x)$.

5. $\text{xArctsin}(x) + \sqrt{1-x^2}$.

4. $\frac{\pi}{8}$

5. $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} \right)$

10 $\int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx = \frac{\pi^2}{4}$.

12 $I_n = \frac{2n(2n-2) \dots 2}{(2n+3)(2n+1) \dots 5} I_0 = \frac{2^n n!}{(2n+3)(2n+1) \dots 3}$

14 $I = \frac{\pi}{16} + \frac{\ln(2)}{4}$