

TD 12

Convexité

1 Exercices corrigés en classe

Exercice 1. Quelques inégalités de convexité. ●●○

1. Inégalité harmonico-arithmetico-géométrique : Soient x_1, x_2, \dots, x_n des réels strictement positifs. Montrer que

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq (x_1 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

2. Montrer que $x \in \mathbb{R} \mapsto \ln(1 + e^x)$ est convexe sur \mathbb{R} , et en déduire pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$:

$$1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\prod_{k=1}^n (1 + x_k) \right)^{\frac{1}{n}}.$$

En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{2n}$,

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) \right)^{\frac{1}{n}}$$

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe majorée. Démontrer que f est constante.

Exercice 3. Comportement asymptotique des fonctions convexes. ●●○ Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ possède une limite $a \in \overline{\mathbb{R}}$ en $+\infty$.
2. Si $a \in \mathbb{R}$, démontrer que $x \mapsto f(x) - ax$ possède une limite $b \in \overline{\mathbb{R}}$ en $+\infty$.
3. Si $b \in \mathbb{R}$, étudier la position de la courbe et de son asymptote.

Exercice 4. Inégalités de Hölder et de Minkowski. Soit $p > 1$. Pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, on appelle norme p de X le réel positif $\|X\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$.

Soient $p, q > 1$ deux réels strictement positifs tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. Démontrer que pour tous réels x et y , $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

2. (inégalité de Hölder) En déduire que pour tous $X, Y \in \mathbb{R}^n$ tels que $\|X\|_p = \|Y\|_q = 1$, $\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq 1$, puis que pour tous X et Y dans \mathbb{R}^n ,

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \|X\|_p \|Y\|_q.$$

3. (inégalité de Minkowski) Démontrer que pour tous $X, Y \in \mathbb{R}^n$: $\|X + Y\|_p \leq \|X\|_p + \|Y\|_p$.

Stratégie :

- Il faut pouvoir reconnaître la convexité dans des inégalités : exercices 7, 8, 9.
- Il faut pouvoir relier convexité et comportement global : exercice 5, 6, 12,
- Faites un exercice un peu plus raffiné au moins : exercice 14 ou 15.

2 Exercices à faire en TD

Plus que jamais, les indications de fin de TD peuvent être utiles, afin de vous guider sur la question « à quelle fonction appliquer une inégalité de convexité ? »

Exercice 5. ●○○ Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe positive pour laquelle $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que f est la fonction nulle.

Exercice 6. ●○○ Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, concave. Démontrer que s'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $a < b$ et $f(a) > f(b)$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

Correction

Supposons que cela soit le cas. Alors

$$\tau \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < 0.$$

Soit $x \geq b$. Par l'inégalité des pentes (attention, la fonction est convexe !),

$$\tau \geq \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

donc

$$f(x) \leq (x - a)\tau + f(a) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty,$$

d'où le résultat !

Exercice 7. ●○○ Démontrer que :

$$\forall x, y \in]1, +\infty[, \ln\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \sqrt{\ln(x)\ln(y)}$$

Correction

Soit, pour $x \in]1, +\infty[$, $f(x) = \ln(\ln(x))$. Alors $f' : x \mapsto \frac{1}{x\ln(x)}$, clairement décroissante. Donc f est concave. Donc pour tous x et y dans $]1, +\infty[$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x) + f(y)}{2},$$

i.e.

$$\ln\left(\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)\right) \geq \frac{\ln(\ln(x)) + \ln(\ln(y))}{2} = \ln\left(\sqrt{\ln(x)\ln(y)}\right),$$

d'où le résultat désiré en prenant l'exponentielle !

Exercice 8. Une application de l'inégalité arithmético-géométrico-harmonique. ●○○ Soient $x_1 \dots x_n$ des réels > 0 . Montrer, en utilisant l'inégalité arithmético-géométrico-harmonique, que

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_n}{x_1} \geq n.$$

Correction

Là, la convexité ne saute pas aux yeux ! On remarque tout de même que, si l'on pose $a_i = \frac{x_{i+1}}{x_i}$ (pour $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$), et $a_n = \frac{x_1}{x_n}$, alors

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_n}{x_1} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}.$$

Or, par l'inégalité arithmético-géométrico-harmonique,

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} = 1,$$

d'où l'inégalité désirée !

Exercice 9. ●○○ Montrer que pour tous $a, b, x, y > 0$:

$$(x+y) \ln \frac{x+y}{a+b} \leq x \ln \frac{x}{a} + y \ln \frac{y}{b}.$$

Correction

Remarquons que l'inégalité se réécrit

$$\ln \frac{x+y}{a+b} \leq \frac{x}{x+y} \ln \frac{x}{a} + \frac{y}{x+y} \ln \frac{y}{b}.$$

Et, comme on remarque que $\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x+y} = 1$, on peut se demander si ce qui est à gauche est combinaison convexe de ce qui est dans le \ln à droite.

Pas de chance, $\frac{x+y}{a+b} \neq \frac{x}{x+y} \frac{x}{a} + \frac{y}{x+y} \frac{y}{b}$. **EN REVANCHE**,

$$\frac{a+b}{x+y} = \frac{x}{x+y} \frac{a}{x} + \frac{y}{x+y} \frac{b}{y}.$$

Ainsi, par concavité de \ln ,

$$\ln \frac{a+b}{x+y} \geq \frac{x}{x+y} \ln \frac{a}{x} + \frac{y}{x+y} \ln \frac{b}{y},$$

d'où l'inégalité désirée en prenant l'opposé !

Exercice 10. ●○○ Montrer que pour tout n dans \mathbb{N}^* , $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_+^{*n}$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i} \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{a_k}$$

En déduire que $\forall x > 1$,

$$\sqrt{x^{2n}-1} \geq \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \frac{x^n-1}{\sqrt{n}}$$

Correction

On remarque que $x \mapsto \sqrt{x}$ est concave. Ainsi, par l'inégalité de Jensen,

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_i} \geq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{a_i},$$

ce qui permet d'avoir exactement l'inégalité désirée.

Ensuite,

$$x^{2n} - 1 = (x^2 - 1) \sum_{k=0}^{n-1} x^{2k}.$$

Ainsi, par l'inégalité précédente,

$$\begin{aligned} \sqrt{x^{2n} - 1} &= \sqrt{x^2 - 1} \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} x^{2k}} \\ &\geq \sqrt{x^2 - 1} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{x^{2k}} \\ &\geq \sqrt{x^2 - 1} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{x^n - 1}{x - 1} = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \frac{x^n - 1}{\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

d'où le résultat désiré !

Exercice 11. ●○○ Encadrer la fonction \cos sur $[\pi/2, \pi]$ par deux **bonnes** fonctions affines nulles en $\pi/2$, de la manière la plus optimale possible.

Correction

Là, on fait vraiment comme en cours ! La fonction \cos est convexe sur $[\pi/2, \pi]$ donc

- elle est sous la corde reliant les points $(\frac{\pi}{2}, 0)$ et $(\pi, -1)$, i.e. la droite $y = \frac{\cos(\pi) - \cos(\pi/2)}{\pi - \frac{\pi}{2}} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)$, donc

$$\forall x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right], \cos(x) \leq -\frac{2}{\pi} \left(x - \frac{\pi}{2}\right).$$

- elle est au-dessus de sa tangente en $\frac{\pi}{2}$, donc

$$\forall x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right], \cos(x) \geq \frac{\pi}{2} - x.$$

D'où

$$\forall x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right], \frac{\pi}{2} - x \leq \cos(x) \leq -\frac{2}{\pi} x + 1.$$

Exercice 12. ●●○ Soit f et g deux fonctions convexes définies sur un intervalle I . Montrer que si $f + g$ est affine, alors f et g sont toutes les deux affines.

Exercice 13. ●●○ Soit I un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. Montrer que f est lipschitzienne sur tout segment inclus dans I .

Exercice 14. Limite de $f(x) - xf'(x)$. ●●○ Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, convexe, dérivable, et $g : x \mapsto f(x) - xf'(x)$.

Indication. L'exercice est beaucoup plus simple si f est 2 fois dérivable... vous pouvez commencer avec cette hypothèse.

1. Montrer que g admet une limite (éventuellement infinie) en $+\infty$.

Correction

Si f est deux fois dérivable, c'est évident : on montre que g est décroissante.
Sinon, on prend $0 \leq x < y$, et on montre que

$$g(y) - g(x) = (y - x) \left(\frac{f(y) - f(x)}{y - x} - f'(y) \right) + x(f'(x) - f'(y)),$$

mais si $x < y$, par croissance des pentes et passage à la limite, on en déduit que

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq f'(y),$$

donc, par croissance de f' , on obtient $g(y) - g(x) \leq 0$, donc g décroît, donc admet une limite en $+\infty$.

On se place dans le cas où g admet une limite finie p

2. Démontrer que $x \mapsto \frac{f(x) - f(0)}{x}$ et $x \mapsto \frac{f(x) - p}{x}$ admettent des limites en $+\infty$, puis en déduire que $\frac{f(x)}{x}$ et $f'(x)$ admettent une même limite finie m en $+\infty$.

Correction

Posons $\forall x > 0 \quad \varphi(x) = \frac{f(x) - p}{x}$ et $\psi(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$. Par dérivation, on a

$$\forall x > 0 \quad \varphi'(x) - \frac{1}{x^2} [f(x) - xf'(x) - p] = -\frac{g(x) - p}{x^2}$$

et

$$\forall x > 0 \quad \psi'(x) = -\frac{1}{x^2} [f(x) - xf'(x) - f(0)] = -\frac{g(x) - f(0)}{x^2}$$

La fonction g étant décroissante, on a $p \leq g(x) \leq g(0)$ pour tout $x \geq 0$ on en déduit

$$\forall x > 0 \quad \varphi'(x) \leq 0 \quad \text{et} \quad \psi'(x) \geq 0$$

et on a également

$$\forall x > 0 \quad \psi(x) \leq \varphi(x)$$

Ainsi

$$\forall x \geq 1 \quad \psi(1) \leq \psi(x) \leq \varphi(x) \leq \varphi(1)$$

Par limite monotone, les fonctions φ et ψ admettent donc des limites finies en $+\infty$. Enfin, on a

$$\forall x > 0 \quad \varphi(x) - \psi(x) = \frac{f(0) - p}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

On en déduit que les fonctions φ et ψ admettent une même limite finie m en $+\infty$. Ainsi, on obtient pour $x > 0$

$$\frac{f(x)}{x} = \varphi(x) + \frac{p}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} m + o(1) \quad \text{et} \quad f'(x) = \frac{f(x)}{x} - \frac{g(x)}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} m + o(1) + \frac{p + o(1)}{x}$$

On conclut Les fonctions $\frac{f(x)}{x}$ et $f'(x)$ admettent une même limite finie m pour $x \rightarrow +\infty$.

3. Montrer alors que $f(x) - mx - p \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Correction

On pose $\varphi(x) = \frac{f(x) - p}{x}$ pour $x > 0$. Par dérivation, on a

$$\forall x > 0, \quad \varphi'(x) = -\frac{1}{x^2} (f(x) - xf'(x) - p) \leq 0.$$

Ainsi, φ décroît et $\varphi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} m$ d'où $\varphi(x) \geq m$ pour tout $x > 0$ et ainsi $\forall x > 0, f(x) - mx \geq p$.

Comme f' croît en tendant vers m en $+\infty$, on obtient

$$\forall x > 0, \quad p \leq f(x) - mx \leq f(x) - xf'(x),$$

donc, par encadrement, $f(x) - mx - p \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Exercice 15. ●●○ On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ est logarithmiquement convexe sur l'intervalle I si $\ln f$ est convexe sur I .

1. Soit f définie par $f(x) = e^{2x-\cos x}$, montrer que f est convexe sur \mathbb{R} .
2. Montrer que si f est logarithmiquement convexe, alors f est convexe. Réciproque ?
3. Montrer que f est logarithmiquement convexe si, et seulement si, pour tout $\alpha > 0$, f^α est convexe.

4. Montrer que f est logarithmiquement convexe si, et seulement si, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $x \mapsto e^{ax}f(x)$ est convexe.

5. Montrer que le produit et la somme de deux fonctions logarithmiquement convexes l'est aussi.

Exercice 16. ●●● Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ positive, bornée, de classe \mathcal{C}^2 telle que $f \leq f''$.

1. Montrer que f est convexe et décroissante.

Correction

Comme f est positive, f'' est positive, donc f est convexe. De plus, s'il existait $x < y$ tels que $f(x) < f(y)$, on aurait, par inégalité des pentes, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, donc f ne serait pas bornée.

Donc f est décroissante

2. Montrer que f' tend vers 0 en $+\infty$.

Correction

Comme f' est décroissante, elle admet une limite en $+\infty$, dans $\mathbb{R}_- \cup \{-\infty\}$. Si cette limite est réelle non nulle, disons $\alpha < 0$, $f'(x) < \alpha/2$ pour x assez grand (disons $x \geq x_0$). Ainsi, $f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t)dt \leq (x - x_0)\frac{\alpha}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$, ce qui contredit le caractère positif de f .

Si $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$, c'est la même chose ! Donc $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

3. Soit g et h définies par $g(x) = f(x)e^x$ et $h(x) = (f'(x) + f(x))e^{-x}$ pour $x \geq 0$. Étudier le signe de h , et les variations de g .

Correction

On remarque que $g'(x) = (f(x) + f'(x))e^x$ et que $h'(x) = (f''(x) - f(x))e^{-x} \leq 0$, donc h croît. Comme f' est bornée (elle tend vers 0), et f est bornée, on en déduit que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc h est négative sur \mathbb{R}_+ . Ceci nous permet d'affirmer que $f + f'$ est toujours négative, donc g décroît.

4. En déduire que pour $x \geq 0$, on a $f(x) \leq f(0)e^{-x}$.

Correction

On en déduit que $g(x) \leq g(0)$ pour tout $x \geq 0$, donc que $f(x)e^x \leq f(0)$, ce qui est le résultat désiré !

Exercice 17. ●●● Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

Montrer que f est convexe.

Correction

Remarque. On sait (cf. TD sur les suites) que l'ensemble des dyadiques :

$$Dy = \left\{ \frac{a}{2^b}, \quad a \in \mathbb{Z}, \quad b \in \mathbb{N} \right\}$$

est dense dans \mathbb{R} . On va donc démontrer que si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y),$$

pour tout $\lambda \in [0, 1] \cap Dy$.

On montre par récurrence sur $n \geq 1$ que,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall p \in \{0, 1, \dots, 2^n\} \quad f\left(\frac{p}{2^n}x + \left(1 - \frac{p}{2^n}\right)y\right) \leq \frac{p}{2^n}f(x) + \left(1 - \frac{p}{2^n}\right)f(y). \quad (\mathcal{P}_n)$$

L'initialisation est claire.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que \mathcal{P}_n . Soit $p \in \{0, 1, \dots, 2^{n+1}\}$. Quitte à inverser x et y , on peut supposer que $p \leq 2^n$. On utilise alors l'hypothèse de base en séparant en 2 notre expression.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{p}{2^{n+1}}x + \left(1 - \frac{p}{2^{n+1}}\right)y\right) &= f\left(\frac{1}{2}\left(\frac{p}{2^n}x + \frac{(2^n-p)}{2^n}y\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{2^ny}{2^n}\right)\right) \\ &\leq \frac{1}{2}\left(f\left(\frac{p}{2^n}x + \frac{(2^n-p)}{2^n}y\right) + f(y)\right) \\ &\leq \frac{1}{2}\left(\frac{p}{2^n}f(x) + \frac{2^n-p}{2^n}f(y) + f(y)\right) \\ &\leq \frac{p}{2^{n+1}}f(x) + \left(\frac{2^n-p}{2^{n+1}} + \frac{1}{2}\right)f(y) \\ &\leq \frac{p}{2^{n+1}}f(x) + \frac{2^{n+1}-p}{2^{n+1}}f(y) \end{aligned}$$

Ceci prouve l'hérédité et le résultat !

Indications.

1. Dans la première question, tout vient de la concavité de \ln et de l'inégalité de Jensen.
2. Utiliser l'inégalité des pentes pour montrer que f tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ en $+\infty$ ou $-\infty$.
3. Utiliser l'inégalité des pentes, ainsi que la positivité de f .
4. Utiliser, encore, l'inégalité des pentes. (oui, elle est **très importante**, cette inégalité !)
5. Utiliser, en la démontrant, la concavité de $x \mapsto \ln(\ln(x))$
6. Poser, pour $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $a_i = \frac{x_i}{x_{i+1}}$, et $a_n = \frac{x_n}{x_1}$.
7. Utiliser la concavité du \ln (peut-être la convexité de $-\ln$ d'ailleurs... !), toujours, mais pas directement avec x et y : c'est ça la subtilité !
8. Utiliser la concavité de $x \mapsto \sqrt{x}$ puis l'inégalité de Jensen. Ensuite, factoriser $x^{2n} - 1 = (x^2 - 1) \times \dots$.
9. Calquer sur l'exercice de cours avec le sinus.
10. Raisonner par l'absurde : quelle inégalité stricte vérifie une fonction convexe non affine ?
11. Utiliser l'inégalité des pentes, en pensant au fait que si $[a, b] \subset I$, il existe $c \in I$, $c > b$.
12. Démontrer que g est décroissante (attention, f n'est pas deux fois dérivable donc on ne peut pas dériver g !) Revenir donc à la définition de la décroissance et utiliser la croissance des pentes.
13. Démontrer que $h : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ admet une limite et qu'elle est bornée, puis remarquer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x} + \frac{f'(x)}{x}$.
14. 1. Démontrer que g est décroissante (attention, f n'est pas deux fois dérivable donc on ne peut pas dériver g !) Revenir donc à la définition de la décroissance et utiliser la croissance des pentes.
2. Démontrer que $h : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ admet une limite et qu'elle est bornée, puis remarquer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x} + \frac{f'(x)}{x}$.
15. 1. Démontrer que $\varphi(x) = \frac{f(x)-p}{x}$ décroît en tendant vers m , puis utiliser que f' croît en tendant vers m pour conclure par théorème d'encadrement.
2. Remarquer que l'on peut composer une inégalité de convexité par une fonction convexe croissante ! (l'exponentielle, à tout hasard...) Pour la réciproque, cf. la question précédente.

3. Pour le sens direct, faire comme la question précédente. Pour le sens réciproque, pour x fixé, quelle est la dérivée de $\alpha \mapsto f(x)^\alpha$? Cela devrait pouvoir aider à prendre une limite d'un taux d'accroissement pour démontrer la log-convexité !
 4. Un sens est évident. Pour l'autre, vraiment plus dur, Montrer que si toutes les fonctions f_c sont convexes, alors pour tous $x, y \in I$ avec $x \neq y$, et $\lambda \in]0, 1[$. $\forall c \in \mathbb{R} : f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)e^{c\lambda(x-y)}f(x) + \lambda e^{c(1-\lambda)(y-x)}f(y)$. Considérer ensuite la valeur de c pour laquelle $\varphi(c) = (1 - \lambda)e^{c\lambda(x-y)}f(x) + \lambda e^{c(1-\lambda)(y-x)}f(y)$ est minimal, et vérifier que pour cette valeur de c , on a $\varphi(c) = f(x)^{1-\lambda}f(y)^\lambda$. Conclure !
 5. Utiliser l'une des deux caractérisations précédentes !
- 16.
1. Supposer qu'il existe $a < b$ tels que $f(a) < f(b)$ et utiliser l'inégalité des pentes !
 2. Raisonner par l'absurde en remarquant que f' a nécessairement une limite dans $\mathbb{R}_- \cup \{-\infty\}$, puis remarquer, par exemple, que $f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t)dt$.
 3. C'est juste du calcul, ainsi qu'une inégalité entre une fonction monotone et sa limite.
 4. Déduction directe.
17. Exercice difficile ! Remarquer que l'ensemble des dyadiques, $\left\{ \frac{a}{2^b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \right\}$ est dense dans \mathbb{R} , et prouver l'inégalité de convexité uniquement pour des λ dyadiques ! Il faut pour cela faire une récurrence sur la puissance de 2 au dénominateur.