

DM13

Pour le lundi 16 février

Formules possibles

La partie I est obligatoire et, ensuite, choisissez quelles parties tenter : indiquez en début de devoir les parties choisies (par exemple : « j'ai fait la partie I + II – A + III ») et le temps passé (en théorie, c'est un sujet de concours, donc à faire en 4h). Pour la partie I, mettez un maximum de temps à 1h30.

Annexe : aide pour la dernière partie

Les indications qui suivent sont utiles simplement pour le début de la partie IV.C.

Tous les résultats de cette partie sont utilisables sans avoir à les justifier, simplement en disant « d'après l'annexe ».

Si $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on appelle *polynôme caractéristique* de M le polynôme défini par, pour tout x dans $\mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\chi_M(x) &= \det(xI_2 - M) \text{ (NB : cette lettre } \chi \text{ est un « chi »)} \\ &= \begin{vmatrix} x - a & -b \\ -c & x - d \end{vmatrix} \\ &= x^2 - (a + d)x + ad - bc \\ &= x^2 - \text{Tr}(M)x + \det(M).\end{aligned}$$


Les racines complexes λ et μ de $\chi_M(X)$ sont les *valeurs propres* de M .

On a donc, par les relations coefficients-racines, $\text{Tr}(M) = \lambda + \mu$ et $\det(M) = \lambda\mu$.

Moins évident, mais vrai, $\text{Tr}(M^n) = \lambda^n + \mu^n$ et $\det(M^n) = \lambda^n \mu^n$ mais ça c'est facile à voir si on pense que $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ (à vérifier).

Enfin, on a le **théorème de Cayley-Hamilton** : pour toute M dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, $\chi_M(M) = 0$, i.e.

$$M^2 - \text{Tr}(M)M + \det(M) = 0.$$



Mathématiques 2

Polynômes de Tchebychev et de Dickson, applications

I Définitions et propriétés usuelles

Les polynômes de Tchebychev de première espèce $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont définis par la relation

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

On ne demande pas de justifier l'existence et l'unicité de la famille de polynômes définie par cette relation.

I.A – Polynômes de première espèce

I.A.1) Déterminer T_0 , T_1 , T_2 et T_3 .

I.A.2) En remarquant que pour tout réel θ , on a $e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n$, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad T_n = \sum_{0 \leq k \leq n/2} \binom{n}{2k} (X^2 - 1)^k X^{n-2k}$$

I.A.3) Montrer que la suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n \quad (\text{I.1})$$

En déduire, pour tout entier naturel n , le degré et le coefficient dominant de T_n . Retrouver ce résultat avec l'expression de la [question I.A.2](#).

I.A.4) Montrer que, pour tout entier naturel n , le polynôme T_n est scindé sur $\mathbb{R}$, à racines simples appartenant à $] -1, 1[$. Déterminer les racines de T_n .

I.B – Polynômes de deuxième espèce

On définit les polynômes $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Tchebychev de deuxième espèce par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad U_n = \frac{1}{n+1} T'_{n+1}$$

I.B.1) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall \theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}, \quad U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

I.B.2) En déduire les propriétés suivantes :

a) La suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la même relation de récurrence [\(I.1\)](#) que la suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

b) Pour tout entier naturel n , le polynôme U_n est scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples appartenant à $] -1, 1[$. Déterminer les racines de U_n .

II Arithmétique des polynômes de Tchebychev

II.A – Division euclidienne

II.A.1) Montrer que

$$\begin{cases} T_m \cdot T_n = \frac{1}{2} (T_{n+m} + T_{n-m}) & \text{pour tous entiers } 0 \leq m \leq n \\ T_m \cdot U_{n-1} = \frac{1}{2} (U_{n+m-1} + U_{n-m-1}) & \text{pour tous entiers } 0 \leq m < n \end{cases}$$

II.A.2) Pour m et n entiers naturels tels que $m \leq n$, on se propose de déterminer le quotient $Q_{n,m}$ et le reste $R_{n,m}$ de la division euclidienne de T_n par T_m .

a) On suppose $m < n < 3m$. Montrer que

$$Q_{n,m} = 2T_{n-m} \quad \text{et} \quad R_{n,m} = -T_{|n-2m|}$$

b) Déterminer $Q_{n,m}$ et $R_{n,m}$ lorsque n est de la forme $(2p+1)m$ avec $p \in \mathbb{N}^*$.

c) On suppose que $m > 0$ et que n n'est pas le produit de m par un entier impair. Montrer qu'il existe un unique entier $p \geq 1$ tel que $|n - 2pm| < m$ et que

$$Q_{n,m} = 2(T_{n-m} - T_{n-3m} + \dots + (-1)^{p-1}T_{n-(2p-1)m}) \quad \text{et} \quad R_{n,m} = (-1)^p T_{|n-2pm|}$$

II.B – Plus grand commun diviseur

Dans toute cette sous-partie II.B, on fixe deux entiers naturels m et n .

II.B.1) Soit h le pgcd dans $\mathbb{N}$ de $m+1$ et $n+1$. En examinant les racines communes à U_n et U_m , montrer que U_{h-1} est un pgcd dans $\mathbb{R}[X]$ de U_n et U_m .

II.B.2) Soit $g > 0$ le pgcd de m et n . On pose $m_1 = m/g$ et $n_1 = n/g$.

a) Montrer que si m_1 et n_1 sont impairs, alors T_g est un pgcd de T_n et T_m .

b) Montrer que si l'un des deux entiers m_1 ou n_1 est pair, alors T_n et T_m sont premiers entre eux.

c) Que peut-on dire des pgcd de T_n et T_m lorsque m et n sont impairs ? Lorsque n et m sont deux puissances de 2 distinctes ?

III Un théorème

Dans cette partie, on munit l'ensemble $\mathbb{C}[X]$ des polynômes complexes de la loi de composition interne associative donnée par la composition, notée $\circ$. Plus précisément, étant donné $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, si $P = \sum_{k=0}^{+\infty} p_k X^k$, la suite $(p_k)_{k \in \mathbb{N}}$ étant nulle à partir d'un certain rang, on a

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^{+\infty} p_k Q^k$$

On dit que les polynômes P et Q commutent si $P \circ Q = Q \circ P$. On note $\mathcal{C}(P)$ l'ensemble des polynômes complexes qui commutent avec le polynôme P

$$\mathcal{C}(P) = \{Q \in \mathbb{C}[X], P \circ Q = Q \circ P\}$$

On cherche dans cette partie les familles $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes complexes vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \deg F_n = n \quad \text{et} \quad \forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, \quad F_n \circ F_m = F_m \circ F_n \quad (\text{III.1})$$

Il est clair que la famille $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ convient.

On note G l'ensemble des polynômes complexes de degré 1, et pour $\alpha \in \mathbb{C}$, on pose $P_\alpha = X^2 + \alpha$.

III.A – Préliminaires

III.A.1) Montrer que la famille $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la propriété (III.1). On pourra comparer $T_n \circ T_m$ et T_{mn} .

III.A.2) Vérifier que G est un groupe pour la loi $\circ$.

L'inverse pour la loi $\circ$ d'un élément U de G sera noté U^{-1} .

III.B – Commutant de X^2 et T_2

III.B.1) Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ et soit Q un polynôme complexe non constant qui commute avec P_α . Montrer que Q est unitaire.

III.B.2) En déduire que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe au plus un polynôme de degré n qui commute avec P_α . Déterminer $\mathcal{C}(X^2)$.

III.B.3) Soit P un polynôme complexe de degré 2. Justifier l'existence et l'unicité de $U \in G$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ tels que $U \circ P \circ U^{-1} = P_\alpha$. Déterminer ces deux éléments lorsque $P = T_2$.

III.B.4) Justifier que $\mathcal{C}(T_2) = \{-1/2\} \cup \{T_n, n \in \mathbb{N}\}$.

III.C –

III.C.1) Montrer que les seuls complexes α tels que $\mathcal{C}(P_\alpha)$ contienne un polynôme de degré trois sont 0 et -2 .

III.C.2) En déduire le théorème de Block et Thielmann : si $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie (III.1), alors il existe $U \in G$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad F_n = U^{-1} \circ X^n \circ U \quad \text{ou} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad F_n = U^{-1} \circ T_n \circ U$$

IV Puissances dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$

Dans toute cette partie, on note $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$, muni de son addition et de sa multiplication usuelle.

IV.A – Justifier qu'un élément M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ appartient à $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ si et seulement si $|\det M| = 1$.

IV.B – On introduit les polynômes de Dickson de première et deuxième espèce, $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$, définis sous la forme de fonctions polynomiales de deux variables par

$$D_0(x, a) = 2 \quad D_1(x, a) = x \quad E_0(x, a) = 1 \quad E_1(x, a) = x$$

puis, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$D_{n+2}(x, a) = x D_{n+1}(x, a) - a D_n(x, a) \quad \text{et} \quad E_{n+2}(x, a) = x E_{n+1}(x, a) - a E_n(x, a)$$

Justifier la relation suivante avec les polynômes de Tchebychev

$$\forall (x, a) \in \mathbb{C}^2, \quad D_n(2xa, a^2) = 2a^n T_n(x) \quad \text{et} \quad E_n(2xa, a^2) = a^n U_n(x)$$

ainsi que les deux relations suivantes, valables pour tout entier naturel n et tout $(x, a) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$

$$D_n\left(x + \frac{a}{x}, a\right) = x^n + \frac{a^n}{x^n} \quad \text{et} \quad \left(x - \frac{a}{x}\right) E_n\left(x + \frac{a}{x}, a\right) = \left(x^{n+1} - \frac{a^{n+1}}{x^{n+1}}\right) \quad (\text{IV.1})$$

IV.C – Dans cette sous-partie, on cherche une condition nécessaire et suffisante pour qu'un élément A de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ soit une puissance n -ième dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$, c'est-à-dire pour qu'il existe une matrice $B \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$ telle que $A = B^n$. Dans toute la suite, on notera

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \tau = \text{Tr } A \quad \delta = \det A$$

IV.C.1) Soit $B \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$. On note, dans cette question uniquement, $\sigma = \text{Tr } B$ et $\nu = \det B$. Montrer pour tout $n \geq 2$, l'égalité

$$B^n = E_{n-1}(\sigma, \nu) \cdot B - \nu E_{n-2}(\sigma, \nu) \cdot I_2$$

où I_2 est la matrice identité d'ordre 2.

Établir que $\text{Tr}(B^n) = D_n(\sigma, \nu)$.

IV.C.2) En déduire que si A est une puissance n -ième ($n \geq 2$) dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$, alors il existe $\sigma \in \mathbb{Z}$ et $\nu \in \{-1, 1\}$ tels que

- i. $E_{n-1}(\sigma, \nu)$ divise b, c et $a - d$. On justifiera brièvement que $E_{n-1}(\sigma, \nu)$ est bien un entier.
- ii. $\tau = D_n(\sigma, \nu)$ et $\delta = \nu^n$.

IV.C.3) On va maintenant établir la réciproque.

Soit A un élément de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ pour lequel il existe $\sigma \in \mathbb{Z}$ et $\nu \in \{-1, 1\}$ vérifiant les deux conditions précédentes

i et **ii**. Pour simplifier, on note $p = E_{n-1}(\sigma, \nu)$. On définit alors une matrice $B = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$ avec

$$r = \frac{1}{2} \left(\sigma + \frac{a-d}{p} \right) \quad s = \frac{b}{p} \quad t = \frac{c}{p} \quad u = \frac{1}{2} \left(\sigma - \frac{a-d}{p} \right)$$

a) En introduisant une racine complexe du polynôme $X^2 - \sigma X + \nu$ et à l'aide de (IV.1), montrer que

$$\tau^2 - 4\delta = p^2(\sigma^2 - 4\nu) \quad \text{puis} \quad ru - st = \nu$$

En déduire que B appartient à $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$.

b) Montrer que $A = B^n$.

IV.C.4) Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ est un cube dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ et déterminer une matrice $B \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$ telle que $B^3 = A$.

• • • FIN • • •
