Trigonométrie

1 Cercle trigonométrique

Le plan est rapporté à un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On note Γ le cercle de centre O et de rayon 1 et $A(1; 0)$.

Une mesure de l'angle orienté $(\vec{OA}; \vec{OM})$ est la « longueur » de l'arc $\widehat{AM}$ à un nombre de « tours » près.

On définit alors $\cos x$ comme l'abscisse du point M et $\sin x$ comme l'ordonnée du point M .

Définition

Soit x et y deux nombres réels. x et y sont congrus modulo 2π si et seulement s'il existe un entier relatif k tel que $x = y + 2k\pi$.

On note $x \equiv y \pmod{2\pi}$.

Propriétés

Pour tout réel x ,

$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$$

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\cos(x + \pi) = -\cos(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\sin(x + \pi) = -\sin(x)$$

$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Propriété (formule d'addition)

Pour tous réels a et b ,

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

Preuve :

⚡ Soit A le point image de $-a$ et B le point image de b .

⚡ Une mesure de l'angle orienté $(\vec{OA}; \vec{OB})$ est $a + b$.

⚡ On a $\vec{OA}(\cos a; -\sin a)$ et $\vec{OB}(\cos b; \sin b)$.

⚡ On calcule le produit scalaire $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$ de deux manières

⚡ D'une part, $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = OA \cdot OB \cdot \cos(\vec{OA}; \vec{OB}) = \cos(a + b)$.

⚡ D'autre part, $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = xx' + yy' = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$.

Il en découle

Propriétés

Pour tous réels a et b ,

$$\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b)$$

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$$

$$\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b)$$

Corollaire

Pour tous réels a et b ,

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2 \cos^2(a) - 1 = 1 - 2 \sin^2(a)$$

$$\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$$

Corollaire

Pour tous réels a et b ,

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a - b) + \cos(a + b))$$

$$\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} (\cos(a - b) - \cos(a + b))$$

$$\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\sin(a + b) + \sin(a - b))$$

2 Fonctions trigonométriques

Pour $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, MN est inférieur à la longueur de l'arc $\widehat{AM}$, soit $|\sin(x)| \leq |x|$.

Il en découle que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0.$$

Comme $\cos(x) = 1 - 2 \sin^2(x/2)$, il vient

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1.$$

Pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$, $x \neq 0$, en appliquant le théorème de Thalès dans le triangle OAT , on trouve

$$\frac{ON}{OA} = \frac{MN}{AT}$$

soit

$$\frac{|\cos(x)|}{1} = \frac{|\sin(x)|}{AT}$$

et donc $AT = \frac{|\sin(x)|}{|\cos(x)|}$

On en déduit les inégalités

$$|\sin(x)| \leq |x| \leq \frac{|\sin(x)|}{|\cos(x)|}$$

et par suite

$$|\cos(x)| \leq \frac{|\sin(x)|}{|x|} \leq 1$$

On en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

Proposition

La fonction $\sin$ est dérivable en 0 et $\sin'(0) = 1$.

$$\frac{\cos(x) - \cos(0)}{x} = \frac{\cos(x) - 1}{x} = \frac{(\cos^2(x) - 1)}{x(\cos(x) + 1)} = -\frac{\sin(x)}{x} \times \frac{\sin(x)}{\cos(x) + 1} \text{ donc}$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - \cos(0)}{x} = 0$$

Proposition

La fonction $\cos$ est dérivable en 0 et $\cos'(0) = 0$.

Corollaire

La fonction $\sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\sin' = \cos$.

La fonction $\cos$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\cos' = -\sin$.

Preuve :

Soit a et h deux réels, $h \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} &= \frac{\sin(a)\cos(h) + \cos(a)\sin(h) - \sin(a)}{h} \\ &= \sin(a)\frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(a)\frac{\sin(h)}{h} \end{aligned}$$

Il découle des deux propositions différentes que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} = \cos(a)$$

De l'égalité, $\cos(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ on a déduit que la fonction $\cos$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos'(x) = \sin'\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x).$$

Soit $f : x \mapsto x - \sin(x)$ et $g : x \mapsto x + \sin(x)$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) \geq 0$ et $g'(x) \geq 0$. Les deux fonctions sont croissantes et s'annulent en 0. Il en découle qu'elles sont négatives sur $] -\infty; 0]$ et positives sur $[0; +\infty[$.

D'où, pour tout $x \in] -\infty; 0]$, $x \leq \sin(x) \leq -x$ soit $-|x| \leq \sin(x) \leq |x|$ et pour tout $x \in [0; +\infty[$, $-x \leq \sin(x) \leq x$ soit $-|x| \leq \sin(x) \leq |x|$

Il en découle

Proposition

Pour tout réel x ,

$$|\sin(x)| \leq |x|.$$

3 La fonction tangente

On a l'équivalence

$$\cos(x) = 0 \iff x \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}.$$

Définition

La fonction tangente est la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$ par

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

La fonction tangente est impaire et π -périodique. Elle est dérivable sur son ensemble de définition et

Proposition

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$,

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x).$$

La restriction de $\tan$ à toute intervalle de la forme $\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$ est strictement croissante.

On a

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan$	$-\infty$	0	$+\infty$

Propriétés

Pour tout réel x non congru à $\frac{\pi}{2}$ modulo π ,

$$\tan(\pi + x) = \tan(x) \quad \tan(\pi - x) = -\tan(x)$$

Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Proposition

Soit a et b deux réels. Lorsque les tangentes sont bien définies :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$$

et

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan(a)}{1 - \tan^2(a)}.$$

Proposition

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus (\pi + 2\pi\mathbb{Z})$. On pose $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. Alors

$$\sin(x) = \frac{2t}{1 + t^2}$$

et

$$\cos(x) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

Preuve :

$$\sin(x) = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 2t \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

$$\cos(x) = 1 - 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - 2t^2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - \frac{2t^2}{1 + t^2} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$