♡ 0 ♡ Montrez que si z est racine du polynôme P à coefficients réels, alors $\bar{z}$ est aussi racine de ce polynôme. (2 pt.)

♡ 1 ♡ Donnez les quatre racines quatrièmes de $28 - 96.i$. Même question avec $28 + 96.i$. (3 pt.)

♡ 2 ♡ Le polynôme $X^4 - 3.X^2 + 4.X + 1$ a pour racines a, b, c et d .
Montrez $(1 - a).(1 - b).(1 - c).(1 - d) = 3$. (2 pt.)

◇ 0 ◇ On sait $\cos(a) = 7/25$ et $\sin(b) = 28/53$. Donnez les quatre valeurs possibles de $\cos(a + b)$ et $\sin(a + b)$ (montrez que ce sont des rationnels). (2 pt.)

◇ 1 ◇ Transformez le produit $\cos(2.t) \cdot \sin(3.t)$ en somme de sinus et/ou de cosinus.

Déduisez $\int_0^\pi \cos(2.t) \cdot \sin(3.t) \cdot dt = \frac{6}{5}$. (3 pt.)

Montrez par tout x de $]0, \pi[$:

$$\cos(x) \cdot \cos(2.x) \cdot \cos(3.x) = \frac{\sin(4.x) \cdot \cos(3.x)}{4 \cdot \sin(x)}$$

Déduisez $\cos\left(\frac{\pi}{7}\right) \cdot \cos\left(\frac{2.\pi}{7}\right) \cdot \cos\left(\frac{3.\pi}{7}\right) = \frac{1}{8}$. (3 pt.)

♣ 0 ♣ Un élève propose de prouver $(x \mapsto x^{1+i}) = (x \mapsto (1+i).x^i)$. Aidez le en revenant à l'exponentielle complexe $x^i = e^{i \cdot \ln(x)}$ certes contestable. (2 pt.)

◇ 2 ◇ Montrez pour tout x strictement positif $2 \cdot \text{Arctan}\left(\frac{1}{\sqrt{2x+1}}\right) = \text{Arctan}\left(\frac{\sqrt{2x+1}}{x}\right)$. (3 pt.)

♣ 1 ♣ Ma calculatrice a trouvé $\sqrt[3]{\sqrt[3]{2} - 1} \simeq 0,638$ et aussi $\frac{1 - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{9}} \simeq 0,638$. Est ce le fruit du hasard si ils ont l'air égaux ? Prouvez moi que non.

Indication : on pourra poser $x = \sqrt[3]{2}$ pour simplifier les calculs.

On pourra aussi multiplier par $\sqrt[3]{(\sqrt[3]{2} + 1)^3}$, si si ! (4 pt.)

◇ 3 ◇ Résolvez $\int_0^a \frac{5.x^2 - 2.x - 6}{x^3 - x^2 - 4.x - 2} \cdot dx = \ln(3)$ d'inconnue réelle a . (5 pt.)

Si L est une liste de notes, que fait ce script ? (2 pt.)

```
def Scooby(n) :
...if n % 2 == 0 :
.....return n//2
...else :
.....return n
L = [Scooby(n) for n in L]
```

Polynôme à coefficients réels.

IS05

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^d a_k \cdot z^k = 0 &\Rightarrow \overline{\sum_{k=0}^d a_k \cdot z^k} = \bar{0} \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^d \overline{a_k \cdot z^k} = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^d \bar{a}_k \cdot \bar{z}^k = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^d a_k \cdot \bar{z}^k = 0 \end{aligned}$$

On note $P = \sum_{k=0}^d a_k \cdot X^k$ le polynôme à coefficients réels et z la racine. On raisonne par implications mais on pourrait raisonner par équivalences.

Et surtout, on ajoute les mots qui manquent :

« on conjugue »,

« le conjugué de la somme est la somme des conjugués »,

« le conjugué du produit est le produit des conjugués »,

« les coefficients sont réels », on reconnaît $P(\bar{z}) = 0$.

Racines quatrièmes.

IS05

On commence par les racines carrées de $28 - 96.i$. On résout $(x + i.y)^2 = 28 - 96.i$:

$x^2 - y^2$	$= 28$
$x^2 + y^2$	$= \sqrt{28^2 + 96^2} = \sqrt{10000} = 100$
$2.x.y$	$= -96$

On trouve deux racines carrées : $8 - 6.i$ et son opposé.

On recommence avec cette fois $(a + i.b)^2 = 8 - 6.i$:

$x^2 - y^2$	$= 8$
$x^2 + y^2$	$= \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$
$2.x.y$	$= -6$

On trouve nos quatre racines quatrièmes :

$1 + 3.i$	$-1 - 3.i$
$3 - i$	$-3 + i$

Avec un changement de signe, il suffit de passer au conjugué : si on a $z^4 = 28 - 96.i$ alors on a aussi $\bar{z}^4 = \overline{z^4} = 28 + 96.i$.

Coefficients racines.

IS05

Si on note a, b, c et d les quatre racines du polynôme $X^4 - 3.X^2 + 4.X + 1$ on a

$$\begin{aligned} a + b + c + d &= 0 \\ a.b + a.c + a.d + b.c + b.d + c.d &= -3 \\ a.b.c + a.b.d + a.c.d + b.c.d &= -4 \\ a \times b \times c \times d &= 1 \end{aligned}$$

et on développe $(1 - a).(1 - b).(1 - c).(1 - d) = \begin{matrix} 1 \\ -a & -b & -c & -d \\ +a.b & +a.c & +a.d & +b.c & +b.d & +c.d \\ -a.b.c & -a.b.d & -a.c.d & -b.c.d & +a.b & c.d \end{matrix}$ et on termine le calcul.

Mais si on a du recul, on écrit $X^4 - 3.X^2 + 4.X + 1 = (X - a).(X - b).(X - c).(X - d)$ et on remplace X par 1. C'est tout !

Trigonométrie et intégrale.

IS05

L'application intégrée $x \mapsto$ est continue, donc intégrable. Ensuite, on a juste à écrire

$$\cos(2.t) \cdot \sin(3.t) = \frac{\sin(2.t + 3.t) + \sin(3.t - 2.t)}{2}$$

Une primitive est donc $t \mapsto -\frac{\cos(5t)}{10} - \frac{\cos(t)}{2}$. Le reste n'est que calcul.

Trigonométrie et somme.

IS05

On part de $\cos(a) = \frac{7}{25}$ et $\sin(b) = \frac{28}{53}$, on élève au carré et on soustrait à 1. On a donc

$$\sin^2(a) = \frac{25^2 - 7^2}{25^2} = \frac{(25+7)(25-7)}{25^2} = \frac{32 \cdot 18}{25^2} = \frac{8^2 \cdot 3^2}{25^2}$$

et de même $\cos^2(b) = \frac{(53+28)(53-28)}{53^2} = \frac{5^2 3^4}{53^2}$. On tient nos sinus au signe près.

Il en sera de même pour $\cos(a) \cdot \cos(b) - \sin(a) \cdot \sin(b)$ et $\cos(a) \cdot \sin(b) + \sin(a) \cdot \cos(b)$

$$\begin{aligned} \cos(a+b) &= \frac{7}{25} \cdot \frac{45}{53} - \frac{24}{25} \cdot \frac{28}{35} \\ &= \frac{7}{25} \cdot \frac{45}{53} + \frac{24}{25} \cdot \frac{28}{35} \\ &= \frac{7}{25} \cdot \frac{45}{53} - \frac{24}{25} \cdot \frac{28}{35} \\ &= \frac{7}{25} \cdot \frac{45}{53} + \frac{24}{25} \cdot \frac{28}{35} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(a+b) &= \frac{7}{25} \cdot \frac{28}{53} - \frac{24}{25} \cdot \frac{45}{35} \\ &= \frac{7}{25} \cdot \frac{28}{53} + \frac{24}{25} \cdot \frac{45}{35} \end{aligned}$$

Y tient on ? $\pm \frac{357}{1325}$, $\pm \frac{987}{1325}$, $\frac{1276}{1325}$ et $-\frac{884}{1325}$?

Dérivation.

IS05

On écrit donc $f = x \mapsto x \cdot (\cos(\ln(x)) + i \cdot \sin(\ln(x)))$ et on dérive partie réelle et partie imaginaire qui sont chacune un produit

$$f' = x \mapsto \left(1 \cdot \cos(\ln(x)) + x \cdot \frac{-\sin(\ln(x))}{x}\right) + i \cdot \left(1 \cdot \cos(\ln(x)) + x \cdot \frac{\cos(\ln(x))}{x}\right)$$

On simplifie les x et il reste $x \mapsto (1+i) \cdot \cos(\ln(x)) + (i-1) \cdot \sin(\ln(x))$. On écrit $i-1 = i(1+i)$ et on a bien $x \mapsto (1+i) \cdot e^{i \cdot \ln(x)}$ qu'on va écrire $x \mapsto (1+i) \cdot x^i$.

On pouvait aussi partir de $(1+i) \cdot e^{i \cdot \ln(x)}$ et arriver à notre $x \mapsto \cos(\ln(x)) - \sin(\ln(x)) + i \cdot \sin(\ln(x)) + i \cdot \cos(\ln(x))$.

π sur 7.

IS05

Si on doit comparer $\cos(x) \cdot \cos(2x) \cdot \cos(3x)$ et $\frac{\sin(4x) \cdot \cos(3x)}{4 \cdot \sin(x)}$ il suffit de comparer $\cos(x) \cdot \sin(2x)$ et $\frac{\sin(4x)}{4 \cdot \sin(x)}$.

Par produit en croix, il suffit de constater qu'on applique deux fois la formule $\sin(t) \cdot \cos(t) = \frac{\sin(2t)}{2}$.

On a directement

$$\cos\left(\frac{\pi}{7}\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{7}\right) = \frac{\sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) \cdot \cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)}{4 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{7}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{4\pi}{7} - \frac{3\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7} + \frac{3\pi}{7}\right)}{8 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{7}\right)} = \frac{0 + \sin(\pi/7)}{8 \cdot \sin(\pi/7)} = \frac{1}{8}$$

Il a fallu quand même rappeler $\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$.

Arctangentes.

IS05

On étudie la différence $2 \cdot \text{Arctan}\left(\frac{1}{\sqrt{2x+1}}\right) - \text{Arctan}\left(\frac{\sqrt{2x+1}}{x}\right)$ vue comme fonction de x . On dérive (composée) :

$$x \mapsto 2 \cdot \frac{-\frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{(2x+1)^{3/2}}}{1 + \frac{1}{2x+1}} - \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2x+1}} \cdot x - \sqrt{2x+1}}{1 + \frac{2x+1}{x^2}}$$

La dérivée est nulle après simplification. L'application est constante sur $]0, +\infty[$. On calcule sa valeur en 1 :

$$2 \cdot \text{Arctan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \text{Arctan}(\sqrt{3}) = 2 \cdot \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = 0$$

L'application est non seulement constante, elle est nulle.

Plus simple : on compare les deux membres en calculant la tangente de chacun.

$$\frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2x+1}}}{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2x+1}}\right)^2} \text{ et } \frac{\sqrt{2x+1}}{x}$$

il y a égalité. Les deux angles sont donc congrus modulo π . Le premier est entre 0 et $2 \cdot \frac{\pi}{2}$ et le second entre 0 et $\frac{\pi}{2}$. Il y a égalité.

On peut aussi poser $\theta = \text{Arctan}((2x+1)^{-1/2})$ et calculer $\tan(2\theta)$.

Il reste quand même à surveiller les domaines car on a juste une congruence modulo π .

Racines cubiques.

IS05

On va prouver $\sqrt[3]{\sqrt{2}-1} = \frac{1 - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{9}}$ en calculant le cube de chacun de ces deux nombres.

Si ils sont égaux, on pourra conclure.

Le membre de gauche a pour cube $\sqrt[3]{2}-1$ (positif).

Pour celui de droite, on a $\frac{(1 - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})^3}{9}$. On va avoir besoin d'initiative :

- développer $(a + b + c)^3$ (et trouver après calcul $a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3b^2a + 3b^2c + 3c^2a + 3c^2b + 6abc$)

- poser $x = \sqrt[3]{2}$

Finalement, on développe $(1 - x + x^2)^3$ et c'est plus simple, surtout si on tient compte de $x^3 = 2$:

$$(1 - x + x^2)^3 = \text{calcul} = x^6 - 3x^5 + 6x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 3x + 1 = 4 - 6x^2 + 12x - 7 \cdot 2 + 6x^2 - 3x + 1 = -9 + 9x$$

On divise par 9, il y a bien égalité.

Mais c'est quand même calculatoire.

Et si on lisait la petite indication. On va multiplier par $\sqrt[3]{2}+1$ (c'est bien $\sqrt[3]{(\sqrt[3]{2}+1)^3}$) dès le début.

A droite, on développe $(1 - x + x^2) \cdot (1 + x)$ et c'est classique

$$\frac{(1 - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}) \cdot (\sqrt[3]{2} + 1)}{\sqrt[3]{9}} = \frac{(\sqrt[3]{2} + 1) - (\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2}) + (\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{4})}{\sqrt[3]{9}} = \frac{\sqrt[3]{8} + 1}{\sqrt[3]{9}} = \frac{2 + 1}{\sqrt[3]{9}} = \frac{3}{3^{2/3}} = 3^{1/3}$$

A gauche, on calcule quitte à réunir sous le m^eme signe racine et à développer $(x+1)^3$:

$$\sqrt[3]{\sqrt{2}-1} \cdot \sqrt[3]{(\sqrt[3]{2}+1)^3} = \sqrt[3]{(\sqrt[3]{2}-1) \cdot (\sqrt[3]{2}+1)^3} = \sqrt[3]{(\sqrt[3]{2}-1) \cdot (2 + 3\sqrt[3]{4} + 3\sqrt[3]{2} + 1)}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt[3]{2}-1} \cdot \sqrt[3]{(\sqrt[3]{2}+1)^3} = \sqrt[3]{3 \cdot (\sqrt[3]{2}-1) \cdot (1+\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2})} = \sqrt[3]{3 \cdot (\sqrt[3]{8}-1)} = \sqrt[3]{3}$$

Bref, on a établi : $\sqrt[3]{(x-1)} \cdot \sqrt[3]{(x+1)^3} = \frac{1-x+x^2}{\sqrt[3]{9}} \cdot (x+1)$, il reste à simplifier par $x+1$ (non nul) pour conclure.

Scooby s'occupe de vos notes.

IS05

On remplace la liste L par une liste où toutes les ntes paires sont divisées par 2 (et les notes impaires sont conservées).

On se demande ensuite à quoi ça sert.

Fraction rationnelle.

IS05

Pour résoudre $\int_0^a \frac{5x^2 - 2x - 6}{x^3 - x^2 - 4x - 2} dx = \ln(3)$ d'inconnue a (dans un domaine bien choisi), on a faire tout ce qui semble en notre pouvoir : calculer l'intégrale en décomposant en éléments simples.

Première étape : les racines du dénominateur.

Une racine évidente égale à -1 : $(-1)^3 - 1 + 4 - 2 = 0$.

Une factorisation directe : $x^3 - x^2 - 4x - 2 = (x+1) \cdot (x^2 - 2x - 2)$.

Encore une ($\Delta = 13$ et donc $\delta = 2\sqrt{3}$) : $x^3 - x^2 - 4x - 2 = (x+1) \cdot (x-1-\sqrt{3}) \cdot (x-1+\sqrt{3})$.

Forme de la décomposition :

$$\frac{5x^2 - 2x - 6}{x^3 - x^2 - 4x - 2} = \frac{5x^2 - 2x - 6}{(x+1) \cdot (x-1-\sqrt{3}) \cdot (x-1+\sqrt{3})} = \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta}{x-1-\sqrt{3}} + \frac{\gamma}{x-1+\sqrt{3}}$$

Coefficients par la méthode des pôles

$$\frac{5x^2 - 2x - 6}{(x-1-\sqrt{3}) \cdot (x-1+\sqrt{3})} = \alpha + \frac{\beta \cdot (x+1)}{x-1-\sqrt{3}} + \frac{\gamma \cdot (x+1)}{x-1+\sqrt{3}}$$

$$\text{et donc } \alpha = \frac{5 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) - 6}{((-1)^2 - 2 \cdot (-1) - 2)} = 1.$$

Les autres ont l'air plus laids, mais tout va bien à la fin :

$$\beta = \frac{5 \cdot (1+\sqrt{3})^2 - 2 \cdot (1+\sqrt{3}) - 6}{(1+\sqrt{3}+1) \cdot (1+\sqrt{3}-1+\sqrt{3})} = \frac{(5 \cdot 1 + 5 \cdot 3 - 2 - 6) + \sqrt{3} \cdot (5 \cdot 2 - 2)}{4 \cdot \sqrt{3} + 6} = 2$$

De même $\gamma = 2$. Soulagement :

$$\frac{5x^2 - 2x - 6}{x^3 - x^2 - 4x - 2} = \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1-\sqrt{3}} + \frac{2}{x-1+\sqrt{3}} = \frac{1}{x+1} + \frac{4x-4}{x^2-2x-2}$$

Sur un intervalle ne contenant aucun des pôles (et contenant 0) on peut intégrer en séparant par linéarité :

$$\int_0^a \frac{5x^2 - 2x - 6}{x^3 - x^2 - 4x - 2} dx = \int_0^a \frac{1}{x+1} dx + \int_0^a \frac{2}{x-1-\sqrt{3}} dx + \int_0^a \frac{2}{x-1+\sqrt{3}} dx$$

Après calcul des logarithmes, l'équation devient

$$\ln(a+1) + 2 \cdot \ln\left(\frac{a-1-\sqrt{3}}{-1-\sqrt{3}}\right) + 2 \cdot \ln\left(\frac{a-1+\sqrt{3}}{-1+\sqrt{3}}\right) = \ln(3)$$

Si on y tient, on remplace $2 \cdot \ln(a-1-\sqrt{3})$ par $\ln((a-1-\sqrt{3})^2)$ pour éviter les signes négatifs.

On passe à l'exponentielle (bijective entre $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^{+*}$) :

$$(a+1) \cdot \frac{(a-1-\sqrt{3})^2 \cdot (a-1+\sqrt{3})^2}{(-1-\sqrt{3})^2 \cdot (-1+\sqrt{3})^2} = 3$$

On résout $(a + 1).(a^2 - 2.a - 2)^2 = 12$.

J'ai une racine évidente : 2. Je crains de ne pas trouver les autres, devant résoudre $a^4 - a^3 - 6.a^2 - 4.a + 4 = 0$ d'inconnue a .

Mais déjà, $a = 2$ fait que entre 0 et 2 il n'y a ni -1 ni $1 + \sqrt{3}$ ni $1 - \sqrt{3}$. l'intégrale existe au vaut bien $\ln(3)$.

LYCEE CHARLEMAGNE
M.P.S.I.2

2023

IS05
26- points

2024