0.1 Ce qu'il faut savoir sur les intégrales de Wallis.

0.1.1 Leur définition

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t).dt = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t).dt$$

Les deux définitions coïncident, par changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - t$ qui transforme les sinus en cosinus et vice versa.

On pourra généraliser à des exposants non entiers. Mais les formules avec des factorielles perdront leur signification, et l'exposant devra demeurer strictement plus grand que -1 . Le cas des exposants complexes ne fait l'objet d'aucun problème de concours.

0.1.2 Monotonie

La suite est décroissante ; en effet, pour n donné quelconque

$$W_n - W_{n+1} = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t).(1 - \sin(t)).dt$$

et tout est positif dans cette intégrale.

En tant que suite positive décroissante, elle converge, mais sa convergence vers 0 quand n tend vers l'infini n'est pas directement obtenue avec juste ces propriétés, sauf à utiliser un théorème de seconde année.

0.1.3 Intégration par parties

On relie W_{n+1} à W_{n-1} en intégrant par parties et en remplaçant $\cos^2(t)$ par $1 - \sin^2(t)$

$$W_{n+1} = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t). \sin(t).dt = \left[-\cos(t). \sin^n(t) \right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (n. \sin^{n-1}(t). \cos(t)).(-\cos(t)).dt$$

On a réparti

$\sin^n(t)$	$\leftrightarrow$	$n. \sin^{n-1}(t). \cos(t)$
$\sin(t)$	$\leftrightarrow$	$-\cos(t)$

$$W_{n+1} = n. \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1}(t). \cos^2(t).dt = n. \int_0^{\pi/2} (\sin^{n-1}(t) - \sin^{n+1}(t)).dt$$

La relation $W_{n+1} = n.(W_{n-1} - W_{n+1})$ donne alors

$$W_{n+1} = \frac{n}{n+1}.W_{n-1}$$

On va avancer de deux en deux. Et on constate la décroissance des deux sous-suites $W_{2,p}$ et $W_{2,p+1}$.

0.1.4 Lien avec les coefficients binomiaux

On calcule les deux premiers termes (voire plus avec $\sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2.t)}{2}$), puis les suivants avec la formule précédente.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	$2.n - 1$	$2.n$	$2.n + 1$	$2.n + 2$
		$\times \frac{1}{2}$		$\times \frac{3}{4}$		$\times \frac{5}{6}$		$\times \dots$				$\times \frac{(2.n+1)}{(2.n+2)}$
W_n	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3}{2.4} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3.5}{2.4.6} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3.5.7}{2.4.6.8} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3.5.7.9}{2.4.6.8.10} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3.5.7.9.11}{2.4.6.8.10.12} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3.5.7.9.11.13}{2.4.6.8.10.12.14} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3 \dots (2.n-1)}{2.4 \dots (2.n)} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3 \dots (2.n)}{2.4 \dots (2.n+1)} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3 \dots (2.n-1)}{2.4 \dots (2.n)} \cdot \frac{\pi}{2}$	$\frac{1.3 \dots (2.n+1)}{2.4 \dots (2.n+2)} \cdot \frac{\pi}{2}$
		1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2.4}{3.5}$	$\frac{2.4.6}{3.5.7}$	$\frac{2.4.6.8}{3.5.7.9}$	$\frac{2.4.6.8.10}{3.5.7.9.11}$	$\frac{2.4.6.8.10.12}{3.5.7.9.11.13}$	$\frac{2.4 \dots (2.n-2)}{3.5 \dots (2.n-1)}$	$\frac{2.4 \dots (2.n-1)}{3.5 \dots (2.n)}$	$\frac{2.4 \dots (2.n)}{3.5 \dots (2.n+1)}$	$\frac{2.4 \dots (2.n+1)}{3.5 \dots (2.n+2)}$
		$\times \frac{2}{3}$		$\times \frac{4}{5}$		$\times \frac{6}{7}$		$\times \dots$				$\times \frac{(2.n)}{(2.n+1)}$

On émet deux conjectures qu'on démontre par récurrence sur p :

$$W_{2,p} = \frac{1.3.5 \dots (2.p-1)}{2.4.6 \dots (2.p)} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\text{impairs}}{\text{pairs}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot \prod_{k=1}^p \frac{2.k-1}{2.k}$$

$$W_{2,p+1} = \frac{2.4.6 \dots (2.p)}{3.5.7 \dots (2.p+1)} = \frac{\text{pairs}}{\text{impairs}} = \prod_{k=1}^p \frac{2.k}{2.k+1}$$

Mais il y a mieux ensuite, en sortant autant de facteurs 2 qu'il faut

$$\boxed{2 \times 4 \times 6 \dots \times 2.p = \frac{1 \times 2 \times 3 \dots \times p}{\times 2 \times 2 \times 2 \dots \times 2} = \frac{p!}{\times 2^p}}$$

ou en insérant les termes qui manquent pour créer des factorielles

$$\boxed{1 \times 3 \times 5 \times 7 \dots \times 2.p-1 = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \dots \times 2.p-1 \times 2.p}{\times 2 \times 4 \times 6 \times 8 \dots \times 2.p} = \frac{(2.p)!}{2^p.p!}}$$

$$W_{2,p} = \frac{(2.p)!}{2^{2.p+1} \cdot (p!)^2} \cdot \pi \text{ et } W_{2,p+1} = \frac{2^{2.p} \cdot (p!)^2}{(2.p+1)!}$$

On peut aussi les proposer et valider par récurrence sur p .

Dans ces formules, on reconnaît

$$\frac{(2.n)!}{(n!)^2} = \frac{(2.n)!}{n!.n!} = \binom{2.n}{n}$$

et même $\frac{(2.n)!}{2^{2.n} \cdot (n!)^2} = \frac{1}{2^{2.n}} \cdot \binom{2.n}{n}$ en lien avec la loi binomiale de paramètre $\frac{1}{2}$.

0.1.5 Une suite constante

La relation $W_{n+1} = \frac{n}{n+1} \cdot W_{n-1}$ donne $(n+1) \cdot W_{n+1} = n \cdot W_{n-1}$ puis

$$(n+1) \cdot W_{n+1} \cdot W_n = n \cdot W_n \cdot W_{n-1}$$

La suite $(a_n) = (n \cdot W_n \cdot W_{n-1})$ est donc constante. Sa valeur pour n égal à 1 donne donc : $\forall n \in \mathbb{N}, n \cdot W_n \cdot W_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ et elle servira pour l'équivalent de W_n quand n tend vers l'infini.

On a aussi ce résultat avec les formules précédentes $W_{2,p} = \dots$ et $W_{2,p+1} = \dots$ par disjonction de cas. Mais c'est inutile et lourd.

0.1.6 Équivalent

On part de l'encadrement « décroissance » : $W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}$ qu'on multiplie par $n \cdot W_n$ (positif)

$$n \cdot W_{n+1} \cdot W_n \leq n \cdot (W_n)^2 \leq n \cdot W_{n-1} \cdot W_n$$

Avec la question précédente, on remplace $n \cdot W_n \cdot W_{n-1}$ par $\frac{\pi}{2}$ et $n \cdot W_{n+1} \cdot W_n$ par $\frac{n}{n+1} \cdot (n+1) \cdot W_{n+1} \cdot W_n$

$$\frac{n}{n+1} \cdot \frac{\pi}{2} \leq n \cdot (W_n)^2 \leq \frac{\pi}{2}$$

Le théorème des gendarmes permet de dire que $n \cdot (W_n)^2$ converge vers $\frac{\pi}{2}$. Par passage à la racine et division $\sqrt{\frac{2.n}{\pi}} \cdot W_n$ converge vers 1. On revient à la définition des équivalents :

$$W_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{2.n}}$$

Ce résultat est valable aussi pour n réel tendant vers l'infini.

0.1.7 Inégalité supplémentaire

On rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left(\int_a^b f(t) \cdot g(t) \cdot dt \right)^2 \leq \int_a^b (f(t))^2 \cdot dt \cdot \int_a^b (g(t))^2 \cdot dt$$

pour f et g continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

Il suffit d'étudier le signe du trinôme du second degré

$$X^2 \cdot \left(\int_a^b (f(t))^2 \cdot dt \right) - 2 \cdot X \cdot \left(\int_a^b f(t) \cdot g(t) \cdot dt \right) + \left(\int_a^b (g(t))^2 \cdot dt \right)$$

qui est positif car c'est $\left(\int_a^b (X \cdot f(t) - g(t))^2 \cdot dt \right)$. On en déduit que son discriminant est négatif ou nul, et c'est notre inégalité.

Si on l'applique à des puissances du sinus, on obtient pour tout couple (p, q)

$$(W_{p+q})^2 \leq W_{2,p} \cdot W_{2,q}$$

0.2 Ce que l'on sait aussi sur les intégrales de Wallis

0.2.1 Produit infini donnant π

On exploite à nouveau la décroissance on a pour tout $n : W_{2,n+2} \leq W_{2,n+1} \leq W_{2,n}$, puis après division et avec toujours la même relation de récurrence

$$\frac{2 \cdot n + 1}{2 \cdot n + 2} = \frac{W_{2,n+2}}{W_{2,n}} \leq \frac{W_{2,n+1}}{W_{2,n}} \leq 1$$

Par encadrement, $\frac{W_{2,n+1}}{W_{2,n}}$ tend vers 1 quand n tend vers l'infini.

On revient aux formes multiplicatives :

$$\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2 \cdot n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2 \cdot n + 1)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2 \cdot p - 1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2 \cdot p)} \cdot \frac{\pi}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

On isole la constante qui nous intéresse

$$\frac{\prod_{k=1}^n \frac{2 \cdot k}{2 \cdot k + 1}}{\prod_{k=1}^n \frac{2 \cdot k - 1}{2 \cdot k}} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2 \cdot n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2 \cdot n + 1)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2 \cdot p - 1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2 \cdot p)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$$

En regroupant les deux produits $\prod_{k=1}^n \frac{4 \cdot k^2}{(4 \cdot k - 1) \cdot (4 \cdot k + 1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$ et en l'écrivant abusivement avec le passage à une infinité de termes

$$\frac{4}{3} \times \frac{16}{15} \times \frac{36}{35} \times \frac{64}{63} \times \dots \times \frac{4 \cdot k^2}{4 \cdot k^2 - 1} \times \dots = \frac{\pi}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \times \frac{6 \cdot 6}{5 \cdot 7} \times \frac{8 \cdot 8}{7 \cdot 9} \times \dots \times \frac{(2 \cdot k) \cdot (2 \cdot k)}{(2 \cdot k - 1) \cdot (2 \cdot k + 1)} \times \dots$$

Cette formule a été proposée par John Wallis en 1656, mais n'ayant aucune utilité pour calculer π .

Il faut en effet mille cinq cent termes pour arriver à 3, 141 à 10^{-3} près.

0.2.2 Application à « factorielle de $\frac{1}{2}$ »

La suite factorielle de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ vérifie trois propriétés

$$(0! = 1), (\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)! = (n+1) \times n!), (\forall (a, b, c) \in \mathbb{N}^3, a \leq b \leq c \Rightarrow \left(\frac{b!}{a!}\right)^{c-b} \leq \left(\frac{c!}{b!}\right)^{b-a})$$

Les deux premiers correspondant à la définition. La dernière¹ repose sur

$$\left(\frac{b!}{a!}\right)^{c-b} = \left(\prod_{k=a+1}^b k\right)^{c-b} \leq \left(\prod_{k=a+1}^b b\right)^{c-b} = (b^{b-a})^{c-b} = \left(\prod_{k=b+1}^c b\right)^{b-a} \leq \left(\prod_{k=b+1}^c k\right)^{b-a} \leq \left(\frac{c!}{b!}\right)^{b-a}$$

1. c'est la convexité logarithmique

On va alors chercher alors à généraliser avec une application de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant

$$(f(0) = 1), (\forall x \in \mathbb{R}^+, f(x+1) = (x+1) \times f(x), (\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, 0 \leq a \leq b \leq c \Rightarrow \left(\frac{f(b)}{f(a)}\right)^{c-b} \leq \left(\frac{f(c)}{f(b)}\right)^{b-a})$$

Si une telle application existe (et on pourrait prouver existence et unicité), alors elle coïncide avec la factorielle sur $\mathbb{N}$ et en donne une « belle » généralisation à $[0, +\infty[$ (et même $] -1, +\infty[$). On va travailler en admettant son existence et on va calculer alors $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

Déjà, en mettant en boucle la formule $\forall x \in \mathbb{R}^+, f(x+1) = (x+1) \times f(x)$, on trouve par récurrence sur n

$$f\left(\frac{1}{2} + n\right) = \frac{3 \times 5 \times 7 \times \dots \times (2n+1)}{2^n} \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n+1)!}{2^{2n} \cdot n!} \cdot f\left(\frac{1}{2}\right)$$

On écrit ensuite la dernière inégalité pour deux triplets $n \leq n + \frac{1}{2} \leq n+1$ puis $n - \frac{1}{2} \leq n \leq n + \frac{1}{2}$

$$\sqrt{\frac{f\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n!}} \leq \sqrt{\frac{(n+1)!}{f\left(n + \frac{1}{2}\right)}} \text{ et } \sqrt{\frac{n!}{f\left(n - \frac{1}{2}\right)}} \leq \sqrt{\frac{f\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n!}}$$

On effectue des produits en croix

$$\frac{(2n+1)!}{2^{2n} \cdot n!} \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2} + n\right) \leq \sqrt{n! \cdot (n+1)!} = n! \cdot \sqrt{n+1} \text{ et } n! \leq \sqrt{f\left(n - \frac{1}{2}\right) \cdot f\left(n + \frac{1}{2}\right)} = \frac{f\left(n + \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{n + \frac{1}{2}}}$$

On isole et on retrouve une intégrale de Wallis

$$f\left(\frac{1}{2}\right) \leq \frac{2^{2n} \cdot (n!)^2}{(2n+1)!} \cdot \sqrt{n+1} = \frac{\sqrt{n+1}}{W_{2n+1}} \text{ et } \frac{2^{2n} \cdot (n!)^2}{(2n+1)!} \cdot \sqrt{n + \frac{1}{2}} \leq f\left(\frac{1}{2}\right)$$

On passe à la limite en rappelant l'équivalent trouvé : $\frac{W_{2n+1}}{\sqrt{2n+1}}$ tend vers $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$; on trouve une double inégalité

$$f\left(\frac{1}{2}\right) \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{ et } \frac{\sqrt{\pi}}{2} \leq f\left(\frac{1}{2}\right)$$

qui se solde par une valeur exacte.

Vous pouvez d'ailleurs la demander à votre calculatrice. Suivant le modèle, elle donne la bonne réponse, une réponse approchée ou pas de réponse du tout.

L'exercice peut se prolonger en notant que la formule $n! = \int_0^{+\infty} t^n \cdot e^{-t} \cdot dt$ est valable pour n entier (calculer pour $n = 0$ et intégrer ensuite par parties) et donne une fonction logarithmiquement convexe (utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz). On peut donc généraliser à l'exposant $\frac{1}{2}$ avec une notation abusive

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)! = \int_0^{+\infty} \sqrt{t} \cdot e^{-t} \cdot dt$$

Le changement de variable $u = \sqrt{t}$ conduit alors à l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} \cdot du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (après une intégration par parties).

On en profite pour rappeler qu'on ne dispose pas de primitive de $u \mapsto e^{-u^2}$ à l'aide des fonctions usuelles. C'est seulement quand on la calcule de 0 à l'infini que le résultat devient simple.

0.2.3 Application à la somme $\zeta(2)$

Le réel $\zeta(2)$ est la somme (infinie) de la série de terme général $\frac{1}{n^2}$. En langage plus direct :

$$\zeta(2) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}$$

Cette somme vaut $\frac{\pi^2}{6}$, ce qui peut se prouver de multiples façons. Le calcul de cette valeur est appelé « problème de Bâle » et a été résolu par Leonhard Euler en 1735.

La convergence est assurée par croissance de $(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2})_{N \in \mathbb{N}}$ et majoration par $(1 + \sum_{n=2}^N \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n})_{N \in \mathbb{N}}$. Ou par comparaison série intégrale.

On définit $J_n = \int_0^{\pi/2} t^2 \cdot \cos^{2n}(t) \cdot dt$ et $K_n = \frac{J_n}{W_{2,n}}$.

En fusionnant en une intégrale et en remplaçant $1 - \cos^2(t)$ par $\sin^2(t)$ on obtient

$$J_{n-1} - J_n = \int_0^{\pi/2} t^2 \cdot \cos^{2n-2}(t) \cdot \sin^2(t) \cdot dt$$

En intégrant par parties $W_{2,n} = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n}(t) \cdot dt$ avec

$\cos^{2n}(t)$	$\leftrightarrow$	$-2 \cdot n \cdot \cos^{2n-1}(t) \cdot \sin(t)$
1	$\leftrightarrow$	t

 on trouve

$$W_{2,n} = 2 \cdot n \cdot \int_0^{\pi/2} t \cdot \cos^{2n-1}(t) \cdot \sin(t) \cdot dt$$

En intégrant encore par parties, on trouve

$$J_{n-1} - J_n = \frac{1}{2 \cdot n - 1} \cdot \left(\frac{W_{2,n}}{n} + J_n \right)$$

En divisant par $W_{2,n}$, on obtient

$$\frac{J_{n-1}}{W_{2,n}} - K_n = \frac{1}{2 \cdot n - 1} \cdot \left(\frac{1}{n} + K_n \right)$$

puis

$$K_{n-1} - K_n = \frac{1}{2 \cdot n^2}$$

On somme alors ces $K_{n-1} - K_n$ pour n de 1 à N (somme télescopique) et on calcule K_0 :

$$\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} = K_0 - K_N = \frac{\pi^2}{12} - K_N$$

Il ne reste plus qu'à faire tendre K_N vers 0 quand n tend vers l'infini.

Pour cela, on montre par variation de fonction différence $\forall t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $t \leq \frac{\pi}{2} \cdot \sin(t)$.

Ceci permet d'obtenir ensuite $0 \leq J_n \leq \frac{\pi^2}{8 \cdot (n+1)} \cdot I_n$ et enfin $0 \leq K_n \leq \frac{\pi^2}{8 \cdot (n+1)}$.

0.2.4 Application à la formule de Stirling

Les intégrales de Wallis vont juste servir à la fin de cet exercice à déterminer la constante $\sqrt{2 \cdot \pi}$ dans le célèbre équivalent

$$n! \sim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{e} \right)^n \cdot \sqrt{2 \cdot n \cdot \pi}$$

On définit les suites a et b par

$$a_n = \ln \left(\frac{(n/e)^n \cdot \sqrt{n}}{n!} \right) \text{ et } b_n = a_n + \frac{1}{12 \cdot (n-1)}$$

pour tout n . On montre qu'elles forment un couple de suites adjacentes :

$$a_1 \leq a_2 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq \dots \leq b_2$$

et $b_n - a_n \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.

Par théorème², elles convergent vers une limite commune, qu'on va noter λ .

Mais alors $2.a_n - a_{2.n}$ va aussi converger vers $2.\lambda - \lambda$ c'est à dire vers λ .

Or, le calcul de $2.a_n - a_{2.n}$ donne $\ln \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \cdot \frac{(2.n)!}{2^{2.n} \cdot (n!)^2} \right)$ c'est à dire $\ln \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot W_{2.n} \right)$

L'équivalent de l'intégrale de Wallis $W_{2.n} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (2.n)}{\pi}} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 1$ donne donc $2.a_n - a_{2.n} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2.\pi}} \right)$.

On a la valeur de λ . On peut reporter : $\ln \left(\frac{(n/e)^n \cdot \sqrt{n}}{n!} \right) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2.\pi}} \right)$ puis passer à l'exponentielle (continue) et renverser $\frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{2.n.\pi}} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 1$ et c'est la définition de l'équivalent dit de Stirling.

Initialement la formule $n! \sim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{n} \cdot \lambda$ a été obtenue par Abraham de Moivre (avec une constante λ à déterminer) en 1730 soit 24 ans avant sa mort³. C'est Stirling qui avec les travaux de Wallis réussit à établir $C = 2.\pi$.

0.2.5 Volume de la sphère de l'espace de dimension n

Dans $\mathbb{R}^n$ (là où les points ont n coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$) on peut définir la sphère centrée sur l'origine et de rayon R : ensemble des points vérifiant $\sqrt{(x_1)^2 + (x_2)^2 + \dots + (x_n)^2} \leq R$.

Et on peut en calculer le « volume » (le « cube » unité $[0, 1]^n$ a pour volume 1, le cube $[0, R]^n$ a pour volume R^n par homogénéité).

La forme de la sphère dépend de la dimension n de l'espace

dimension	0	1	2	3	4
forme	point	segment $[-R, R]$	disque de rayon R	sphère de rayon R	truc de rayon R
« volume »	1	$2.R$	$\pi.R^2$	$4.\pi.R^3/3$	à voir

Comment obtient on le « célèbre » $\frac{4}{3}.\pi.R^3$?

On fait des coupes à z constant. On obtient à chaque fois un disque de rayon $\sqrt{R^2 - z^2}$ (cf. dessin et théorème de Pythagore).

Chaque disque a pour aire $\pi.(R^2 - z^2)$. La coupe a pour volume élémentaire $\pi.(R^2 - z^2).dz$ et on somme (on intègre) de $z = -R$ à $z = R$.

$$V_3(R) = \int_{-R}^R \pi.(R^2 - z^2).dz = \pi. \left[R^2.z - \frac{z^3}{3} \right]_{-R}^R = \pi. \frac{4.R^3}{3}$$

On va reprendre la même idée pour calculer le volume de la boule en dimension $n + 1$ de rayon R .

La dernière composante x_{n+1} peut varier de $-R$ à R . Et la coupe à x_{n+1} fixé a pour équation $(x_1)^2 + \dots + (x_n)^2 = R^2 - (x_{n+1})^2$. C'est une boule de dimension n et de rayon $\sqrt{R^2 - (x_{n+1})^2}$.

2. en fait, simplement, (a_n) est croissante, majorée par b_1 donc elle converge vers son plus petit majorant

3. de Moivre est connu pour avoir prédit le jour de sa mort : il comptait qu'il dormait quinze minutes de plus chaque nuit. Sommant cette progression arithmétique, il en déduisit qu'il mourrait lorsque ses nuits feraient vingt-quatre heures. Ce qui se produisit bel et bien.

Le volume de la boule de dimension $n + 1$ est donc

$$V_{n+1}(R) = \int_{x=-R}^R V_n(\sqrt{R^2 - x^2}) \cdot dx = \int_{x=-R}^R (\sqrt{R^2 - x^2})^n \cdot V_n(1) \cdot dx$$

A la deuxième étape, on a sorti $(\sqrt{R^2 - x^2})^n$ par homogénéité.

On a donc en particulier

$$V_{n+1}(1) = V_n(1) \cdot \int_{-1}^1 (1 - x^2)^{n/2} \cdot dx$$

Par parité l'intégrale $\int_{-1}^1 (1 - x^2)^{n/2} \cdot dx$ vaut $2 \cdot \int_0^1 (1 - x^2)^{n/2} \cdot dx$. On change ensuite de variable avec $x = \sin(\theta)$.

L'intégrale devient $2 \cdot \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2(\theta))^{n/2} \cdot \cos(\theta) \cdot d\theta$ et on reconnaît $2 \cdot W_{n+1}$ après avoir remplacé $\sqrt{1 - \sin^2}$ par $\cos$ (sur notre intervalle).

On a donc la relation de récurrence

$$V_{n+1}(R) = 2 \cdot W_{n+1} \cdot V_n(R)$$

Cette relation permet de calculer les volumes $V_n(1)$ de proche en proche, puis les volumes $V_n(R)$ par homogénéité

$n = 2 \cdot p$	$n = 2 \cdot p + 1$
$V_{2 \cdot p}(R) = \frac{\pi^p \cdot R^{2 \cdot p}}{p!}$	$V_{2 \cdot p + 1}(R) = 2^{p+1} \cdot \frac{\pi^p \cdot R^{2 \cdot p + 1}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2 \cdot p + 1)}$

On notera que ces « volumes » tendent vers 0 quand la dimension n tend vers l'infini.

Ce n'est pas si surprenant, alors que le volume du cube unité reste égal à 1.

On notera quand même que la grande diagonale du cube unité vaut $\sqrt{n}$ et tend vers l'infini.

0.2.6 Factorisation d'Euler du sinus

$$F_N(x) = x \cdot \prod_{k=1}^N \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right)$$

$$F(1/2) = 1/\pi$$