

Résumé de cours :
Semaine 23 : lundi 18 et mercredi 20 mars.

Dérivation (suite)

E désigne un \mathbb{K} -espace vectoriel normé, I un intervalle d'intérieur non vide et f une application de I dans E .

1 L'égalité des accroissements finis (suite)

Dans ce paragraphe, toutes les applications utilisées sont définies sur I et sont à valeurs dans \mathbb{R} .

1.1 Le lemme de Rolle (suite)

Remarque. Le lemme de Rolle est faux pour une application à valeur dans \mathbb{C} : prendre $\begin{matrix} [0, 2\pi] & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ \theta & \longmapsto & e^{i\theta}. \end{matrix}$

Un exercice à connaître : On dit qu'un polynôme P de $\mathbb{R}[X]$ est simplement scindé dans $\mathbb{R}[X]$ si et seulement si il se décompose sous la forme $P(x) = \lambda \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$, où $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ avec $i \neq j \implies \alpha_i \neq \alpha_j$. Si P est simplement scindé dans $\mathbb{R}[X]$, alors P' l'est aussi.

Théorème de Rolle généralisé (Hors programme).

Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ avec $a < b$. Si f est dérivable sur $]a, b[$ et si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Il faut savoir le démontrer.

1.2 L'égalité des accroissements finis

Théorème des accroissements finis (TAF). Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq b$. Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe c dans $]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.

Il faut savoir le démontrer.

1.3 Théorème de la limite de la dérivée

TLD : Si f est continue sur I , dérivable (resp : de classe C^1) sur $I \setminus \{a\}$ et s'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que $f'(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{x \in I \setminus \{a\}} l$, alors f est dérivable (resp : de classe C^1) sur I , avec $f'(a) = l$.

Il faut savoir le démontrer.

Remarque. Il faut savoir montrer que, si f est continue sur I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et si $f'(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{x \in I \setminus \{a\}} +\infty$, alors f n'est pas dérivable en a .

Remarque. Ce théorème est encore valable pour une fonction à valeurs dans un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie.

TLD : Généralisation aux dérivées d'ordre supérieur. Soient $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Si f est continue sur I , à valeurs dans un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie, si f est de classe C^k sur $I \setminus \{a\}$ et si, pour tout $h \in [1, k] \cap \mathbb{N}$, il existe $l_h \in \mathbb{R}$ tel que $f^{(h)}(x) \xrightarrow[x \in I \setminus \{a\}]{x \rightarrow a} l_h$, alors f est de classe C^k sur I .

2 Formules de Taylor

2.1 L'égalité de Taylor-Lagrange (hors programme)

Théorème. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est C^n sur $[a, b]$ et $n + 1$ fois dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$.

Il faut savoir le démontrer.

2.2 L'inégalité des accroissements finis (IAF)

Théorème. Inégalité des accroissements finis (IAF)

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ est C^1 sur $[a, b]$, alors $|f(b) - f(a)| \leq \lambda |b - a|$, où $\lambda = \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)|$.

Corollaire. Soient $k \in \mathbb{R}_+$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ de classe C^1 .

Alors f est k -lipschitzienne si et seulement si pour tout $x \in [a, b]$, $|f'(x)| \leq k$.

2.3 Formules de Taylor

2.3.1 TRI et inégalité de TL

Théorème. Formule de Taylor avec reste intégral. Soient $k \in \mathbb{N}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K} C^{k+1}$.

Alors $f(b) = f(a) + \sum_{h=1}^k \frac{(b-a)^h}{h!} f^{(h)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt$.

Théorème. Inégalité de Taylor-Lagrange. Soient $k \in \mathbb{N}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K} C^{k+1}$.

Alors $|f(b) - f(a) - \sum_{h=1}^k \frac{(b-a)^h}{h!} f^{(h)}(a)| \leq \lambda \frac{|b-a|^{k+1}}{(k+1)!}$, où $\lambda = \sup_{x \in [a, b]} |f^{(k+1)}(x)|$.

2.3.2 Primitivation d'un développement limité

Lemme. Soit $k \in \mathbb{N}$. Au voisinage de a , $\int_a^x o((t-a)^k) dt = o((x-a)^{k+1})$.

Il faut savoir le démontrer.

Théorème. Primitivation d'un développement limité. Soient $a \in I$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une application de classe C^1 . Soit $k \in \mathbb{N}$. Si, au voisinage de a ,

$f'(x) = \sum_{h=0}^k \alpha_h (x-a)^h + o((x-a)^k)$, alors $f(x) = f(a) + \sum_{h=0}^k \frac{\alpha_h}{h+1} (x-a)^{h+1} + o((x-a)^{k+1})$.

2.3.3 Formule de TY

Formule de Taylor-Young. Si f est k fois dérivable en a , alors au voisinage de a ,

$$f(x) = f(a) + \sum_{h=1}^k \frac{(x-a)^h}{h!} f^{(h)}(a) + o((x-a)^k).$$

Propriété. (Hors programme ?) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application deux fois dérivable en un point a de $\overset{\circ}{I}$. On suppose que $f'(a) = 0$ et que $f''(a) > 0$. Alors a est un minimum local strict : il existe un voisinage V de a tel que pour tout $t \in V \cap I \setminus \{a\}$, $f(t) > f(a)$.

3 Monotonie et dérivabilité

Ici les applications utilisées sont à valeurs dans \mathbb{R} .

3.1 Sens de variation

Théorème. f est constante si et seulement si $f' = 0$, elle est croissante si et seulement si $f' \geq 0$ et elle est décroissante si et seulement si $f' \leq 0$.

Il faut savoir le démontrer.

Propriété. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et croissante. Alors f est strictement croissante si et seulement si $\{x \in I / f'(x) = 0\}$ est d'intérieur vide. En particulier, si $f(x) > 0$ pour tout $x \in I$ sauf pour un nombre fini d'éléments de I , alors f est strictement croissante.

3.2 Difféomorphismes

Théorème. Supposons que f est dérivable et strictement monotone. Soit $t \in I$.

f^{-1} est dérivable en $f(t)$ si et seulement si $f'(t) \neq 0$, et dans ce cas $(f^{-1})'(f(t)) = \frac{1}{f'(t)}$.

Lorsque $[\forall t \in I, f'(t) \neq 0]$, $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Il faut savoir le démontrer.

Définition. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $f : I \rightarrow J$ est un C^n -difféomorphisme si et seulement si f est bijective, de classe C^n et si f^{-1} est aussi de classe C^n .

Propriété. f est un C^n -difféomorphisme de I dans $f(I)$ si et seulement si f est de classe C^n et si $[\forall t \in I, f'(t) \neq 0]$.

Il faut savoir le démontrer.

4 Suites récurrentes d'ordre 1

On souhaite étudier une suite (x_n) vérifiant $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_{n+1} = f(x_n)$.

En étudiant l'application f , supposons que l'on ait déterminé un intervalle I tel que $f : I \rightarrow I$ est continue et monotone, avec $x_0 \in I$.

Représentation graphique de (x_n) : **À connaître .**

Propriété. Les valeurs possibles pour la limite de x_n sont les points fixes de $f|_I$ et les bornes de I qui n'appartiennent pas à I .

Propriété. Si $f|_I$ est croissante, alors (x_n) est monotone.

Plus précisément, (x_n) est croissante si et seulement si $f(x_0) - x_0 \geq 0$,

et (x_n) est décroissante si et seulement si $f(x_0) - x_0 \leq 0$.

Il faut savoir le démontrer.

Propriété. On suppose que $f|_I$ est croissante. Soit $l \in I$ un point fixe de f .

Si $x_0 \leq l$, alors $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq l$. Si $x_0 \geq l$, alors $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \geq l$.

Il faut savoir le démontrer.

Propriété. On suppose que $f|_I$ est décroissante. Alors $(f \circ f)|_I$ est croissante, donc les deux suites (x_{2n}) et (x_{2n+1}) sont monotones et de sens contraires.

Il faut savoir le démontrer.

Propriété. Soit $f : I \rightarrow I$ une application de classe C^1 et $\ell \in I$ tel que $f(\ell) = \ell$.

Si $|f'(\ell)| < 1$, alors il existe $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, pour tout $x_0 \in]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$, $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$: ℓ est un point d'équilibre stable.

Si $|f'(\ell)| > 1$, alors il existe $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, pour tout $x_0 \in]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $x_N \notin]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$: ℓ est un point d'équilibre instable.

Il faut savoir le démontrer.

Plan d'étude d'une suite vérifiant $x_{n+1} = f(x_n)$:

- ◇ Représentez le tableau des variations de f .
- ◇ Lorsque le graphe de f est simple, visualisez le comportement de la suite (x_n) .
- ◇ Trouvez un intervalle I tel que $f(I) \subset I$ et $x_0 \in I$ et f est monotone et continue sur I .
- ◇ Recherchez les "limites éventuelles".
- ◇ Si f est croissante sur I , étudiez les signes de $f(x_0) - x_0$ et de $x_0 - l$ (où l est un point fixe), puis conclure.
- ◇ Si f est décroissante sur I , se ramener au cas précédent en considérant $f \circ f$, ou bien si l'on a conjecturé que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ et si $|f'(\ell)| < 1$, majorez $|x_{n+1} - \ell| = |f(x_n) - f(\ell)|$ à l'aide du TAF.

5 Fonctions convexes

5.1 Sous-espaces affines

Définition. Soient \mathcal{E} un \mathbb{K} -espace affine de direction E et \mathcal{F} une partie de \mathcal{E} .

\mathcal{F} est un **sous-espace affine** de \mathcal{E} si et seulement si il existe $A \in \mathcal{E}$ et un sous-espace vectoriel F de E tel que $\mathcal{F} = A + F = \{A + x \mid x \in F\}$. Dans ce cas, $F = \overrightarrow{MN} \mid M, N \in \mathcal{F}$: on dit que F est la direction du sous-espace affine \mathcal{F} . De plus, pour tout $B \in \mathcal{F}$, $\mathcal{F} = B + F$.

Exemples. Un singleton est un sous-espace affine dirigé par $\{0\}$.

Une droite affine de \mathcal{E} est de la forme $\mathcal{D} = A + \mathbb{K}x$, où $A \in \mathcal{E}$ et $x \in E \setminus \{0\}$.

Propriété. Soit E et F deux \mathbb{K} -espaces vectoriels et $f \in L(E, F)$. Soit $y \in F$. L'ensemble des solutions de l'équation linéaire $(E) : f(x) = y$ en l'inconnue $x \in E$, est ou bien vide, ou bien un sous-espace affine de E .

Définition. Deux sous-espaces affines sont parallèles si et seulement si ils ont la même direction.

Propriété. Soient \mathcal{E} un \mathbb{K} -espace affine de direction E et $(\mathcal{E}_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces affines de \mathcal{E} . Pour $i \in I$, on note E_i la direction de \mathcal{E}_i .

$\bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$ est ou bien \emptyset , ou bien un sous-espace affine de \mathcal{E} de direction $\bigcap_{i \in I} E_i$.

Définition. Soit \mathcal{E} un \mathbb{K} -espace affine de direction E . Un repère de \mathcal{E} est un couple $R = (O, b)$, où O est un point de \mathcal{E} , appelé l'origine du repère et où b est une base de E . Si $M \in \mathcal{E}$, les coordonnées de M dans le repère R sont les coordonnées du vecteur \overrightarrow{OM} dans la base b .

Définition. Si \mathcal{F} est un sous-espace affine de direction F , $\dim(\mathcal{F}) = \dim(F)$.

5.2 Barycentres et convexité

Notation. On fixe un espace affine \mathcal{E} , p points A_1, \dots, A_p de \mathcal{E} et p scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ dans \mathbb{K} .

Définition. On appelle fonction vectorielle de Leibniz l'application $\varphi : \mathcal{E} \rightarrow E$ définie par $\varphi(M) = \sum_{i=1}^p \lambda_i \overrightarrow{A_i M}$.

Définition. Lorsque $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 0$, φ est constante, et lorsque $\sum_{i=1}^p \lambda_i \neq 0$, φ est bijective. L'unique point G tel que $\varphi(G) = 0$ s'appelle alors le barycentre des $(A_i, \lambda_i)_{1 \leq i \leq p}$. On a donc $\sum_{i=1}^p \lambda_i \overrightarrow{G A_i} = 0$.

On en déduit que, pour tout $M \in \mathcal{E}$, $\overrightarrow{M G} = \frac{1}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \sum_{i=1}^p \lambda_i \overrightarrow{M A_i}$. On note $G \triangleq \frac{\lambda_1 A_1 + \dots + \lambda_p A_p}{\lambda_1 + \dots + \lambda_p}$.

Il faut savoir le démontrer.

Définition. Lorsque, pour tout $i \in \mathbb{N}_p$, $\lambda_i = 1$, G s'appelle l'isobarycentre des points A_1, \dots, A_p .

Propriété. Homogénéité du barycentre :

Si l'on remplace chaque λ_i par $\alpha \lambda_i$ où $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, G n'est pas modifié.