

MPSI 2
Programme des colles de mathématiques.
Semaine 6 : du mardi 12 novembre au vendredi 15.

Liste des questions de cours

- 1°) Forme irréductible d'un rationnel : montrer l'existence et l'unicité.
- 2°) Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.
- 3°) Montrer qu'une intersection d'intervalles est un intervalle.
- 4°) Énoncer et démontrer le corollaire de l'inégalité triangulaire.
- 5°) Énoncer et démontrer des formules donnant $\min(a, b)$ et $\max(a, b)$ en fonction de $|a - b|$.
- 6°) Montrer que \mathbb{R} est archimédien.
- 7°) Donner deux définitions d'une partie dense dans \mathbb{R} et montrer qu'elles sont équivalentes.
- 8°) Énoncer et démontrer les CNS de divisibilité de n par 2, 5, 10, 3, 9 et 11, en fonction du développement décimal de n .
- 9°) Si $(v_n)_{n \geq 1}$ est une suite de chiffres compris entre 0 et 9, montrer qu'on peut définir $x = \sum_{n=1}^{+\infty} v_n 10^{-n}$, où $x \in [0, 1]$. Montrer que $[x = 1 \iff (\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = 9)]$.
- 10°) Si le développement décimal de $x \in [0, 1[$ est périodique à partir d'un certain rang, montrer que x est un rationnel.
- 11°) Soit $x \in [0, 1[$. On suppose que x est rationnel. Montrer que le développement décimal de x est périodique à partir d'un certain rang.

Les thèmes de la semaine

1 Arithmétique sur \mathbb{Z}

En révision.

2 Les rationnels

Construction de \mathbb{Q} .

$(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un corps, c'est-à-dire que

- $(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un anneau,
- \mathbb{Q} n'est pas réduit à $\{0\}$ (on note $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$),
- \mathbb{Q} est commutatif,
- tout élément non nul de \mathbb{Q} est inversible : $\forall x \in \mathbb{Q}^*, \exists y \in \mathbb{Q}^*, xy = 1$.

Comme tout corps, \mathbb{Q} est intègre.

Ordre sur \mathbb{Q} , valeur absolue.

Forme irréductible d'une fraction rationnelle.

3 Les réels

3.1 Une caractérisation de \mathbb{R} .

Caractérisation de \mathbb{R} : (admise)

Il existe au moins un corps K totalement ordonné dans lequel toute partie non vide majorée admet une borne supérieure. Il est unique à un isomorphisme de corps ordonnés près.

Toute partie non vide minorée de \mathbb{R} possède une borne inférieure.

$$s = \sup(A) \iff [\forall a \in A, a \leq s] \wedge [\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, s - \varepsilon < a].$$
$$m = \inf(A) \iff [\forall a \in A, a \geq m] \wedge [\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, m + \varepsilon > a].$$

3.2 La droite réelle achevée

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

Toute partie de $\overline{\mathbb{R}}$ possède une borne supérieure et une borne inférieure.

3.3 Les intervalles

Définition. Intervalles ouverts et fermés, segments.

On dit que $A \subset \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si pour tout $a, b \in A$ avec $a < b$, $[a, b] \subset A$.
Les parties convexes de \mathbb{R} sont exactement ses intervalles.

Une intersection d'intervalles de \mathbb{R} est un intervalle de \mathbb{R} .

Une union d'intervalles possédant un point commun est un intervalle.

3.4 la valeur absolue

L'inégalité triangulaire et son corollaire.

Distance entre réels : $d(x, y) = |x - y|$. Inégalité triangulaire : $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

3.5 Propriétés usuelles des réels

\mathbb{R} est archimédien : Pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists n \in \mathbb{N}$, $na > b$.

Parties entières inférieure et supérieure.

$A \subset \mathbb{R}$ est dense dans \mathbb{R} ssi pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ avec $x < y$, il existe $a \in A$ tel que $x \leq a \leq y$,
ou bien ssi pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A telle que $a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$.

\mathbb{Q} et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans \mathbb{R} .

4 Développement décimal

4.1 Développement décimal d'un entier naturel

Développement d'un entier naturel en base a , où $a \in \mathbb{N}$ avec $a \geq 2$.

CNS de divisibilité par 2, 5, 10, 3, 9 et 11.

4.2 L'ensemble \mathbb{D} des nombres décimaux

Définition. $\mathbb{D} = \left\{ \frac{n}{10^k} / n \in \mathbb{Z} \text{ et } k \in \mathbb{N} \right\}$.

Développement décimal d'un élément de \mathbb{D} .

4.3 Approximation d'un réel

Définition d'une valeur approchée à ε près, éventuellement par défaut ou par excès.

Le réel x est approché par défaut à 10^{-p} près par le nombre décimal $\frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p}$.

4.4 Développement décimal d'un réel

Soit $a \in \mathbb{N}$ avec $a \geq 2$.

Si (v_n) est une suite de "chiffres" entre 0 et $a - 1$, définition de $x = \sum_{n=1}^{+\infty} v_n a^{-n} \in [0, 1]$: On dit que

$(v_n)_{n \geq 1}$ est un développement de x en base a et on note $x = 0, \overline{v_1 v_2 \cdots v_n v_{n+1} \cdots}$.

De plus, $x \in [0, 1]$ et $[x = 1 \iff (\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = a - 1)]$.

Théorème. Tout réel de $[0, 1[$ admet un unique développement en base a dans \mathcal{V} , où $\mathcal{V} = \{(v_n)_{n \geq 1} / \forall n \in \mathbb{N}^* v_n \in \mathbb{N} \cap [0, a[\text{ et } \forall N \in \mathbb{N}^* \exists n \geq N v_n \neq a - 1\}$.

Théorème hors programme : caractérisation d'un rationnel. Soit $x \in [0, 1[$. x est un rationnel si et seulement si son développement décimal est périodique à partir d'un certain rang.

Prévisions pour la semaine prochaine :

Applications, images directe et réciproque, injectivité et surjectivité. Lois internes.