

# DM 46 : Théorème de d'Alembert et localisation des racines d'un polynôme

Ce devoir est à préparer avant le dimanche 27 avril.  
Il sera à rendre pré-corrigé avant le mercredi 30 avril.

Dans tout ce problème, On fixe un polynôme  $S \in \mathbb{C}[X]$  de degré  $n$ , avec  $n \geq 1$ .

On notera  $S = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ .

On pose  $R = |a_n|X^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|X^k$ . Ainsi,  $R \in \mathbb{R}[X]$ .

## 1 Théorème de d'Alembert-Gauss

- 1°) Montrer que pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,  $|S(z)| \geq R(|z|)$ .
- 2°) Montrer que l'on peut définir  $m = \inf\{|S(z)| / z \in \mathbb{C}\}$ .
- 3°) Montrer qu'il existe  $A > 0$  tel que, pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| \geq A$ ,  $|S(z)| \geq m + 1$ .
- 4°) En déduire qu'il existe  $\alpha \in \mathbb{C}$  tel que  $|S(\alpha)| = m$ .

On souhaite montrer que  $S(\alpha) = 0$ , ce qui prouvera le théorème de d'Alembert-Gauss : tout polynôme de  $\mathbb{C}[X]$  de degré supérieur à 1 possède au moins une racine dans  $\mathbb{C}$ .  
On raisonne par l'absurde en supposant que  $S(\alpha) \neq 0$ .

5°) On pose  $P(X) = \frac{S(X + \alpha)}{S(\alpha)}$ .

Montrer qu'il existe  $q \in \{1, \dots, n\}$  et  $b_q, \dots, b_n \in \mathbb{C}$  tels que

$$P(X) = 1 + \sum_{k=q}^n b_k X^k \text{ avec } b_q \neq 0 \text{ et } b_n \neq 0.$$

On pose  $b_q = \rho e^{i\theta}$  avec  $\rho > 0$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ .

6°) Soit  $r \in ]0, (\frac{1}{\rho})^{\frac{1}{q}}[$ . Lorsque  $z = r e^{i\frac{\pi-\theta}{q}}$ , montrer que  $|P(z)| \leq 1 - \rho r^q + \sum_{k=q+1}^n |b_k| r^k$ .

7°) Conclure.

## 2 Disque de Gerschgorin

### 2.1 Un exemple

On note  $a_0 = 6 - 2i$ ,  $a_1 = -3 - 5i$  et  $a_2 = -2 + 3i$ . On pose  $P(X) = X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$ .

8°) Montrer que  $P$  possède une racine réelle.

9°) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 + 3iz - 3 + i = 0$ .

10°) Vérifier que les racines de  $P$  appartiennent au disque fermé de centre 0 et de rayon  $A = \max\{|a_0|, 1 + |a_1|, 1 + |a_2|\}$ .

### 2.2 Cas général

Jusqu'à la fin du problème, on suppose que  $S$  est unitaire, c'est-à-dire que  $a_n = 1$ .

On suppose également qu'il existe  $i \in \{0, \dots, n-1\}$  tel que  $a_i \neq 0$ .

11°) En étudiant l'application  $x \mapsto \frac{R(x)}{x^n}$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ , montrer que  $R$  possède une unique racine dans  $\mathbb{R}_+^*$ , que l'on notera  $r$ .

On pose  $A = \max\{|a_0|, 1 + |a_1|, \dots, 1 + |a_{n-1}|\}$ .

12°) Montrer que  $R(A) \geq 0$  et en déduire que  $r \leq A$ .

13°) Montrer que toutes les racines de  $S$  sont dans le disque fermé de centre 0 et de rayon  $A$ .

14°) Montrer que, si l'on suppose de plus que  $a_{n-1} \neq 0$ , alors  $S$  possède au plus une racine complexe de module  $r$ .

Montrer que ce résultat peut tomber en défaut lorsque  $a_{n-1} = 0$ .

## 3 Le théorème d'Eneström-Keakeya (1893 et 1913)

15°) Soit  $P = \sum_{k=0}^n \alpha_k X^k \in \mathbb{R}[X]$  avec  $n \geq 1$ .

On suppose que  $0 < \alpha_0 \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_n$ .

En appliquant les résultats précédents au polynôme  $S = \frac{1}{\alpha_n}(X-1)P$ , montrer que, pour toute racine complexe  $z$  de  $P$ ,  $|z| \leq 1$ .

Montrer que, si l'on suppose de plus que  $\alpha_{n-1} < \alpha_n$ , alors pour toute racine complexe  $z$  de  $P$ ,  $|z| < 1$ .

16°) Soit  $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ . On suppose que pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ ,  $b_k > 0$ .

On pose  $\beta = \min_{1 \leq i \leq n} \frac{b_{i-1}}{b_i}$  et  $\gamma = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{b_{i-1}}{b_i}$ .

Montrer que pour toute racine complexe  $z$  de  $Q$ ,  $\beta \leq |z| \leq \gamma$ . (on pourra appliquer les résultats de la question précédente aux polynômes  $Q(\gamma X)$  et  $x \mapsto x^n Q(\frac{\beta}{x})$ ).

## 4 Le théorème de Cohn (1922)

Jusqu'à la fin du problème, on fixe  $P = \sum_{k=0}^n \alpha_k X^k \in \mathbb{C}[X]$  tel que  $n \geq 1$ ,  $\alpha_n \neq 0$  et il existe  $i \in \{0, \dots, n-1\}$  tel que  $\alpha_i \neq 0$ .

**17°)** Montrer que l'équation  $\sum_{k=0}^{n-1} |\alpha_k| x^k = |\alpha_n| x^n$  en l'inconnue  $x$  possède une unique solution dans  $\mathbb{R}_+^*$ , que l'on notera  $\rho(P)$ .  
Montrer que pour toute racine  $\zeta$  de  $P$ ,  $|\zeta| \leq \rho(P)$ .

**18°)** À partir du théorème de d'Alembert, montrer qu'il existe  $(\zeta_1, \dots, \zeta_n) \in \mathbb{C}^n$  tel que  $P = \alpha_n \prod_{i=1}^n (X - \zeta_i)$ , avec  $0 \leq |\zeta_1| \leq |\zeta_2| \leq \dots \leq |\zeta_n|$ .

On admet les formules suivantes, appelées relations de Viète, que l'on démontrera plus tard en cours : pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$(-1)^k \frac{\alpha_{n-k}}{\alpha_n} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \zeta_{i_1} \zeta_{i_2} \dots \zeta_{i_k}.$$

**19°)** Montrer que, pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ ,  $\left| \frac{\alpha_k}{\alpha_n} \right| \leq \binom{n}{k} |\zeta_n|^{n-k}$ .

**20°)** Montrer que  $\rho(P)^n \leq \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \rho(P)^k |\zeta_n|^{n-k}$ .

**21°)** En déduire que  $(2^{\frac{1}{n}} - 1)\rho(P) \leq |\zeta_n|$  (Résultat dû à Cohn en 1922, amélioré par Berwald en 1934).

**22°)** On suppose que 0 n'est pas racine de  $P$  et on pose  $Q = \sum_{k=0}^n \alpha_k X^{n-k}$ .

Montrer que  $\frac{1}{\rho(Q)} \leq |\zeta_1| \leq \frac{1}{(2^{\frac{1}{n}} - 1)\rho(Q)}$ .

**23°)** En reprenant le polynôme  $P$  de la question 8, déterminer avec une calculatrice une valeur approchée de  $\rho(P)$  et vérifier pour ce polynôme les résultats obtenus aux questions 17 et 21.

## 5 Un dernier résultat

On suppose maintenant que  $n \geq 2$  et qu'il existe  $i \in \{0, \dots, n-2\}$  tel que  $\alpha_i \neq 0$ .

On pose  $P_1 = \alpha_n X^n + \sum_{k=0}^{n-2} \alpha_k X^k$ .

**24°)** Montrer que  $\rho(P_1) \leq \rho(P)$ .

**25°)** Soit  $\zeta \in \mathbb{C}$  une racine de  $P$  telle que  $|\zeta| > \rho(P_1)$ .

Montrer que  $|\alpha_{n-1} + \alpha_n \zeta| \leq \frac{1}{\rho(P_1)^{n-1}} \sum_{k=0}^{n-2} |\alpha_k| \rho(P_1)^k$ .

**26°)** En déduire que les racines de  $P$  sont toutes dans la réunion des deux disques fermés de rayon  $\rho(P_1)$  et de centres 0 et  $-\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n}$ .

**27°)** Vérifier ce résultat pour le polynôme  $P$  de la question 8.