

Résumé de cours :  
Semaine 30, du 19 au 23 mai.

# Les déterminants (suite et fin)

**Notation.**  $\mathbb{K}$  désigne un corps quelconque.

## 1 Propriétés du déterminant

**Notation.** On fixe  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $e$  une base de  $E$ .

**Propriété.**  $\det_e$  est  $n$ -linéaire alternée, donc antisymétrique.  $\det_e(e) = 1$ .  
 $\det_e(x_1, \dots, x_n)$  n'est pas modifié si l'on ajoute à l'un des  $x_i$  une combinaison linéaire des autres  $x_j$ .

**Propriété.** Le déterminant d'une matrice  $M$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est modifié en :

- $\det(M)$  pour une opération élémentaire du type  $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$  ou  $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ ;
- $\alpha \det(M)$  pour une opération élémentaire du type  $L_i \leftarrow \alpha L_i$  ou  $C_i \leftarrow \alpha C_i$ ;
- $-\det M$  pour un échange entre deux lignes ou deux colonnes.

**ATTENTION :** En général,  $\det(\alpha M + N) \neq \alpha \det(M) + \det(N)$ .

**Méthode :** Pour calculer le déterminant d'une matrice, on tente de modifier la matrice par des manipulations élémentaires, afin de se ramener à une matrice dont on connaît le rang ou le déterminant.

**Propriété.**  $\det(Id_E) = 1$ ,  $\det(I_n) = 1$ .

Pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$  et  $u \in L(E)$ ,  $\det(\lambda u) = \lambda^n \det(u)$ .

Pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ .

**Théorème.** Si  $f, g \in L(E)$ , alors  $\boxed{\det(fg) = \det(f) \times \det(g)}$ .

Pour tout  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

**Formule de changement de base :** Soient  $e$  et  $e'$  deux bases de  $E$ , et soit  $x$  une famille de  $n$  vecteurs de  $E$ . Alors,  $\boxed{\det_{e'}(x) = \det_{e'}(e)\det_e(x)}$ .

**Théorème.**  $\boxed{x \text{ est une base si et seulement si } \det_e(x) \neq 0}$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

**Corollaire.** Soit  $u \in L(E)$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

$u \in GL(E)$  si et seulement si  $\det(u) \neq 0$  et dans ce cas,  $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det(u)}$ .

$A \in GL_n(\mathbb{K})$  si et seulement si  $\det(A) \neq 0$  et dans ce cas,  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ .

**Remarque.**  $\det$  est donc un morphisme du groupe  $GL(E)$  vers  $(\mathbb{K}^*, \times)$ .

Son noyau est un sous-groupe (distingué) de  $GL(E)$ , noté  $SL(E)$ .

C'est le groupe spécial linéaire de  $E$  :  $SL(E) = \{u \in L(E) / \det(u) = 1\}$ .

En particulier de  $SL_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) / \det(M) = 1\}$  : c'est le groupe spécial linéaire de degré  $n$ .

**Propriété.** Deux matrices carrées semblables ont le même déterminant.

## 2 Calcul des déterminants

**Définition.** Soit  $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Pour tout  $(i, j) \in \mathbb{N}_n^2$ , notons  ${}_{i,j}M$  la matrice extraite de  $M$  en ôtant la  $i^{\text{ème}}$  ligne et la  $j^{\text{ème}}$  colonne. La quantité  $\det({}_{i,j}M)$  s'appelle le  $(i, j)^{\text{ème}}$  **mineur** de  $M$ . La quantité  $C_{i,j} = (-1)^{i+j} \det({}_{i,j}M)$  s'appelle le  $(i, j)^{\text{ème}}$  **cofacteur** de  $M$ .

**Théorème.** Pour tout  $j \in \mathbb{N}_n$ ,

$\det(M) = \sum_{i=1}^n m_{i,j} C_{i,j}$  : c'est le **développement de  $\det(M)$  selon sa  $j^{\text{ème}}$  colonne**.

Pour tout  $i \in \mathbb{N}_n$ ,  $\det(M) = \sum_{j=1}^n m_{i,j} C_{i,j}$  : c'est le **développement de  $\det(M)$  selon sa  $i^{\text{ème}}$  ligne**.

**Il faut savoir le démontrer.**

**Définition.** On appelle **comatrice** de  $M$  la matrice  $(C_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$  des cofacteurs de  $M$ .

On la notera  $Com(M)$  ou bien  $Cof(M)$ .

La transposée de la comatrice s'appelle la **matrice complémentaire** de  $M$ .

**Théorème.**  $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \quad M^t Cof(M) = {}^t Cof(M) M = \det(M) I_n$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

**Corollaire.** Lorsque  $M$  est inversible,  $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} {}^t Cof(M)$ .

**Théorème.** Soit  $M = (M_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq a \\ 1 \leq j \leq a}}$  une matrice décomposée en blocs, où, pour tout  $i, j \in \mathbb{N}_a$ ,

$M_{i,j} \in \mathcal{M}_{n_i, n_j}(\mathbb{K})$ . Si  $M$  est triangulaire supérieure (ou inférieure) par blocs,  $\det(M) = \prod_{i=1}^a \det(M_{i,i})$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

**Corollaire.** Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure ou inférieure est égal au produit de ses éléments diagonaux.

## 3 Formules de Cramer

**Propriété.** Considérons un système linéaire de Cramer  $(S) : MX = B$ , où  $M \in GL_n(\mathbb{K})$ ,  $B \in \mathbb{K}^n$ ,

dont l'unique solution est notée  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ . Alors, pour tout  $j \in \{1, \dots, n\}$ ,  $x_j = \frac{\det({}_j M)}{\det(M)}$

où  ${}_j M$  est la matrice dont les colonnes sont celles de  $M$ , sauf la  $j^{\text{ème}}$  qui est égale à  $B$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

## 4 Exemples de déterminants.

### 4.1 Déterminant de Vandermonde

**Définition.** Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ .

La **matrice de Vandermonde** est  $\mathcal{V}(a_0, \dots, a_n) = (a_{i-1}^{j-1}) \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{K})$ ,

et le **déterminant de Vandermonde** est  $V(a_0, \dots, a_n) = \det(\mathcal{V}(a_0, \dots, a_n))$ .

**Propriété.**  $V(a_0, \dots, a_n) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

### 4.2 Déterminants tridiagonaux

**Définition.** Soient  $n$  un entier supérieur ou égal à 2 et  $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

$M$  est tridiagonale si et seulement si, pour tout  $(i, j) \in \mathbb{N}_n^2$ ,  $|i - j| \geq 2 \implies m_{i,j} = 0$ .

**Propriété.** Soit  $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  une matrice tridiagonale. Pour tout  $k \in \mathbb{N}_n$ , notons  $M_k$  la matrice extraite de  $M$  en ne retenant que ses  $k$  premières colonnes et ses  $k$  premières lignes. Alors la suite  $(\det(M_k))_{1 \leq k \leq n}$  vérifie une relation de récurrence linéaire d'ordre 2.

### 4.3 Déterminants circulants

**Définition.** Une matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est circulante si et seulement si on passe de l'une de ses lignes à la suivante selon une permutation circulaire des coefficients vers la droite.

**Méthode :** Pour des matrices circulantes simples, on peut commencer par remplacer la première ligne par la somme de toutes les lignes. La première ligne devient alors colinéaire à  $(1, 1, \dots, 1)$ . On peut ensuite effectuer des différences de colonnes pour placer des 0 sur la première ligne.

## 5 Le polynôme caractéristique

**Notation.** On fixe un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $u \in L(E)$ .

### 5.1 Définition

**Définition.** Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On appelle polynôme caractéristique la quantité

$\chi_M = \det(XI_n - M)$ . C'est le déterminant d'une matrice dont les coefficients sont dans le corps  $\mathbb{K}(X)$ .

$\chi_M$  est un élément de  $\mathbb{K}[X]$ . De plus, pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $\chi_M(\lambda) = \det(\lambda I_n - M)$ .

**Propriété.** Pour tout  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\chi^t M = \chi_M$ .

**Propriété.** Si  $M$  est une matrice triangulaire supérieure (ou inférieure) dont les coefficients diagonaux

sont  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , alors  $\chi_M(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$ .

**Propriété.** Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. La réciproque est fausse.

**Il faut savoir le démontrer.**

**Définition.** On déduit de la propriété précédente que la quantité  $\chi_{\text{mat}(u,e)}$  ne dépend pas du choix de la base  $e$  de  $E$ . Cette quantité s'appelle le polynôme caractéristique de  $u$ .

**Propriété.**  $(\lambda \in \text{Sp}(u)) \iff (\lambda \in \mathbb{K} \text{ et } \chi_u(\lambda) = 0)$ .

**Corollaire.** Pour toute  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $Sp({}^tM) = Sp(M)$ .

**Corollaire.** Le spectre d'une matrice triangulaire supérieure est égal l'ensemble de ses coefficients diagonaux.

**Définition.** Si  $\lambda$  est une valeur propre de  $u$ , on appelle multiplicité de  $\lambda$  sa multiplicité en tant que racine de  $\chi_u$ . On la note  $m(\lambda)$ .

## 5.2 Propriétés du polynôme caractéristique

**Propriété.**  $\chi_u(X) = X^n - Tr(u)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(u)$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

**Corollaire.** Si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ,  $u$  admet au moins un vecteur propre.

**Corollaire.** Si  $\chi_u$  est scindé sur  $\mathbb{K}$ ,  $Tr(u) = \sum_{\lambda \in Sp_{\mathbb{K}}(u)} m(\lambda)\lambda$  et  $\det(u) = \prod_{\lambda \in Sp_{\mathbb{K}}(u)} \lambda^{m(\lambda)}$ .

**Propriété.** Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $u$ . Alors  $\chi_{u|_F}$  divise  $\chi_u$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

**Propriété.** Soit  $(E_1, \dots, E_p)$  une famille de sous-espaces vectoriels de  $E$  telle que  $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$ . On suppose que  $u$  stabilise la famille  $(E_1, \dots, E_p)$ . Pour tout  $i \in \mathbb{N}_p$ , on note  $u_i$  l'endomorphisme induit par  $u$  sur  $E_i$ . Alors  $\chi_u = \prod_{i=1}^p \chi_{u_i}$ .

**Notation.** Pour tout  $\lambda \in E_{\lambda}$ , on note  $q(\lambda) = \dim(E_{\lambda})$ .

**Propriété.**  $\forall \lambda \in Sp(u) \quad 1 \leq q(\lambda) \leq m(\lambda)$ .

**Il faut savoir le démontrer.**

**Cas particulier.** Si  $\lambda$  est une valeur propre simple de  $u$ ,  $1 = q(\lambda) = m(\lambda)$ .

## 5.3 Caractérisation des endomorphismes diagonalisables

**Théorème.**  $u$  est dz si et seulement si  $\chi_u$  est scindé sur  $\mathbb{K}$  et, pour tout  $\lambda \in Sp(u)$ ,  $m(\lambda) = q(\lambda)$ .

**Cas particulier.** Si  $\chi_u$  est scindé sur  $\mathbb{K}$  et si toutes ses racines sont simples, alors  $u$  est diagonalisable.