

Résumé de cours :

Semaine 2, du lundi 8 au samedi 13 septembre.

1 Trigonométrie (suite)


1.1 Les fonctions circulaires (suite)

Définition des fonctions tangente et cotangente : $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ et $\cotan \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$.
 La fonction tangente est définie sur $\mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$.

Formules : Soit OAB un triangle rectangle en A . Par définition, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Notons $\theta = \widehat{AOB}$ l'angle au sommet O .

Alors $\cos \theta = \frac{OA}{OB} = \frac{\text{longueur du côté adjacent}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$, $\sin \theta = \frac{AB}{OB} = \frac{\text{longueur du côté opposé}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$
 et $\tan \theta = \frac{AB}{OA} = \frac{\text{longueur du côté opposé}}{\text{longueur du côté adjacent}}$.

Cette dernière formule permet d'interpréter géométriquement la quantité $\tan \theta$:



1.2 Graphes des fonctions circulaires

Il faut savoir tracer les graphes des fonctions cos, sin et tan.

1.3 Formulaire de trigonométrie

Il faut savoir établir chacune de ces formules.

Formule circulaire : Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

Formules de symétries : Lorsque les quantités qui interviennent sont définies,

$$\begin{array}{lll}
 \cos(-\theta) = \cos(\theta) & \sin(-\theta) = -\sin(\theta) & \tan(-\theta) = -\tan(\theta) \\
 \cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta) & \sin(\pi - \theta) = \sin(\theta) & \tan(\pi - \theta) = -\tan(\theta) \\
 \cos(\pi + \theta) = -\cos(\theta) & \sin(\pi + \theta) = -\sin(\theta) & \tan(\pi + \theta) = \tan(\theta) \\
 \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin(\theta) & \sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos(\theta) & \tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cotan(\theta) \\
 \cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\sin(\theta) & \sin(\frac{\pi}{2} + \theta) = \cos(\theta) & \tan(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\cotan(\theta)
 \end{array}$$

Il faut être capable de visualiser toutes ces formules sur le cercle trigonométrique.

Formules d'addition :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

1.4 Formulaire de trigonométrie (suite)

Il faut savoir établir chacune de ces formules.

Formule d'addition :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b,$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \text{et} \quad \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

Formules de duplication : $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a,$

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a \quad \text{et} \quad \tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Premières formules de linéarisation :

$$\cos^2 a = \frac{\cos(2a) + 1}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2} \geq 0.$$

$$2 \cos a \cdot \cos b = \cos(a + b) + \cos(a - b),$$

$$2 \sin a \cdot \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b),$$

$$2 \sin a \cdot \cos b = \sin(a + b) + \sin(a - b).$$

Formules de factorisation :

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2},$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2},$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2},$$

$$\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}.$$

Il faut savoir les retrouver en utilisant les complexes.

Formules (hors programme) : en posant $u = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$, on a

$$\cos \theta = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad \sin \theta = \frac{2u}{1 + u^2}, \quad \tan \theta = \frac{2u}{1 - u^2}.$$

Propriété. Lignes trigonométriques à connaître :

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non défini

La croissance de la fonction tangente sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ aide à retenir la dernière ligne.

1.5 Equations trigonométriques

1.5.1 Résolution du système (S) : $(\cos x = c) \wedge (\sin x = s)$

1.5.2 Résolution de l'équation $\cos x = c$

Définition. L'application \cos réalise une bijection (décroissante) de $[0, \pi]$ dans $[-1, 1]$. On note \arccos l'application réciproque.

Propriété. Pour tout $u, v \in \mathbb{R}$, $\cos u = \cos v \iff u \equiv \pm v [2\pi]$.

Il faut savoir résoudre les équations suivantes : $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$.

1.5.3 Résolution de l'équation $\sin x = s$

Définition. L'application \sin réalise une bijection (croissante) de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dans $[-1, 1]$. On note \arcsin l'application réciproque.

Propriété. Pour tout $u, v \in \mathbb{R}$, $\sin u = \sin v \iff (u \equiv v [2\pi]) \vee (u \equiv \pi - v [2\pi])$.

1.5.4 Résolution de l'équation $\tan x = t$

Définition. \tan est une bijection (croissante) de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dans \mathbb{R} . On note \arctan l'application réciproque.

Corollaire. Pour tout $u, v \in \mathbb{R}$, $\tan u = \tan v \iff u \equiv v [\pi]$.

1.5.5 Expressions de la forme $A \cos x + B \sin x$.

Technique à connaître : transformation de $A \cos x + B \sin x$ en $r \cos(x - \varphi)$.

Première méthode :

Soit $(A, B) \in \mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}$.

$$A \cos x + B \sin x = \sqrt{A^2 + B^2} \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cos x + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sin x \right).$$

Posons $c = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ et $s = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}$. On a $c^2 + s^2 = 1$, donc on sait qu'il existe $\varphi \in \mathbb{R}$ tel que

$$c = \cos \varphi \text{ et } s = \sin \varphi. \text{ Ainsi, en posant } r = \sqrt{A^2 + B^2},$$

$$A \cos x + B \sin x = r(\cos \varphi \cos x + \sin \varphi \sin x) = r \cos(x - \varphi).$$

r est appelé l'amplitude et φ la phase.

On remarquera que, par construction, $c + is = e^{i\varphi}$, donc $A + iB = re^{i\varphi}$.

Seconde méthode : lorsque $A \neq 0$. Il existe φ tel que $\tan \varphi = \frac{B}{A}$.

$$\text{Alors } A \cos x + B \sin x = A \left(\cos x + \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \sin x \right) = \frac{A}{\cos \varphi} \cos(x - \varphi).$$

Sachez résoudre les équations suivantes :

$$-3 \cos x + 4 \sin x = 10 \text{ et } \sqrt{3} \cos x - \sin x = 2.$$

2 Dérivation et intégration

2.1 Pente de la tangente

Propriété. Pour une droite d'équation $y = px + y_0$, on dit que p est sa pente.

On dispose également des droites "verticales", d'équation $x = x_0$, où $x_0 \in \mathbb{R}$, qui sont de pente infinie. Deux droites affines du plan sont parallèles si et seulement si elles ont la même pente.

Propriété. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Pour tout $x_0, x_1 \in \mathcal{D}_f$, avec $x_0 \neq x_1$, la corde du graphe de f entre les abscisses x_0 et x_1 est par définition l'unique droite du plan passant par les points du graphe de f d'abscisses x_0 et x_1 .

$$\text{Elle a pour équation : } y - f(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \times (x - x_0).$$

En particulier, la pente de cette droite est égale à $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$.

Définition. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I et soit $x_0 \in I$.

On dit que f est dérivable en x_0 si et seulement si la quantité $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ possède une limite lorsque x_1 tend vers x_0 . Dans ce cas, cette limite est notée $f'(x_0)$ et est appelée la dérivée de f en x_0 .

Informellement, lorsque f est dérivable en x_0 , la corde du graphe de f entre les abscisses x_0 et x_1 tend vers la tangente en x_0 , d'équation : $y - f(x_0) = f'(x_0).(x - x_0)$.

Cela dit que la meilleure approximation de f , au voisinage de x_0 , parmi l'ensemble des applications affines, est $x \mapsto f(x_0) + f'(x_0).(x - x_0)$.

Il faut retenir que $f'(x_0)$, lorsqu'elle est définie, est la pente de la tangente au graphe de f en le point d'abscisse x_0 .

Définition. On dit que f est dérivable sur l'intervalle I si et seulement si elle est dérivable en chacun des réels de I . On dispose alors de l'application f' , définie au moins sur I .

On dit alors que f est de classe D^1 .

Lorsque f' est continue sur I , on dit que f est de classe C^1 sur I .

Définition. Si f' est définie sur un intervalle I , on dit que f est deux fois dérivable sur I lorsque f' est dérivable en tout point de I . La dérivée de la dérivée de f est notée f'' . On l'appelle la dérivée seconde de f .

Soit $n \in \mathbb{N}$. Par récurrence, la dérivée n -ième de f lorsqu'elle est définie est la dérivée de la dérivée $(n-1)$ -ième. On la note $f^{(n)}$. On dit alors que f est de classe D^n sur I .

On dit que f est de classe C^n sur I lorsque f est n fois dérivable sur I et que $f^{(n)}$ est continue.

On dit que f est de classe C^∞ sur I lorsque, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est C^n sur I .

Remarque. On convient que $f^{(0)} = f$, pour toute application f de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

2.2 Règles de dérivation

Règles générales **A savoir utiliser dans des calculs sans hésiter**

- Pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$.
- $(fg)' = f'g + fg'$.
- $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$.
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$.
- $(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^*$, $(f^\alpha)' = \alpha f' \times f^{\alpha-1}$.
- Lorsque f est bijective, $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Les fonctions qui interviennent dans ces formules sont toutes supposées dérivables sur un intervalle. On se limite éventuellement à un sous-intervalle pour s'assurer que les quantités qui interviennent dans les formules sont bien définies.

Dérivées des fonctions usuelles **A connaître par coeur**

- $\forall \alpha \in \mathbb{R}^*$, $\frac{d}{dx}(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1}$, $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$, $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- $\cos' = -\sin$, $\sin' = \cos$.
- $\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$.
- $\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\arccos' x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$.
- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$, $\frac{d}{dx}(a^x) = (\ln a)a^x$ (où $a > 0$), $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

Dérivées d'ordre supérieur

- Si f est n fois dérivable, $\frac{d^n}{dx^n}(f(ax+b)) = a^n f^{(n)}(ax+b)$.

- $\cos^{(n)}(x) = \cos(x + n\frac{\pi}{2})$ et $\sin^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$.
- $\frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{1+x} \right) = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$.

2.3 Dérivation et monotonie

Théorème. Soit f une fonction de I dans \mathbb{R} , où I est un **intervalle** de \mathbb{R} . On suppose que f est dérivable sur I .

- f est constante sur I si et seulement si f' est identiquement nulle sur I .
- f est croissante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$.
- f est décroissante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$.
- Si $f'(x)$ est de signe constant sur I et si $\{x \in I / f'(x) = 0\}$ est fini, alors f est strictement monotone.

Il faut savoir redémontrer les propriétés suivantes. Il faut aussi les connaître pour les utiliser éventuellement sans démonstration.

- pour tout $x > 0, \sin x < x$.
- Pour tout $x \in [-1, 1], \arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}^*, \arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \operatorname{sgn}(t) \times \frac{\pi}{2}$.

2.4 Intégration

Définition. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. On note $\int_a^b f(t) dt$ (prononcer “intégrale de a à b de $f(t) dt$ ”) l’aire comprise entre l’axe des abscisses (noté Ox) et le graphe de f , en comptant positivement les aires au dessus de l’axe Ox (donc lorsque $f(x) \geq 0$) et négativement les aires situées au dessous de l’axe Ox (lorsque $f(x) \leq 0$).

Convention : Avec les notations et hypothèses précédentes, on convient que

$$\int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt \text{ et que } \int_a^a f(t) dt = 0.$$

Propriété. Soit I un intervalle inclus dans \mathbb{R} .

Soit f et g deux applications continues de I dans \mathbb{R} .

Soit $a, b \in I$ (on peut avoir $a < b, b < a$ ou bien $a = b$).

- Linéarité : Pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.
- Relation de Chasles : Pour tout $c \in I, \int_a^b f(t) dt = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Soit $a, b \in I$: **on suppose maintenant que $a \leq b$.**

- Positivité : si $f \geq 0$, alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$.
- Croissance de l’intégrale : si $f \leq g$, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.
- Inégalité triangulaire : $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$.

Propriété. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application **continue et positive**, telle que $\int_a^b f(t) dt = 0$. Alors f est identiquement nulle sur $[a, b]$.

Inégalité de Cauchy-Schwarz : Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et soit f et g deux applications continues de $[a, b]$ dans \mathbb{R} . Alors $\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt} \times \sqrt{\int_a^b g(t)^2 dt}$,

avec égalité si et seulement si f et g sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement si $f = 0$ ou bien il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in [a, b]$, $g(x) = \lambda f(x)$.
Il faut savoir le démontrer.

2.5 Primitivation

Définition. Soit I un intervalle et f une application continue de I dans \mathbb{R} . On dit que F est une primitive de f sur I si et seulement si F est dérivable et $F' = f$.

Propriété. Avec les hypothèses et notations précédentes, si F_0 est une primitive de f , alors les autres primitives de f sont exactement les applications $F_0 + k$, où k est une fonction constante.

Théorème : Soit I un intervalle de \mathbb{R} et f une application de I dans \mathbb{R} que l'on suppose continue. Soit $x_0 \in I$. Alors $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t)dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en x_0 .

Corollaire. Soit f une application continue d'un intervalle I dans \mathbb{R} .

Si F est une primitive de f , alors pour tout $a, b \in I$, $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) \triangleq [F(t)]_a^b$.

Corollaire. Si f est une application de classe C^1 sur $[a, b]$, $\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a)$.

Notation. L'écriture " $\int f(t)dt = F(t) + k, t \in I$ " signifiera que f est continue sur I et que l'ensemble des primitives de f est $\{F + k/k \in \mathbb{R}\}$.

Il faut savoir calculer les primitives suivantes :

$$\int \cos t dt, \int x^\alpha dx \text{ (où } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}\text{)}, \int \cos^2 x dx, \int \frac{dx}{1+x^2} \text{ et } \int \frac{2x dx}{(x^2+1)^2}.$$

Propriété. Avec $a \neq 0$, si $\int f(t)dt = F(t) + k$, alors $\int f(at+b)dt = \frac{1}{a}F(at+b) + k$.

Remarque. Si f est une application continue d'un intervalle I dans \mathbb{R} et si $u : J \rightarrow I$ et $v : J \rightarrow I$ sont des applications dérivables sur un intervalle J , on calcule la dérivée de $t \mapsto \int_{u(t)}^{v(t)} f(x)dx$ en utilisant une primitive F de f :

$$\int_{u(t)}^{v(t)} f(x)dx = F(v(t)) - F(u(t)) \text{ a pour dérivée } v'(t)f(v(t)) - u'(t)f(u(t)).$$

3 Quelques théorèmes d'analyse

On montrera plus tard les théorèmes suivants :

Théorème de la limite monotone : On pose $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

Soit $(m, M) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ avec $m < M$. Notons $I =]m, M[$.

Soit f une application de I dans \mathbb{R} que l'on suppose monotone.

Alors la quantité $f(x)$ possède une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$, lorsque x tend vers m (resp : M).

Théorème. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et soit f une application continue de $[a, b]$ dans \mathbb{R} .

Alors f est bornée et elle atteint ses bornes, c'est-à-dire

qu'il existe $\alpha, \beta \in [a, b]$ tel que, pour tout $x \in [a, b]$, $f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta)$.

Notation. Pour la suite de ce paragraphe, on fixe un intervalle I de cardinal infini.

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue à valeurs réelles. Soit $a, b \in I$ avec $a < b$. Alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Seconde formulation du TVI :

L'image d'un intervalle par une application continue à valeurs réelles est un intervalle.

Théorème. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est injective si et seulement si elle est strictement monotone.

Théorème de la bijection : Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et strictement monotone. Alors f est une bijection de I dans $f(I)$ et $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est également **continu** et strictement monotone (de même sens de variation que f).

Définition. Soit $f : I \rightarrow J$ où I et J sont deux intervalles. Soit $n \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$. On dit que f est un C^n -difféomorphisme si et seulement si f est une bijection de I sur J et si f et f^{-1} sont toutes deux de classe C^n .

Caractérisation d'un difféomorphisme : Soit f une application définie sur un intervalle I et à valeurs dans \mathbb{R} . Soit $n \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$. f est un C^n -difféomorphisme de I dans $f(I)$ si et seulement si f est de classe C^n et si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \neq 0$.

4 Fonctions Logarithmes et puissances

4.1 Les fonctions \ln et \exp

La fonction Logarithme népérien : Pour tout $x > 0$, on pose $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$.

\ln est une bijection strictement croissante de \mathbb{R}_+^* dans \mathbb{R} . $\ln(1) = 0$.

Pour tout $x > 0$, $\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}$.

Il existe un unique $e \in \mathbb{R}$ tel que $\ln(e) = 1$. e est le nombre de Neper : $e = 2,7 \pm 10^{-1}$.

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{Z}$,

$$- \ln(xy) = \ln x + \ln y : \text{A savoir démontrer.}$$

$$- \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x, \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y,$$

$$- \ln(x^n) = n \ln x,$$

$$- \ln(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} -\infty, \ln(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} +\infty, \frac{\ln(t)}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0 : \text{A savoir démontrer.}$$

La fonction exponentielle : c'est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien.

\exp est une bijection strictement croissante de \mathbb{R} dans \mathbb{R}_+^* .

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\exp(\ln x) = x$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln(\exp(x)) = x$.

$\forall x \in \mathbb{R}$, $\frac{d}{dx}(\exp(x)) = \exp(x)$.

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$,

$$- e^{x+y} = e^x e^y,$$

$$- e^0 = 1 \text{ et } e^1 = e,$$

$$- e^{-x} = \frac{1}{e^x}, e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y},$$

$$- e^{nx} = (e^x)^n.$$

$$- e^t \xrightarrow[t \rightarrow -\infty]{} 0, e^t \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} +\infty. \frac{e^t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} +\infty.$$

Représentation graphique de \ln et \exp : **A connaître**

Logarithmes et exponentielles en base a .

- Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln_a(x) \triangleq \frac{\ln x}{\ln a}$.
 Pour tout $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ et $b \in \mathbb{R}$,
 - $\ln_a(xy) = \ln_a x + \ln_a y$,
 - $\ln_a(1) = 0$ et $\ln_a(a) = 1$,
 - $\ln_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln_a x$, $\ln_a\left(\frac{x}{y}\right) = \ln_a x - \ln_a y$,
 - $\ln_a(x^b) = b \ln_a x$,
- Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. $\forall x \in \mathbb{R}$, $a^x \triangleq e^{x \ln a} = \exp_a(x)$.
 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\ln_a(a^x) = x$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $a^{\ln_a x} = x$.
 Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{d}{dx}(a^x) = (\ln a)a^x$.
 Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$,
 - $a^{x+y} = a^x a^y$,
 - $a^0 = 1$ et $a^1 = a$, $a^x > 0$,
 - $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$, $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$,
 - pour tout $b \in \mathbb{R}$, $a^{bx} = (a^x)^b$.
 - Pour tout $b > 0$, $a^{xb} = (ab)^x$.

4.2 Fonctions puissances

Définition. Un monôme de degré $n \in \mathbb{N}$ est une application de la forme $x \mapsto ax^n$, où a est un paramètre réel. Cette application est définie sur \mathbb{R} .

Une fonction polynomiale est une somme finie de monômes.

Lorsque $n \in \mathbb{Z}$ avec $n < 0$, $x \mapsto x^n$ est définie sur \mathbb{R}^* .

Représentation graphique de $x \mapsto x^n$ lorsque $n \in \mathbb{Z}$: **A connaître.**

Représentation graphique de $x \mapsto x^\alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, lorsque x décrit \mathbb{R}_+^* : **A connaître.**

Convention : Pour tout $b \in \mathbb{R}_+^*$, $0^b = 0$ et $\boxed{0^0 = 1}$.

5 Etude d'une fonction**5.1 Plan d'étude**

Plan d'étude d'une fonction f de \mathbb{R} dans \mathbb{R} :

1. Calcul du domaine de définition de f .
2. Si f est paire, impaire ou/et périodique, on peut réduire le domaine d'étude.
3. Calcul de $f'(x)$ et étude de son signe.
4. Tableau de variations de f . Indiquez notamment les limites de f aux bornes des intervalles.
5. Etude des branches infinies si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \pm\infty$.