

# DM 46 : corrigé

## Problème 1.

Ce problème est largement inspiré du sujet "Centrale 2001 PC".

### Partie I

1°) D'après le cours,  $f$  est de classe  $C^\infty$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , notons  $R(n)$  l'assertion suivante :

pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f^{(n)}(x) = 2^n \cos(2x + n\frac{\pi}{2})$ .

On a clairement  $R(0)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons  $R(n)$ .

On sait que, pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $\frac{d}{dt}(\cos t) = -\sin t$ , donc en dérivant la relation  $R(n)$ ,

on obtient  $f^{(n+1)}(x) = 2^{n+1} \cos(2x + n\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2})$ , ce qui prouve  $R(n+1)$ .

D'après le principe de récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f^{(n)}(x) = 2^n \cos(2x + n\frac{\pi}{2})$ .

Ainsi, pour tout  $i \in \mathbb{N}$ ,  $f^{(i)}$  est bornée et  $M_i = 2^i$ .

2°)

◇ Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}_+^*$ .

En appliquant l'inégalité de Taylor-Lagrange à  $f$  entre  $x$  et  $x+h$ , on obtient

$|f(x+h) - f(x) - hf'(x)| \leq \frac{h^2 M_2}{2}$ , puis la même inégalité entre  $x$  et  $x-h$  donne

$|f(x-h) - f(x) + hf'(x)| \leq \frac{h^2 M_2}{2}$ . Alors, par inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} |f(x+h) - f(x-h) - 2hf'(x)| &= | (f(x+h) - f(x) - hf'(x)) \\ &\quad - (f(x-h) - f(x) + hf'(x)) | \\ &\leq | f(x+h) - f(x) - hf'(x) | \\ &\quad + | f(x-h) - f(x) + hf'(x) | \\ &\leq h^2 M_2. \end{aligned}$$

◇ Alors, d'après le corollaire de l'inégalité triangulaire,

$2|hf'(x)| - |f(x+h) - f(x-h)| \leq h^2 M_2$ , donc

$2|hf'(x)| \leq h^2 M_2 + |f(x+h) - f(x-h)| \leq h^2 M_2 + 2M_0$ .

On en déduit que  $f'$  est bornée et que,

pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2 h}{2}$ .

Ainsi,  $\frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}$  est un majorant de  $\{|f'(x)| / x \in \mathbb{R}\}$ , donc il est plus grand que le plus petit des majorants. Ceci démontre que  $M_1 \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}$ . Par la suite, ce raisonnement sera appelé un *passage à la borne supérieure*.

3°) On suppose que  $f$  est de classe  $C^2$  et que  $f$  et  $f''$  sont bornées sur  $\mathbb{R}$ . D'après la question précédente,  $M_1$  est défini, et pour tout  $h > 0$ ,  $M_1 \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}$ .

◇ Si  $M_2 = 0$ , alors  $f'' = 0$  donc il existe  $C, D \in \mathbb{R}$  tels que  $f = (x \mapsto Cx + D)$ , mais  $f$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ , donc  $C = 0$  puis  $f' = 0$ . Ainsi  $M_1 = 0$  et on a bien  $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$ .

◇ Supposons maintenant que  $M_2 > 0$ , ce qui impose également  $M_0 > 0$  (car si  $M_0 = 0$ , alors  $f = 0$ , donc  $f'' = 0$ ).

La fonction définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par  $v(h) = \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}$  a pour dérivée  $v'(h) = \frac{M_2h^2 - 2M_0}{2h^2}$

qui s'annule pour  $h_0 = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$ .

On calcule  $v(h_0) = \sqrt{\frac{M_0M_2}{2}} + \frac{\sqrt{2M_0M_2}}{2} = \sqrt{M_0M_2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2M_0M_2}$ .

Alors  $M_1 \leq v(h_0) = \sqrt{2M_0M_2}$ .

4°)

◇ Soit  $h \in \mathbb{R}_+^*$ . On applique de même l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 entre  $x$  et  $x + h$  puis entre  $x$  et  $x - h$  :

$$|f(x+h) - f(x) - hf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x)| \leq \frac{h^3M_3}{6} \text{ et}$$

$$|f(x-h) - f(x) + hf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x)| \leq \frac{h^3M_3}{6}.$$

Si l'on pose  $A = f(x+h) - f(x) - hf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x)$

et  $B = f(x-h) - f(x) + hf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x)$ , alors  $A - B = f(x+h) - f(x-h) - 2hf'(x)$ ,

or  $|A - B| \leq |A| + |B| \leq \frac{h^3M_3}{3}$ , donc par le corollaire de l'inégalité triangulaire,

$2h|f'(x)| - |f(x+h) - f(x-h)| \leq \frac{h^3M_3}{3}$ , puis

$$2h|f'(x)| \leq \frac{h^3M_3}{3} + |f(x+h)| + |f(x-h)| \leq \frac{h^3M_3}{3} + 2M_0.$$

Ainsi  $f'$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ , donc  $M_1$  est bien défini, et par passage au sup,

$$M_1 \leq \frac{h^2M_3}{6} + \frac{M_0}{h}, \text{ pour tout } h > 0.$$

Supposons que  $M_3 > 0$ , ce qui impose également que  $M_0 > 0$  : La fonction définie par

$v(h) = \frac{M_0}{h} + \frac{M_3h^2}{6}$  a pour dérivée  $v'(h) = \frac{M_3h^3 - 3M_0}{3h^2}$  qui s'annule pour

$h_0 = \left( \frac{3M_0}{M_3} \right)^{1/3}$ . On calcule

$$v(h_0) = \frac{M_0 M_3^{\frac{1}{3}}}{(3M_0)^{\frac{1}{3}}} + \frac{M_3 9^{\frac{1}{3}} M_0^{\frac{2}{3}}}{6M_3^{\frac{2}{3}}} = \frac{(M_0^2 M_3)^{\frac{1}{3}}}{3^{\frac{1}{3}}} + \frac{(M_3 M_0^2 9)^{\frac{1}{3}}}{6} = (9M_3 M_0^2)^{\frac{1}{3}} \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right).$$

Ainsi,  $M_1 \leq v(h_0) = \frac{1}{2}(9M_0^2 M_3)^{1/3}$ .

Si  $M_3 = 0$ ,  $f''' = 0$ , donc  $f$  est un polynôme de degré inférieur à 2, de la forme  $x \mapsto ax^2 + bx + c$ . Si  $a \neq 0$ , alors au voisinage de  $+\infty$ ,  $|f(x)| \sim |a|x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ , ce qui est faux car  $f$  est bornée. Ainsi,  $a = 0$  puis de même,  $b = 0$ . Ainsi  $f$  est une fonction constante, donc  $f' = 0$ . Alors  $M_1 = 0$  et l'inégalité précédente est encore valable.

◇  $f'$  et  $f^{(3)}$  étant bornées sur  $\mathbb{R}$ , la question 2 appliquée à  $f'$  montre que  $f''$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ .

## Partie II

5°)

◇ D'après la formule du binôme de Newton,

$$(e^x - 1)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-1)^{m-k} e^{kx}, \text{ or au voisinage de } 0, \text{ on sait que } e^t = \sum_{j=0}^m \frac{t^j}{j!} + o(t^m),$$

donc pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ , comme  $kx \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ , par composition,

$$e^{kx} = \sum_{j=0}^m \frac{k^j x^j}{j!} + o(x^m).$$

Ainsi, la première égalité devient

$$(e^x - 1)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-1)^{m-k} \left( \sum_{j=0}^m \frac{k^j x^j}{j!} \right) + o(x^m),$$

puis en intervertissant les deux symboles de sommation,

$$(e^x - 1)^m = \sum_{j=0}^m \left( \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-1)^{m-k} k^j \right) \frac{x^j}{j!} + o(x^m).$$

◇ Par ailleurs,

$(e^x - 1)^m = (x + o(x))^m = [x(1 + o(1))]^m = x^m(1 + o(1)) = x^m + o(x^m)$ , donc par unicité du développement limité, on obtient que, pour tout  $j \in \{1, \dots, m-1\}$ ,

$$\sum_{k=1}^m \binom{m}{k} (-1)^{m-k} k^j = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-1)^{m-k} k^j = 0,$$

et pour  $j = m$ ,  $\sum_{k=1}^m \binom{m}{k} (-1)^{m-k} k^j = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-1)^{m-k} k^j = m!$ .

6°)

◇ Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}_+^*$ . Appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange entre  $x$  et  $x + h$  :

$$|f(x+h) - f(x) - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} h^j| \leq \frac{M_n h^n}{n!}.$$

On en déduit que  $\left| \sum_{j=1}^{n-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} h^j \right| \leq \frac{M_n h^n}{n!} + |f(x+h) - f(x)| \leq \frac{M_n h^n}{n!} + 2M_0$ .

◇ Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Par inégalité triangulaire, on déduit du point précédent que

$$\left| \sum_{h=1}^{n-1} (-1)^h \binom{n-1}{h} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} h^j \right| \leq \sum_{h=1}^{n-1} \binom{n-1}{h} \left( \frac{M_n h^n}{n!} + 2M_0 \right).$$

En permutant les sommations sur  $h$  et  $j$  et en utilisant la question 5 avec  $m = n - 1$ ,

$$\begin{aligned} \sum_{h=1}^{n-1} (-1)^h \binom{n-1}{h} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} h^j &= \sum_{j=1}^{n-1} \left( \sum_{h=1}^{n-1} (-1)^h \binom{n-1}{h} h^j \right) \frac{f^{(j)}(x)}{j!} \\ &= (-1)^{n-1} f^{(n-1)}(x), \end{aligned}$$

donc l'inégalité précédente se met sous la forme :

$|f^{(n-1)}(x)| \leq C_1 M_n + C_2 M_0$  où  $C_1$  et  $C_2$  sont des quantités indépendantes de  $x$ . Ceci prouve que  $f^{(n-1)}$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ .

◇ Soit  $k \in \{2, \dots, n\}$ . Supposons que  $f^{(k)}$  est bornée. On applique le résultat précédent en remplaçant  $n$  par  $k$ . Ainsi,  $f^{(k-1)}$  est bornée. Or on a supposé que  $f^{(n)}$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ , donc par récurrence descendante, pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,  $f^{(k)}$  est bornée sur  $\mathbb{R}$  et  $M_k$  est bien défini. C'est aussi vrai pour  $k = 0$  par hypothèse.

7°) Supposons que  $f$  n'est pas constante. Soit  $k \in \{0, \dots, n\}$ . Supposons que  $M_k = 0$ . Alors  $f^{(k)}$  est identiquement nulle, donc par intégrations successives,  $f$  est une fonction

polynomiale de la forme  $x \mapsto \sum_{h=0}^N a_h x^h$  avec  $a_N \neq 0$  et  $N \geq 1$  car  $f$  n'est pas constante.

Alors au voisinage de  $+\infty$ ,  $|f(x)| \sim |a_N| x^N \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ , ce qui est faux car  $f$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ . Ainsi,  $M_k > 0$ .

8°)  $(s_1 \times \dots \times s_k)^n = (s_1 \times \dots \times s_k)^k (s_1 \times \dots \times s_k)^{n-k} \leq (s_1 \times \dots \times s_k)^k s_k^{k(n-k)}$ , car la suite  $(s_i)$  est croissante et car les  $s_i$  sont strictement positifs, donc, en utilisant à nouveau la croissance de  $(s_i)$ ,

$$(s_1 \times \dots \times s_k)^n \leq (s_1 \times \dots \times s_k)^k (s_{k+1} \times \dots \times s_n)^k = (s_1 \times \dots \times s_n)^k.$$

9°) Si  $f$  est constante, l'inégalité demandée est évidente. On suppose donc que  $f$  n'est pas constante. D'après la question précédente, pour tout

$k \in \{0, \dots, n\}$ ,  $M_k > 0$ , donc on peut poser  $s_k = 2^{k-1} \frac{M_k}{M_{k-1}}$  pour  $k \in \mathbb{N}_n$ .

Soit  $k \in \{1, \dots, n-1\}$ .  $\frac{s_{k+1}}{s_k} = 2 \frac{M_{k+1} M_{k-1}}{M_k^2} \geq 1$  d'après la question 3 appliquée à

$f^{(k-1)}$ , qui est bien de classe  $C^2$ . Ainsi, la suite  $(s_k)_{1 \leq k \leq n}$  est une suite croissante de réels strictement positifs, donc d'après la question précédente,  $(s_1 s_2 \dots s_k)^n \leq (s_1 s_2 \dots s_n)^k$ . Il s'agit de produits télescopiques. Ainsi

$$\left( \frac{M_k}{M_0} 2^{0+1+\dots+(k-1)} \right)^n \leq \left( \frac{M_n}{M_0} 2^{1+\dots+(n-1)} \right)^k \text{ d'où } M_k^n \leq M_n^k M_0^{n-k} 2^{\frac{kn(n-1)}{2} - \frac{nk(k-1)}{2}}$$

d'où enfin  $M_k \leq M_n^{\frac{k}{n}} M_0^{1 - \frac{k}{n}} 2^{\frac{k(n-k)}{2}}$ .

## Problème 2

Ce problème est extrait du sujet "Centrale 1997 MP".

### Partie I

1°) a) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Posons  $R(n)$  l'assertion :  $s_n \geq 0$ .

Par hypothèse, on a  $R(0)$  et  $R(1)$ .

Pour  $n \geq 1$ , supposons  $R(n)$  et  $R(n-1)$ .

Alors  $s_{n+1} = s_n + a_{n-1}s_{n-1} \geq 0$ , d'où  $R(n+1)$ .

D'après le principe de récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $s_n \geq 0$ .

Alors, pour tout  $n \geq 1$ ,  $s_{n+1} = s_n + a_{n-1}s_{n-1} \geq s_n$ , ce qui prouve que  $(s_n)_{n \geq 1}$  est croissante.

b) Soit  $n \geq 2$  :  $s_{n+1} = s_n + a_{n-1}s_{n-1} \leq s_n + a_{n-1}s_n$ , car  $n-1 \geq 1$  et  $(s_k)_{k \geq 1}$  est croissante. Ainsi,  $s_{n+1} \leq s_n(1 + a_{n-1})$ , or pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $e^t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} \geq 1 + t$ , donc

$$s_{n+1} \leq s_n e^{a_{n-1}}.$$

c)  $\diamond$  On suppose que la série  $\sum a_n$  converge.

Par récurrence, on déduit de l'inégalité précédente que, pour tout  $n \geq 2$ ,

$$s_n \leq s_2 \exp\left(\sum_{k=1}^{n-2} a_k\right) \leq s_2 \exp\left(\sum_{k=1}^{+\infty} a_k\right).$$

Ainsi la suite  $(s_n)_{n \geq 2}$  est croissante et majorée, donc elle converge.

$\diamond$  On suppose maintenant que la suite  $(s_n)$  converge vers une limite  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Pour tout  $n \geq 1$ ,  $s_n \geq s_1$ , donc  $\ell \geq s_1 > 0$ .

Pour  $n \geq 2$ ,  $s_{n-1} > 0$ , donc  $a_{n-1} = \frac{s_{n+1} - s_n}{s_{n-1}} \sim \frac{1}{\ell}(s_{n+1} - s_n)$ . Ainsi  $\sum a_n$  a même

nature que  $\sum (s_{n+1} - s_n)$ . Mais  $\sum_{k=1}^n (s_{k+1} - s_k) = s_{n+1} - s_1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell - s_1$ ,

donc  $\sum (s_{n+1} - s_n)$  et  $\sum a_n$  sont convergentes.

2°)  $\diamond$  Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On note  $R(n)$  l'assertion :  $|s_n| \leq v_n$ .

Par hypothèse, on a  $R(0)$  et  $R(1)$ .

Pour  $n \geq 1$ , supposons  $R(n)$  et  $R(n-1)$ .

$|s_{n+1}| = |s_n + a_{n-1}s_{n-1}| \leq |s_n| + |a_{n-1}||s_{n-1}| \leq v_n + |a_{n-1}|v_{n-1}$ , d'après l'hypothèse de récurrence. Ainsi,  $|s_{n+1}| \leq v_{n+1}$ , ce qui prouve  $R(n+1)$ .

$\diamond$  Pour  $n \geq 1$ ,  $0 \leq |s_{n+1} - s_n| = |a_{n-1}||s_{n-1}| \leq |a_{n-1}|v_{n-1} = v_{n+1} - v_n$ .

La première partie de la question 1.c reste valable lorsque  $s_1 = 0$  (l'hypothèse  $s_1 \neq 0$  n'intervient pas), donc on peut l'appliquer en remplaçant la suite  $(s_n)$  par la suite  $(v_n)$ .

Or  $\sum |a_n|$  converge, donc  $(v_n)$  converge. Alors la série  $\sum (v_{n+1} - v_n)$  converge, donc la série  $\sum |s_{n+1} - s_n|$  est convergente.

$\diamond$  Ceci prouve que  $\sum (s_{n+1} - s_n)$  est absolument convergente,

mais  $\sum_{k=1}^n (s_{k+1} - s_k) = s_{n+1} - s_1$ , donc la suite  $(s_n)$  est convergente.

**3°)**  $L$  existe d'après la question 2, car la série géométrique  $\sum a^n$  est convergente.

◇  $s_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} L \neq 0$ , donc  $s_n \sim L$ , puis  $s_{n+1} - s_n = a_{n-1}s_{n-1} \sim a^{n-1}L$ .

◇ La série  $\sum a^{n-1}$  est convergente et positive, donc on peut appliquer le théorème de sommation des relations d'équivalence. Ainsi,

$$\sum_{k=n}^{+\infty} (s_{k+1} - s_k) \sim \sum_{k=n}^{+\infty} a^{k-1}L = La^{n-1} \frac{1}{1-a}.$$

D'autre part, pour  $N \geq n$ ,  $\sum_{k=n}^N (s_{k+1} - s_k) = s_{N+1} - s_n \xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} L - s_n$ ,

$$\text{donc } L - s_n \sim \frac{La^{n-1}}{1-a}.$$

**4°) a)** De même  $s_{n+1} - s_n \sim La_{n-1} = \frac{L}{n(n+1)} = L\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ , donc par sommation

des relations d'équivalence,  $L - s_n \sim L \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{L}{n}$ .

**b)** Soit  $n \geq 1$ . Posons  $\varepsilon_n = s_n - L + \frac{L}{n}$ .

$$\varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n = s_{n+1} - s_n - \frac{L}{n} + \frac{L}{n+1} = a_{n-1}s_{n-1} - L\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right),$$

$$\text{donc } \varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n = \frac{1}{n(n+1)}(s_{n-1} - L) \sim \frac{1}{n(n+1)}\left(-\frac{L}{n-1}\right) \sim -\frac{L}{n^3}.$$

$$\text{De plus, } \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n^2}\left(1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2}\right) = \frac{1}{n^2}\left(1 - \left(1 - \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right),$$

$$\text{donc } \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{2}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \sim \frac{2}{n^3}.$$

Ainsi, d'après le théorème de sommation des relations d'équivalence,

$$\sum_{k=n}^{+\infty} (\varepsilon_{k+1} - \varepsilon_k) \sim \frac{L}{2} \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{(k+1)^2} - \frac{1}{k^2}\right) = -\frac{L}{2n^2},$$

or  $\varepsilon_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ , donc  $\sum_{k=n}^{+\infty} (\varepsilon_{k+1} - \varepsilon_k) = -\varepsilon_n$ .

$$\text{Finalement } \varepsilon_n \sim \frac{L}{2n^2} \text{ et } s_n = L - \frac{L}{n} + \frac{L}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

## Partie II

**5°)** L'application  $L$  est bien définie d'après la question 2.

Fixons  $(s_0, s_1, t_0, t_1) \in \mathbb{R}^4$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Notons  $(s_n)$  et  $(t_n)$  les suites associées, vérifiant les relations :  $s_{n+1} = s_n + a_{n-1}s_{n-1}$  et  $t_{n+1} = t_n + a_{n-1}t_{n-1}$  pour tout  $n \geq 1$ .

Ainsi,  $s_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} L(s_0, s_1)$  et  $t_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} L(t_0, t_1)$ .

Posons, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $w_n = \alpha s_n + t_n$ . Alors, pour tout  $n \geq 1$ ,

$w_{n+1} = \alpha(s_n + a_{n-1}s_{n-1}) + (t_n + a_{n-1}t_{n-1}) = w_n + a_{n-1}w_{n-1}$ , donc la suite  $(w_n)$  satisfait la relation de récurrence de l'énoncé. Ainsi,  $w_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} L(w_0, w_1) = L(\alpha s_0 + t_0, \alpha s_1 + t_1)$ .

Mais  $w_n = \alpha s_n + t_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \alpha L(s_0, s_1) + L(t_0, t_1)$ . Ainsi, d'après l'unicité de la limite,  $L(\alpha s_0 + t_0, \alpha s_1 + t_1) = \alpha L(s_0, s_1) + L(t_0, t_1)$  : on a prouvé la linéarité de  $L$ .

**6°)** On suppose qu'il existe un indice  $m \in \mathbb{N}$  tel que  $s_m = 0$ .

Supposons d'abord que  $s_{m+1} = 0$ . Alors si  $m \geq 1$ ,  $s_{m-1} = \frac{1}{a_{m-1}}(s_{m+1} - s_m) = 0$ , puis par récurrence descendante on montre que, pour tout  $i \in \{0, \dots, m\}$ ,  $s_i = s_{i+1} = 0$ . En particulier, pour  $i = 0$ ,  $s_0 = s_1 = 0$ , ce qui est faux par hypothèse.

Ainsi  $s_{m+1} \neq 0$ .

*Premier cas :* Supposons que  $s_{m+1} > 0$ .

On pose  $v_n = s_{m+n}$ . Alors la suite  $(v_n)$  suit encore la relation de récurrence de l'énoncé, en remplaçant  $(a_n)$  par  $(a_{n+m})_{n \in \mathbb{N}}$ . De plus,  $v_0 = s_m = 0$  et  $v_1 = s_{m+1} > 0$ , donc d'après la question 1, la suite  $(v_n)_{n \geq 1}$  est croissante. En particulier,  $v_n \geq v_1$  pour  $n \geq 1$ . Mais  $(v_n)$  et  $(s_n)$  ont la même limite, égale à  $L(s_0, s_1)$ , donc  $L(s_0, s_1) \geq v_1 > 0$ . En particulier,  $L(s_0, s_1) \neq 0$ .

*Second cas :* Supposons que  $s_{m+1} < 0$ .

On pose  $w_n = -s_n$ . La suite  $(w_n)$  vérifie encore la relation de récurrence et  $(w_n)$  tend vers  $-L(s_0, s_1)$ . On peut appliquer le premier cas à  $(w_n)$ , donc on a encore  $L(s_0, s_1) \neq 0$ .

**7°)** D'après la question précédente,  $L(1, 0)$  et  $L(0, 1)$  sont des réels non nuls. Ainsi,  $L$  est non nulle donc  $\text{Ker}(L) \neq \mathbb{R}^2$ .

Posons  $\alpha = \frac{L(1, 0)}{L(0, 1)}$ . Alors  $L(1, 0) = \alpha L(0, 1)$ , mais  $L$  est linéaire donc  $L(1, -\alpha) = 0$ .

Or  $(1, -\alpha) \neq 0$ , donc  $\text{Ker}(L) \neq \{0\}$ .

**8°)**  $\diamond$  Supposons que la suite  $(s_n)$  n'est pas alternée.

Ainsi, il existe  $m \in \mathbb{N}$  tel que  $s_m s_{m+1} \geq 0$ .

Si  $s_m = 0$  ou  $s_{m+1} = 0$ , d'après la question 6,  $(s_n) \notin \text{Ker}(L)$ .

Sinon,  $s_m s_{m+1} > 0$ . Si  $s_m$  et  $s_{m+1}$  sont strictement positifs, on applique la question 1 à la suite  $(v_n) = (s_{n+m})$  pour montrer comme en question 6 que  $(s_n) \notin \text{Ker}(L)$ . Si  $s_m$  et  $s_{m+1}$  sont strictement négatifs, on applique la phrase précédente à  $(w_n) = (-s_n)$  et on a encore  $(s_n) \notin \text{Ker}(L)$ .

On a donc montré que si la suite n'est pas alternée, elle n'est pas dans  $\text{Ker}(L)$ .

$\diamond$  Réciproquement, supposons que la suite  $(s_n)$  est alternée.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $s_n s_{n+1} < 0$ , donc en passant à la limite,  $L(s_0, s_1) \cdot L(s_0, s_1) \leq 0$ . Nécessairement  $L(s_0, s_1) = 0$  et  $(s_n) \in \text{Ker}(L)$ .

**9°)**  $\text{Ker}(L)$  est une droite vectorielle, donc il existe  $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  tel que

$\text{Ker}(L) = \text{Vect}\{(a, b)\} = \{(\lambda a, \lambda b) / \lambda \in \mathbb{R}\}$ .

D'après la question précédente,  $ab < 0$ , donc  $a \neq 0$ , donc  $(1, \frac{b}{a}) \in \text{Ker}(L)$ .

Posons  $r = -\frac{b}{a}$ . Alors  $r > 0$  et  $(1, -r) \in \text{Ker}(L)$ .

Supposons maintenant que  $(s_0, s_1) \in \text{Ker}(L) \setminus \{0\}$ .  $\text{Ker}(L)$  étant une droite vectorielle dirigée par  $(1, -r)$ , il existe  $\lambda \in \mathbb{R}^*$  tel que  $(s_0, s_1) = \lambda(1, -r)$ .

On sait que  $s_0 s_1 < 0$ , donc  $s_0 \neq 0$ . De plus  $-\frac{s_1}{s_0} = -\frac{-\lambda r}{\lambda} = r$ .

Ainsi le rapport  $-\frac{s_1}{s_0}$  ne dépend pas de  $(s_0, s_1) \in \text{Ker}(L) \setminus \{0\}$ .

**10°)**  $\diamond$  Soit  $n \geq 1$ .  $r_n = -\frac{s_n + a_{n-1}s_{n-1}}{s_n} = -1 - a_{n-1}\left(\frac{s_n}{s_{n-1}}\right)^{-1}$ , donc  $r_n = -1 + \frac{a_{n-1}}{r_{n-1}}$ .

La suite  $(s_n)$  est alterné, donc  $s_n$  et  $s_{n+1}$  sont non nuls et de signes opposés, donc  $r_n > 0$ .

Pour  $n \geq 1$ ,  $-1 + \frac{a_{n-1}}{r_{n-1}} = r_n > 0$ , donc  $\frac{a_{n-1}}{r_{n-1}} > 1$  puis  $r_{n-1} < a_{n-1}$ . Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $r_n < a_n$ .

$\diamond$   $0 \leq r_n \leq a_n$  et  $\sum a_n$  converge, donc  $\sum r_n$  converge également.

En particulier,  $r_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , donc  $\frac{|s_{n+1}|}{|s_n|} = r_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Alors, d'après le critère de d'Alembert,  $\sum |s_n|$  converge et  $\sum s_n$  converge absolument.

**11°)**

$\diamond$   $f_n$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_+$ , car  $a_n > 0$  et elle est dérivable. Par composition,  $g_n$  est aussi dérivable et monotone. Elle est croissante si  $n$  est impair et décroissante si  $n$  est pair.

$\diamond$   $g_{n+1} = g_n \circ f_{n+1}$ , donc pour  $x \geq 0$ ,  $g'_{n+1}(x) = f'_{n+1}(x)g'_n(f_{n+1}(x))$ ,

avec  $f'_{n+1}(x) = \frac{-a_{n+1}}{(1+x)^2}$ , donc  $|g'_{n+1}(x)| \leq |a_{n+1}||g'_n(f_{n+1}(x))|$ .

On en déduit par récurrence sur  $n$  que, pour tout  $x \geq 0$ ,  $|g'_n(x)| \leq a_0 a_1 \cdots a_n$ . En effet, pour  $n = 0$ ,  $|g'_0(x)| = \frac{a_0}{(1+x)^2} \leq a_0$ , donc l'initialisation de la récurrence est valide.

$\diamond$  Soit  $n \geq 1$ .  $|p_n - p_{n-1}| = |g_{n-1}(f_n(0)) - g_{n-1}(0)| = |g'_{n-1}(a)||f_n(0)|$  où  $a \in ]0, f_n(0)[$  d'après l'égalité des accroissements finis, or  $|f_n(0)| = a_n$ , donc d'après l'inégalité précédente,  $|p_n - p_{n-1}| \leq a_0 a_1 \cdots a_n$ .

**12°)**  $\diamond$  Soit  $n \geq 1$ .  $r_n = -1 + \frac{a_{n-1}}{r_{n-1}}$  donc  $r_{n-1} = \frac{a_{n-1}}{1+r_n} = f_{n-1}(r_n)$ .

On en déduit par récurrence que  $r_0 = g_{n-1}(r_n)$ .

Or  $r_n \in ]0, a_n[$  et  $g_{n-1}$  est strictement monotone, donc  $r_0 = g_{n-1}(r_n) \in ]g_{n-1}(0), g_{n-1}(a_n)[$ .

Mais  $g_{n-1}(0) = p_{n-1}$  et  $g_{n-1}(a_n) = g_{n-1}(f_n(0)) = g_n(0) = p_n$ , donc  $r_0 \in ]p_{n-1}, p_n[$ .

$\diamond$   $\sum a_n$  converge, donc  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , donc il existe  $N \in \mathbb{N}^*$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,  $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$ . Alors, d'après la question précédente, pour tout  $n \geq N$ ,

$$|p_n - p_{n-1}| \leq A\left(\frac{1}{2}\right)^{n-N+1}, \text{ où } A = \prod_{k=0}^{N-1} a_k.$$

Ainsi,  $p_n - p_{n-1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ , or  $|p_n - r_0| \leq |p_n - p_{n-1}|$ , donc  $p_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} r_0$ .