

## DS 3 : un corrigé

Le barème comporte un total de 66 points.

### Partie I : Préliminaires (sur 12 points)

Questions 1 et 2, sur 2 points globalement.

1°) Supposons que  $E$  ne possède aucun élément minimal.

$E$  est non vide, donc il existe  $e_1 \in E$ .

$e_1$  n'est pas minimal dans  $E$ , donc il existe  $e_2 \in E$  tel que  $e_2 < e_1$ .

$e_2$  n'est pas minimal dans  $E$ , donc il existe  $e_3 \in E$  tel que  $e_3 < e_2$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Supposons construits  $e_1, \dots, e_n \in E$  tels que  $e_n < e_{n-1} < \dots < e_1$ . Alors  $e_n$  n'est pas minimal dans  $E$ , donc il existe  $e_{n+1} \in E$  tel que  $e_{n+1} < e_n$ .

Ainsi, on construit par récurrence une suite  $(e_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  d'éléments de  $E$  strictement décroissante.

Soit  $h, k \in \mathbb{N}^*$  tels que  $h < k$ . Alors  $e_h < e_k$ , donc  $e_h \neq e_k$ .

Ainsi, l'ensemble  $\{e_k / k \in \mathbb{N}^*\}$  est une partie infinie de  $E$ , ce qui est impossible car  $E$  est fini. Ceci démontre que  $E$  possède au moins un élément minimal.

2°) D'après la question précédente,  $E$  admet au moins un élément minimal, noté  $m$ .

Soit  $e \in E$ .  $m$  étant minimal, on a  $\neg(e < m)$ , or l'ordre est total, donc  $m \leq e$ . Ainsi,  $m$  est le minimum de  $E$ .

3°) (sur 2 points)  $\diamond$  Soit  $A$  une partie de  $E$ .

Supposons que  $|A| \geq 2$ . Il existe  $a, b \in A$  tel que  $a \neq b$ .

Si  $a$  et  $b$  sont comparables, alors  $A$  n'est pas une antichaîne.

Si  $a$  et  $b$  ne sont pas comparables, alors  $A$  n'est pas une chaîne.

Ainsi, dans tous les cas,  $A$  n'est pas à la fois une chaîne et une antichaîne.

Réciproquement, supposons que  $|A| \leq 1$ . Alors  $A$  est un singleton ou bien est égal à l'ensemble vide.  $A$  ne contient aucun couple d'éléments distincts, donc c'est une antichaîne et une chaîne.

Conclusion,  $\boxed{A \text{ est à la fois une chaîne et une antichaîne si et seulement si } |A| \leq 1}$ .

$\diamond$  Soit  $C$  une chaîne de  $E$  et  $A$  une antichaîne de  $E$ . Alors  $A \cap C$  est une chaîne, en tant que partie de la chaîne  $C$ , et c'est aussi une antichaîne, en tant que partie de l'antichaîne  $A$ . Ainsi, d'après le point précédent,  $|A \cap C| \leq 1$ , ce qu'il fallait démontrer. (sur 2 points)

4°) (sur 3 points)

*Analyse* : Supposons qu'il existe une bijection  $f$  strictement croissante de  $\mathbb{N}_n$  dans  $C$ . Soit  $k \in \mathbb{N}_n$ . Alors  $C \setminus \{f(1), \dots, f(k-1)\} = \{f(k), f(k+1), \dots, f(n)\}$ , donc  $C \setminus \{f(1), \dots, f(k-1)\}$  admet un minimum et  $f(k) = \min(C \setminus \{f(1), \dots, f(k-1)\})$ .

Ceci définit par récurrence la suite  $(f(k))_{1 \leq k \leq n}$ , à partir de  $C$ , ce qui prouve l'unicité.

*Synthèse* : Notons  $(f(k))_{1 \leq k \leq n}$  la suite définie par la relation de récurrence suivante :

$f(k) = \min(C \setminus \{f(1), \dots, f(k-1)\})$ , pour tout  $k \in \mathbb{N}_n$ .

Il s'agit de montrer que  $f$  est une bijection strictement croissante de  $\mathbb{N}_n$  dans  $C$ .

Soit  $k \in \mathbb{N}_{n-1}$ .  $f(k+1) \in C \setminus \{f(1), \dots, f(k)\}$ , donc  $f(k+1) \neq f(k)$ .

De plus,  $f(k+1) \in C \setminus \{f(1), \dots, f(k-1)\}$ , donc  $f(k) = \min(C \setminus \{f(1), \dots, f(k-1)\}) \leq f(k+1)$ . Ainsi,  $f(k) < f(k+1)$ , ce qui prouve que  $f$  est strictement croissante.

Soit  $h, k \in \mathbb{N}_n$  avec  $h < k$ . Alors  $f(h) < f(k)$ , donc  $f(h) \neq f(k)$ . Ainsi  $f$  est une application injective, de  $C$  dans  $\mathbb{N}_n$  avec  $n = |C|$ , donc c'est une bijection.

5°) (sur 2 points)

◇ Soit  $c \in C$ .  $c \in E = \bigcup_{1 \leq i \leq n} P_i$ , donc il existe  $i_c \in \mathbb{N}_n$  tel que  $c \in P_{i_c}$ .

Supposons qu'il existe  $j \in \mathbb{N}_n$  tel que  $c \in P_j$ . Alors  $P_{i_c} \cap P_j \neq \emptyset$ , donc  $i_c = j$ , ce qui prouve l'unicité de  $i_c$ .

◇ Soit  $c, d \in C$  tel que  $i_c = i_d$ .

Alors  $c, d \in C \cap P_{i_c}$ , donc d'après la question 3,  $c = d$ . Ceci prouve que l'application  $c \mapsto i_c$  est une injection de  $C$  dans  $\mathbb{N}_n$ .

◇ Notons  $f$  cette application. Alors  $f|^{f(C)}$  est une bijection, donc  $|C| = |f(C)|$ , mais  $f(C)$  est une partie de  $\mathbb{N}_n$ , donc  $|C| \leq n$ .

6°) (sur 1 point) De même que pour la question précédente, pour tout  $a \in A$ , il existe un unique  $i_a \in \mathbb{N}_n$  tel que  $a \in P_{i_a}$ .

Soit  $a, b \in A$  tel que  $i_a = i_b$ . Alors  $a, b \in A \cap P_{i_a}$ , donc  $a = b$ . Ceci prouve que l'application  $a \mapsto i_a$  est une injection de  $A$  dans  $\mathbb{N}_n$ . Alors, comme lors de la question précédente, on en déduit que  $|A| \leq n$ .

7°) (sur 2 points) ◇  $\emptyset$  est une chaîne ainsi qu'une antichaîne de  $E$ , donc  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{A}$  sont des parties non vides de  $\mathbb{N}$ , majorées par le cardinal de  $E$ . D'après le cours,  $\max(\mathcal{C})$  et  $\max(\mathcal{A})$  sont donc définis.

Pour tout  $e \in E$ ,  $\{e\}$  est à la fois une chaîne et une antichaîne, donc la famille  $(\{e\})_{e \in E}$  est une partition de chaînes et d'antichaînes de  $E$  (même lorsque  $E$  est vide). Ainsi,  $\mathcal{P}_A$  et  $\mathcal{P}_C$  sont des parties non vides de  $\mathbb{N}$ . D'après le cours,  $\min(\mathcal{P}_A)$  et  $\min(\mathcal{P}_C)$  sont définis.


◇ Il existe une chaîne  $C$  de  $E$  de cardinal  $\max(\mathcal{C})$ . Posons  $n = \min(\mathcal{P}_A)$ . Il existe donc une partition d'antichaînes de  $E$  de cardinal  $n$ .

D'après la question 5,  $\max(\mathcal{C}) = |C| \leq n$ . Ceci prouve que  $\boxed{\max(\mathcal{C}) \leq \min(\mathcal{P}_A)}$ .

De même, la question 6 permet de prouver que  $\boxed{\max(\mathcal{A}) \leq \min(\mathcal{P}_C)}$ .

## Partie II : Deux exemples (sur 11 points)

8° a) (sur 1 point)



b) (sur 2 points) Notons  $C = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ .

$C$  est une chaîne car  $\emptyset \subsetneq \{1\} \subsetneq \{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$ .

Ainsi,  $\max(C) \geq |C| = 4$ .

De plus, si l'on pose  $P_1 = \{\emptyset\}$ ,  $P_2 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ ,  $P_3 = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$  et  $P_4 = \{\{1, 2, 3\}\}$ , alors  $(P_1, P_2, P_3, P_4)$  est une partition d'antichaînes de  $E$ .

Ainsi,  $\min(\mathcal{P}_A) \leq 4$ . On en déduit que  $\max(C) \geq 4 \geq \min(\mathcal{P}_A)$ , donc d'après la question 7,  $\boxed{\max(C) = 4 = \min(\mathcal{P}_A)}$ .

c) (sur 2 points)

Notons  $A = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ .  $A$  est une antichaîne, donc  $\max(\mathcal{A}) \geq |A| = 3$ .

De plus, si l'on pose  $P_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ ,  $P_2 = \{\{2\}, \{2, 3\}\}$  et  $P_3 = \{\{3\}, \{1, 3\}\}$ , alors  $(P_1, P_2, P_3)$  est une partition de chaînes de  $E$ .

Ainsi,  $\min(\mathcal{P}_C) \leq 3$ . On en déduit que  $\max(\mathcal{A}) \geq 3 \geq \min(\mathcal{P}_C)$ , donc d'après la question 7,  $\boxed{\max(\mathcal{A}) = 3 = \min(\mathcal{P}_C)}$ .

9°

a) (sur 2 points) Pour tout  $n \in E$ ,  $n|n$ , donc " $|$ " est réflexive.


Soit  $n, m \in \mathbb{N}$  tels que  $n|m$  et  $m|n$ . Alors il existe  $h, k \in \mathbb{N}$  tels que  $n = km$  et  $m = hn$ .

On en déduit que  $n = khn$ , or  $n \neq 0$ , donc  $1 = kl$ , donc d'après le cours,  $h = k = 1$  puis  $n = m$ . Ainsi, " $|$ " est antisymétrique.

Soit  $n, m, p$  tels que  $n|m$  et  $m|p$ . Il existe  $h, k \in \mathbb{N}$  tels que  $m = kn$  et  $p = hm$ , donc  $p = hkn$ , ce qui prouve que  $n|p$ . Ainsi, " $|$ " est transitive.

En conclusion, " $|$ " est bien une relation d'ordre.

b) (sur 1 point)



c) (sur 1 point) Notons  $C = \{1, 2, 4, 8\}$ .  $C$  est une chaîne, donc  $\max(C) \geq |C| = 4$ .

De plus, si l'on pose  $P_1 = \{1\}$ ,  $P_2 = \{3, 2, 5, 7\}$ ,  $P_3 = \{9, 6, 4, 10\}$  et  $P_4 = \{8\}$ , alors  $(P_1, P_2, P_3, P_4)$  est une partition d'antichaînes de  $E$ .

Ainsi,  $\min(\mathcal{P}_A) \leq 4$ . On en déduit que  $\max(C) \geq 4 \geq \min(\mathcal{P}_A)$ , donc d'après la question 7,  $\boxed{\max(C) = 4 = \min(\mathcal{P}_A)}$ .

**d)** (sur 2 points)

Notons  $A = \{9, 6, 4, 10, 7\}$ .  $A$  est une antichaîne, donc  $\max(\mathcal{A}) \geq |A| = 5$ .

De plus, si l'on pose  $P_1 = \{1, 2, 4, 8\}$ ,  $P_2 = \{3, 9\}$ ,  $P_3 = \{6\}$ ,  $P_4 = \{5, 10\}$ ,  $P_5 = \{7\}$ , alors  $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5)$  est une partition de chaînes de  $E$ .

Ainsi,  $\min(\mathcal{P}_C) \leq 5$ . On en déduit que  $\max(\mathcal{A}) \geq 5 \geq \min(\mathcal{P}_C)$ , donc d'après la question 7,  $\boxed{\max(\mathcal{A}) = 5 = \min(\mathcal{P}_C)}$ .

### Partie III : Partitions de chaînes (sur 13 points)

**10°)** (sur 3 points) Soit  $i \in \mathbb{N}_\ell$ .

On a  $x_i < x_{i+1} < \dots < x_\ell$ , donc  $\{x_i, \dots, x_\ell\}$  est une chaîne d'origine  $x_i$  de longueur  $\ell - i + 1$ . Ainsi,  $f(x_i) \geq \ell - i + 1$ .

Supposons que  $f(x_i) > \ell - i + 1$ . Posons  $j = f(x_i)$ . Alors, il existe une chaîne d'origine  $x_i$  et de longueur  $j$ , donc il existe  $y_1, \dots, y_j \in E$  tels que  $y_1 < \dots < y_j$  avec  $y_1 = x_i$ . Mézaler  $x_1 < \dots < x_i = y_1 < \dots < y_j$ , donc on dispose d'une chaîne de longueur  $i + j$  avec  $i + j > i + (\ell - i + 1) = \ell + 1$ , ce qui contredit la définition de  $\ell = \max(\mathcal{C})$ . Ainsi, on a montré que  $f(x_i) = \ell - i + 1$ .

**11°)** (sur 2 points)  $\diamond$  Pour tout  $i \in \mathbb{N}_\ell$ , d'après la question précédente,  $x_{\ell-i+1} \in A_i$ , donc  $A_i \neq \emptyset$ .

$\diamond$  Soit  $x \in E$ . Il existe une chaîne d'origine  $x$  et de longueur  $f(x)$ . Par définition de  $\ell$ , cette chaîne est de longueur inférieure à  $\ell$ . Ainsi,  $1 \leq f(x) \leq \ell$ , or  $x \in A_{f(x)}$  donc  $x \in \bigcup_{1 \leq i \leq \ell} A_i$ . Ceci prouve que  $\bigcup_{1 \leq i \leq \ell} A_i = E$ .

$\diamond$  Soit  $i, j \in \mathbb{N}_\ell$  tels que  $A_i \cap A_j \neq \emptyset$ . Alors, il existe  $x \in A_i \cap A_j$ . Dans ce cas,  $i = f(x) = j$ . Ainsi, par contraposition,  $i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$ .

En conclusion,  $(A_1, \dots, A_\ell)$  est une partition de  $E$ .

**12°)** (sur 3 points)  $\diamond$  Soit  $i \in \mathbb{N}_\ell$ . Soit  $x, y \in A_i$ . Raisonnons par l'absurde en supposant que  $y < x$ .  $x \in A_i$ , donc  $i = f(x)$ . Ainsi, il existe  $x_1, \dots, x_i \in E$  tels que  $x_1 < \dots < x_i$  et  $x_1 = x$ . Alors,  $y < x_1 < \dots < x_i$ , donc  $f(y) \geq i + 1$ . C'est faux car  $y \in A_i$ , donc  $f(y) = i$ . On en déduit donc que  $\neg(y < x)$ . De même, on montre que  $\neg(x < y)$ , donc, si  $x \neq y$ , alors  $x$  et  $y$  ne sont pas comparables. Ceci prouve que  $A_i$  est une antichaîne.

$\diamond$  On vient de construire une partition constituée de  $\ell$  antichaînes, donc  $\min(\mathcal{P}_A) \leq \ell$ , or  $\ell = \max(\mathcal{C})$ . Alors, d'après la question 7,  $\min(\mathcal{P}_A) = \max(\mathcal{C})$ .

**13°)** (sur 5 points) Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Notons  $R(n)$  l'assertion suivante : lorsque  $|E| = n$ ,  $\min(\mathcal{P}_A) = \max(\mathcal{C})$ .

Supposons que  $n = 0$  et que  $|E| = 0$ . Alors  $E = \emptyset$ . Dans ce cas, l'unique chaîne est  $\emptyset$ , donc  $\max(\mathcal{C}) = 0$ . De plus, l'unique partition d'antichaînes est la famille vide  $(P_1, \dots, P_n)$  avec  $n = 0$ , donc on a aussi  $\min(\mathcal{P}_A) = 0$ , ce qui prouve  $R(0)$ .

Supposons que  $n \in \mathbb{N}$  et que  $R(k)$  est vraie pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ .

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n + 1$ . Notons  $A$  l'ensemble des éléments maximaux de  $E$ . D'après la question 1, appliquée avec l'ordre inverse  $\geq$ ,  $A$  est non vide, donc

$|E \setminus A| \leq n$ . On peut ainsi appliquer l'hypothèse de récurrence à  $E \setminus A$ . Il existe donc  $\ell \in \mathbb{N}$ , qui représente le cardinal maximum des longueurs des chaînes de  $E \setminus A$  et le nombre minimum de partition d'antichaînes de  $E \setminus A$ .

Il existe  $x_1, \dots, x_\ell \in E \setminus A$  tels que  $x_1 < x_2 < \dots < x_\ell$  et il existe une partition d'antichaînes de  $E \setminus A$ , notée  $(P_1, \dots, P_\ell)$ .

$A$  est une antichaîne de  $E$ , car si  $x, y \in A$  avec  $x \neq y$ , on a  $\neg(x < y)$ , car  $x$  est maximal dans  $E$  et on a  $\neg(y < x)$  car  $y$  est maximal dans  $E$ . Ainsi,  $x$  et  $y$  ne sont pas comparables.

Pour tout  $i \in \mathbb{N}_\ell$ ,  $P_i \subset E \setminus A$ , donc  $P_i \cap A = \emptyset$ ; on en déduit que  $(P_1, \dots, P_\ell, A)$  est une partition de  $E$  constituée de  $\ell + 1$  antichaînes.

De plus  $x_\ell \notin A$ , donc  $x_\ell$  n'est pas maximal dans  $E$ . Ainsi, il existe  $x_{\ell+1} \in E$  tel que  $x_\ell < x_{\ell+1}$ . Alors  $\{x_1, \dots, x_{\ell+1}\}$  est une chaîne de longueur  $\ell + 1$ .

On en déduit que  $\min(\mathcal{P}_A) \leq \ell + 1 \leq \max(\mathcal{C})$  et la question 7 permet à nouveau de montrer que  $R(n+1)$  est vraie.

Le principe de récurrence conclut.

## Partie IV : Cas particulier de $\mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$ (sur 16 points)

14°) (sur 3 points)  $\diamond$  Posons  $C = \{\mathbb{N}_k / 0 \leq k \leq n\}$ .  $C$  est une chaîne, car pour tout  $k \in \mathbb{N}_n$ ,  $\mathbb{N}_{k-1} \subsetneq \mathbb{N}_k$  et  $|C| = n + 1$ .

$\diamond$  Notons  $A = \{F \subset \mathbb{N}_n / |F| = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor\}$ . D'après le rappel,  $|A| = \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ . Il reste à montrer que  $A$  est une antichaîne : Soit  $B, C \in A$ . Ainsi,  $|B| = |C|$ , donc d'après les rappels,  $B \subset C \implies B = C$  et  $C \subset B \implies B = C$ . On en déduit que, lorsque  $B \neq C$ ,  $B$  et  $C$  ne sont pas comparables. Ainsi,  $A$  est bien une antichaîne.

15°) (sur 2 points) D'après la question précédente,  $\max(\mathcal{C}) \geq n + 1$ .

Pour tout  $i \in \{0, \dots, n\}$ , notons  $A_i = \{B \subset \mathbb{N}_n / |B| = i\}$ .

Alors  $(A_0, A_1, \dots, A_n)$  est une partition de  $E$ .

Comme lors de la question précédente, on montre que, pour tout  $i \in \{0, \dots, n\}$ ,  $A_i$  est une antichaîne, donc  $(A_0, A_1, \dots, A_n)$  est une partition constituée de  $n + 1$  antichaînes de  $E$ . La question 7 permet de montrer que  $\max(\mathcal{C}) = n + 1 = \min(\mathcal{P}_A)$ .

16°) (sur 1 point)  $\diamond$  Supposons que  $n = 1$ . Alors  $E = \{\emptyset, \{1\}\}$ . Dans ce cas,  $E$  est déjà une chaîne symétrique (avec  $k = 0$ ), donc la liste  $(E)$  constituée du seul élément  $E$  est une partition de  $E$  constituée de chaînes symétriques.

$\diamond$  Supposons que  $n = 2$ . Alors  $E = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ .

Posons  $C_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$ , qui est une chaîne symétrique, avec  $k = 0$ , et  $C_2 = \{\{2\}\}$ , qui est une chaîne symétrique, avec  $k = 1$ . Alors  $(C_1, C_2)$  est une partition de  $E$  constituée de chaînes symétriques.

$\diamond$  Supposons que  $n = 3$ . On a vu en question 8.c, que si l'on pose

$P_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ ,  $P_2 = \{\{2\}, \{2, 3\}\}$  et  $P_3 = \{\{3\}, \{1, 3\}\}$ , alors  $(P_1, P_2, P_3)$  est une partition de chaînes de  $E$ . Or  $P_1$  est symétrique, avec  $k = 0$  et  $P_2, P_3$  sont symétriques avec  $k = 1$ .

**17°)** (sur 1 point)  $\diamond$ . Posons  $C' = \{E_k, E_{k+1}, \dots, E_{n-1-k}, E_{n-1-k} \cup \{n\}\}$ .

En posant  $E_{n-k} = E_{n-1-k} \cup \{n\}$ , on a  $C' = \{E_k, E_{k+1}, \dots, E_{n-k}\}$ .  $k$  vérifie bien l'encadrement  $k \leq n - k$ , de plus,  $E_k, \dots, E_{n-k}$  sont des éléments de  $E$  tels que

$E_k \subset E_{k+1} \subset \dots \subset E_{n-k-1} \subset E_{n-1-k} \cup \{n\} = E_{n-k}$  et,

pour tout  $i \in \{k, k+1, \dots, n-k\}$ ,  $|E_i| = i$ . Ainsi,  $C'$  est une chaîne symétrique de  $E$ .

$\diamond$  Posons  $C'' = \{E_k \cup \{n\}, E_{k+1} \cup \{n\}, \dots, E_{n-2-k} \cup \{n\}\}$ .

Pour tout  $h \in \{k+1, \dots, n-(k+1)\}$ , posons  $F_h = E_{h-1} \cup \{n\}$ .

Ainsi,  $C'' = \{F_{k+1}, F_{k+2}, \dots, F_{n-(k+1)}\}$ .

Si  $k = n - 1 - k$ , c'est-à-dire si  $n$  est impair et si  $k = \frac{n-1}{2}$ , alors  $C'' = \emptyset$ .

Sinon, alors  $k \leq n - k - 2$ , donc  $k + 1 \leq n - (k + 1)$ .

De plus,  $F_{k+1}, F_{k+2}, \dots, F_{n-(k+1)}$  sont des éléments de  $E$  et comme

$E_k \subset E_{k+1} \subset \dots \subset E_{n-k-2}$ , on peut affirmer que  $F_{k+1} \subset F_{k+2} \subset \dots \subset F_{n-(k+1)}$ . Enfin,

pour tout  $h \in \{k+1, \dots, n-(k+1)\}$ ,  $|F_h| = |E_{h-1}| + 1 = h$ . Ceci démontre que  $C''$  est une chaîne symétrique.

**18°)** (sur 3 points) Soit  $h \in \{0, \dots, n\}$ . On note  $R(h)$  l'assertion selon laquelle il existe une partition de  $\mathcal{P}(\mathbb{N}_h)$  constituée de chaînes symétriques.

Pour  $h = 0$ ,  $\mathbb{N}_0 = \emptyset$ , donc  $\mathcal{P}(\mathbb{N}_0) = \{\emptyset\}$ . On vérifie alors que  $C = \{E_0\}$  avec  $E_0 = \emptyset$  est une chaîne symétrique (en prenant  $k = 0 = n$  dans la définition d'une chaîne symétrique). Donc  $(C)$  est une partition de  $\mathcal{P}(\mathbb{N}_0)$  constituée de chaînes symétriques.

On suppose que  $1 \leq h \leq n$  et que  $R(h-1)$  est vraie.

Il existe donc une partition  $(C_1, \dots, C_N)$  de  $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{h-1})$  constituée de chaînes symétriques.

Pour tout  $i \in \mathbb{N}_N$ , il existe  $k_i \in \mathbb{N}$  tel que  $k_i \leq h - 1 - k_i$  et des parties de  $\mathbb{N}_{h-1}$  notées  $E_{k_i, i}, \dots, E_{h-1-k_i, i}$  telles que  $C_i = \{E_{k_i, i}, \dots, E_{h-1-k_i, i}\}$ ,  $E_{k_i, i} \subset \dots \subset E_{h-1-k_i, i}$  et, pour tout  $j \in \{k_i, \dots, h-1-k_i\}$ ,  $|E_{j, i}| = j$ .

Pour tout  $i \in \mathbb{N}_N$ , conformément aux notations de la question précédente, posons  $C'_i = \{E_{k_i, i}, \dots, E_{h-1-k_i, i}, E_{h-1-k_i, i} \cup \{h\}\}$  et  $C''_i = \{E_{k_i, i} \cup \{h\}, \dots, E_{h-2-k_i, i} \cup \{h\}\}$ .

D'après la question précédente, pour prouver  $R(h)$ , il suffit de montrer que  $\mathcal{P}(\mathbb{N}_h)$  est la réunion disjointe des  $C'_i$  et des  $C''_i$  lorsque  $i$  varie entre 1 et  $N$ . Il est possible que certains  $C''_i$  soient vides, mais il suffit de les retirer de la liste pour obtenir une partition.

Ceci revient donc à montrer que, pour toute partie  $F$  de  $\mathbb{N}_h$ , il existe un unique  $i \in \mathbb{N}_N$  tel que  $F \in C'_i$  ou (exclusif)  $F \in C''_i$ . Soit donc  $F \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_h)$ .

*Premier cas :* on suppose que  $h \notin F$ . Alors  $F \subset \mathbb{N}_{h-1}$ , donc d'après l'hypothèse de récurrence, il existe un unique  $i \in \mathbb{N}_N$  tel que  $F \subset C_i$ . Alors  $F \in C'_i$ . De plus, pour tout  $j \in \mathbb{N}_N$ ,  $F \notin C''_j$  et lorsque  $j \neq i$ ,  $F \notin C'_j$ .

*Second cas :* on suppose que  $h \in F$ . Posons  $F' = F \setminus \{h\}$ .

D'après l'hypothèse de récurrence, il existe un unique  $i \in \mathbb{N}_N$  tel que  $F' \in C_i$ .

Lorsque  $F' = \max(C_i)$ , alors  $F = F' \cup \{h\} = \max(C'_i)$ . En particulier,  $F \in C'_i$ . De plus, pour tout  $j \in \mathbb{N}_N$ ,  $F \notin C''_j$  et lorsque  $j \neq i$ ,  $F \notin C'_j$ .

Lorsque  $F' \neq \max(C_i)$ , alors  $F = F' \cup \{h\} \in C''_i$ . De plus, pour tout  $j \in \mathbb{N}_N$ ,  $F \notin C'_j$  et lorsque  $j \neq i$ ,  $F \notin C''_j$ .

On a donc prouvé  $R(h)$ .

D'après le principe de récurrence,  $R(n)$  est vraie, ce qu'il fallait démontrer.

19°)  $\diamond$  (sur 4 points) Supposons que  $(P_1, \dots, P_N)$  est une partition de  $E$  telle que  $P_1, \dots, P_N$  sont des chaînes symétriques.

Posons  $j = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ . Comme lors de la question 15, notons  $A_j$  l'ensemble des parties de  $\mathbb{N}_n$  dont le cardinal vaut  $j$ . On a vu en question 15 que  $A_j$  est une antichaîne. Alors, d'après la question 6, pour tout  $F \in A_j$ , il existe un unique  $f(F) \in \mathbb{N}_N$  tel que  $F \in P_{f(F)}$ . Toujours d'après la question 6,  $f$  est une application injective de  $A_j$  dans  $\mathbb{N}_N$ . Montrons que  $f$  est également surjective.

Soit  $i \in \mathbb{N}_N$ .  $P_i$  est une chaîne symétrique de  $E$ , donc  $P_i = \{E_k, E_{k+1}, \dots, E_{n-k}\}$  où  $k \leq n-k$  et où  $E_k, \dots, E_{n-k}$  vérifient les propriétés indiquées dans l'énoncé avant la question 16.

On a  $2k \leq n$ , donc  $k \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ . De plus,  $n-k \geq n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \geq n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2} \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ . Ainsi,  $j = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  est un entier compris entre  $k$  et  $n-k$ , or  $|E_j| = j$ . Ainsi,  $P_i$  possède partie  $F$  de cardinal  $j$ . Alors  $F \in A_j$  et  $f(F) = i$ , ce qui prouve que  $f$  est surjective.

Ainsi,  $f$  est une bijection de  $\mathcal{P}_j$  dans  $\mathbb{N}_N$ . On en déduit que  $N = |\mathbb{N}_N| = |\mathcal{P}_j| = \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ ,

d'après le rappel de l'énoncé au début de cette partie.

$\diamond$  (sur 1 point) D'après la question 18, il existe donc une partition de  $E$  constituée de  $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$  chaînes. On en déduit que  $\min(\mathcal{P}_C) \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ , mais d'après la question 14,

$\max(\mathcal{A}) \geq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ . Alors, d'après la question 7,  $\boxed{\max(\mathcal{A}) = \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} = \min(\mathcal{P}_C)}$ .

$\diamond$  (sur 1 point) Soit  $k \in \{0, \dots, n\}$ . Notons encore  $A_k$  l'ensemble des parties de  $\mathbb{N}_n$  qui sont de cardinal  $k$ . D'après la question 15,  $A_k$  est une antichaîne de  $E$  et d'après l'énoncé,  $|A_k| = \binom{n}{k}$ . On en déduit que  $\binom{n}{k} \in \mathcal{A}$ , donc  $\binom{n}{k} \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ .

## Partie V : Théorème de Dilworth (sur 15 points)

20°) (sur 4 points) Choisissons une antichaîne  $A$  de cardinal  $\alpha$ . Par hypothèse,  $C \cap A \neq \emptyset$ , donc d'après la question 3,  $C \cap A$  est un singleton.

En particulier,  $C$  est non vide, donc  $|E \setminus C| < |E|$ . Ainsi, le théorème de Dilworth est démontré pour  $E \setminus C$ .

$A \setminus (C \cap A) = A \cap \overline{C \cap A} = A \cap (\overline{C} \cup \overline{A}) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{C}) = A \cap \overline{C} = A \cap (E \setminus C)$ , donc  $|A \cap (E \setminus C)| = \alpha - 1$ , or  $A \cap (E \setminus C)$  est une partie d'une antichaîne, donc c'est une antichaîne de  $E \setminus C$ . Ainsi,  $E \setminus C$  possède au moins une antichaîne de cardinal  $\alpha - 1$ . De plus, si  $E \setminus C$  possédait une antichaîne de cardinal  $\alpha$ , ce serait une antichaîne de  $E$  de cardinal  $\alpha$  qui ne rencontre pas  $C$ , ce qui est contraire à l'hypothèse de l'énoncé. Ainsi, dans  $E \setminus C$ , le maximum des cardinaux des antichaînes est égal à  $\alpha - 1$ . Il existe donc une partition  $(C_1, \dots, C_{\alpha-1})$  de  $E \setminus C$  constituée de chaînes. Alors  $(C_1, \dots, C_{\alpha-1}, C)$  est une partition de  $E$  constituée de  $\alpha$  chaînes de  $E$ . On en déduit que  $\min(\mathcal{P}_C) \leq \alpha = \max(\mathcal{A})$ , puis d'après la question 7, que  $\min(\mathcal{P}_C) = \max(\mathcal{A})$ .

**21°)**  $\diamond$  (sur 2 points) Soit  $x \in E$ . Supposons que  $x \notin (A_+ \cup A_-)$ . Alors, pour tout  $a \in A$ , on a  $\neg(a \leq x)$  et  $\neg(a \geq x)$ , donc  $x$  n'est comparable avec aucun élément de  $A$ . Alors  $A \cup \{x\}$  est une antichaîne, de cardinal  $\alpha + 1$ , ce qui est impossible par définition de  $\alpha$ . Ainsi,  $x \in (A_+ \cup A_-)$ , ce qui montre que  $A_+ \cup A_- = E$ .

$\diamond$  (sur 1 point) Si  $a \in A$ ,  $a \leq a$  donc  $a \in A_+ \cap A_-$ .

Réciproquement, soit  $b \in A_+ \cap A_-$ . Il existe  $a, a' \in A$  tels que  $a \leq b \leq a'$ . Alors  $a$  et  $a'$  sont comparables, mais  $A$  est une antichaîne, donc  $a = a'$ , puis  $a = b = a'$ . Ainsi,  $b \in A$ . On a bien montré que  $A_+ \cap A_- = A$ .

**22°)** (sur 2 points) Supposons que  $\min(C) \in A_+$ . Il existe  $a \in A$  tel que  $a \leq \min(C)$ .  $a \neq \min(C)$ , car  $C \cap A = \emptyset$ , donc  $a < \min(C)$ . Alors  $\{a\} \cup C$  est une chaîne, de cardinal  $|C| + 1 = \max(C) + 1$ , ce qui est impossible par définition de  $\mathcal{C}$ . Ainsi,  $\min(C) \notin A_+$ , ce qui prouve que  $A_+ \neq E$ . De même, on montre que  $\max(C) \notin A_-$ , ce qui prouve que  $A_- \neq E$ .

**23°)** (sur 5 points)  $\diamond$  Ainsi,  $|A_-| < |E|$  et  $|A_+| < |E|$ , donc le théorème de Dilworth est démontré pour  $A_-$  et pour  $A_+$ .

$\diamond$   $A \subset A_-$ , donc  $A$  est une antichaîne de  $A_-$ . De plus, toute antichaîne de  $A_-$  est une antichaîne de  $E$ , donc il n'existe pas dans  $A_-$  d'antichaîne de cardinal strictement supérieur à  $\alpha$ . Ainsi,  $\alpha$  est le cardinal maximal des antichaînes de  $A_-$ . De même,  $\alpha$  est le cardinal maximal des antichaînes de  $A_+$ . Il existe donc une partition  $(C'_1, \dots, C'_\alpha)$  de  $A_-$  constituée de chaînes et une partition  $(C''_1, \dots, C''_\alpha)$  de  $A_+$  constituée de chaînes.

$\diamond$   $A$  est une antichaîne de  $A_-$  et  $(C'_1, \dots, C'_\alpha)$  est une partition de chaînes de  $A_-$ , donc d'après la question 6, pour tout  $a \in A$ , il existe un unique  $f(a) \in \mathbb{N}_\alpha$  tel que  $a \in C'_{f(a)}$ . Alors, toujours d'après la question 6,  $f$  est une application injective de  $A$  dans  $\mathbb{N}_\alpha$ . D'après les rappels au début de l'énoncé, comme  $|A| = \alpha$ ,  $f$  est une bijection de  $A$  dans  $\mathbb{N}_\alpha$ .

$\diamond$  Pour tout  $i \in \mathbb{N}_\alpha$ , posons  $a_i = f^{-1}(i)$ . Ainsi,  $a_i \in A \cap C'_i$ .

Soit  $i \in \mathbb{N}_\alpha$ . Posons  $x = \max(C'_i)$ . Alors  $x \in A_-$ , donc il existe  $a \in A$  tel que  $x \leq a$ . Or  $a_i \in C'_i$ , donc  $a_i \leq x \leq a$ , mais  $a$  et  $a_i$  sont deux éléments de l'antichaîne  $A$ , donc  $a_i = a$ , puis  $x = a_i$ . Ainsi, pour tout  $i \in \mathbb{N}_\alpha$ ,  $a_i = \max(C'_i)$ .

En raisonnant de même dans  $A_+$ , on montre que, quitte à modifier l'ordre de  $C''_1, \dots, C''_\alpha$ , pour tout  $i \in \mathbb{N}_\alpha$ ,  $a_i = \min(C''_i)$ .

$\diamond$  Pour tout  $i \in \mathbb{N}_\alpha$ , posons  $C_i = C'_i \cup C''_i$ .

Soit  $i \in \mathbb{N}_\alpha$ .  $C_i$  est une chaîne car, si  $x, y \in C_i$ , lorsque  $x, y \in C'_i$  ou  $x, y \in C''_i$ ,  $x$  et  $y$  sont comparables car  $C'_i$  et  $C''_i$  sont des chaînes, et lorsque  $x \in C'_i$  et  $y \in C''_i$ , on a  $x \leq a_i \leq y$ .

Soit  $x \in E$ . Si  $x \in A$ , il existe un unique  $i \in \mathbb{N}_\alpha$  tel que  $x = a_i$ , donc il existe un unique  $i \in \mathbb{N}_\alpha$  tel que  $x \in C_i$ .

Si  $x \in A_+ \setminus A$ , il existe un unique  $i \in \mathbb{N}_\alpha$  tel que  $x \in C''_i$ , car  $(C''_1, \dots, C''_\alpha)$  est une partition de  $A_+$ , donc il existe un unique  $i \in \mathbb{N}_\alpha$  tel que  $x \in C_i$ .

On raisonne de même lorsque  $x \in A_- \setminus A$ .

Ceci démontre que  $(C_1, \dots, C_\alpha)$  est une partition de  $E$  et elle est constituée de  $\alpha$  chaînes. On en déduit alors que  $\max(\mathcal{A}) = \min(\mathcal{P}_C)$ .



◇ Ainsi, en tenant compte de la question 20, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , le théorème de Dilworth est démontré lorsque  $|E| = n$ , si l'on suppose qu'il est démontré pour tout ensemble ordonné de cardinal inférieur ou égal à  $n - 1$ . Ainsi, d'après le principe de récurrence forte, il reste à montrer le théorème de Dilworth lorsque  $|E| = 0$ , c'est-à-dire lorsque  $E = \emptyset$ , mais dans ce cas,  $\mathcal{A} = \{0\} = \mathcal{P}_C$ , donc  $\max(\mathcal{A}) = 0 = \min(\mathcal{P}_C)$ , ce qui conclut.