CONCOURS BLANC CORRECTION

Problème

Préliminaires

Si P et Q sont deux polynômes qui définissent la même fonction polynomiale de $[-1, 1]$: $\forall x \in [-1, 1], P(x) = Q(x)$, alors comme l'ensemble $I = [-1, 1]$, possède un nombre infini d'éléments, $P - Q$ admet une infinité de racines. Donc $P - Q$ est le polynôme nul (il ne peut pas admettre strictement plus de n racines sans être nul), donc $P = Q$. Ainsi l'égalité des fonctions polynomiales sur $[-1, 1]$ entraîne l'égalité des polynômes. La réciproque est évidente.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on peut faire l'identification de $\mathbb{R}_n[X]$ et E_n .

I - Polynômes de Tchebychev

Dans cette partie, n désigne un entier naturel.

1. Existence et unicité
 - (a) Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \cos(n\theta) &= \operatorname{Re}(e^{in\theta}) = \operatorname{Re}((\cos \theta + i \sin \theta)^n) = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} \theta (i)^k \sin^k \theta \right) \\ &= \sum_{p=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2p} \cos^{n-2p} \theta (-1)^p \sin^{2p} \theta \quad \text{avec } (k = 2p) \\ &= \sum_{p=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2p} \cos^{n-2p} \theta (-1)^p (1 - \cos^2(\theta))^p \end{aligned}$$

Donc, avec $T_n(X) = \sum_{p=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2p} (-1)^p X^{n-2p} (1 - X^2)^p$, on a $\forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$

- (b) Si R vérifie la même relation, alors pour tout $x \in [-1, 1]$, on prend $y = \arccos x \in [0, \pi]$:

$$(T - R)(x) = T(\cos y) - R(\cos y) = \cos(ny) - \cos(ny) = 0$$

Donc $T - R$ admet une infinité de racines donc $T = R$.

Le polynôme vérifiant $(\star)$ est unique

2. Relation de récurrence

- (a) Soit $x \in [-1, 1]$ et $\theta = \arccos x \in [0, \pi]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} (T_{n+2} + T_n)(x) &= T_{n+2}(\cos \theta) + T_n(\cos \theta) = \cos(n+2)\theta + \cos n\theta = \cos(n+1+1)\theta + \cos(n+1-1)\theta \\ &= 2 \cos \theta \cos n\theta = 2xT_n(x) \end{aligned}$$

Ainsi pour tout entier n , $T_{n+2} + T_n - 2XT_n$ admet une infinité de racines donc c'est le polynôme nul.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.

🔍 Remarques !

🔗 On pouvait aussi conclure en disant que les fonctions polynomiales de E_{n+2} , $T_{n+2} + T_n$ et $x \mapsto 2xT_{n+1}$ coïncident si bien que l'identification prouvée dans la partie préliminaire permet de conclure à l'égalité des polynômes.

- (b) Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(0\theta) = 1$, donc $T_0 = 1$.
 Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(\theta) = \cos \theta$, donc $T_1 = X$.
 Puis, avec la formule trouvée précédemment :

$$T_2 = 2XT_1 - T_0 = 2X^2 - 1 \quad T_3 = 2XT_2 - T_1 = 4X^3 - 3X$$

$$T_0 = 1, T_1 = X, T_2 = 2X^2 - 1, T_3 = 4X^3 - 3X$$

- (c) Par récurrence (à deux termes).

On considère $\mathcal{H}_n : \ll \deg T_n = n \text{ et } [T_n]_n = 2^n. \gg$

★ $\mathcal{H}_0$ est vraie.

★ $\mathcal{H}_1$ est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $\mathcal{H}_n$ et $\mathcal{H}_{n+1}$ sont vraies.

Alors $\deg(T_{n+2}) = \deg(2XT_{n+1} - T_n)$.

Or $\deg(2XT_{n+1}) = 1 + \deg(T_{n+1}) = 1 + (n+1) = n+2$ d'après $\mathcal{H}_{n+1}$,

et $\deg(-T_n) = \deg(T_n) = n$ d'après $\mathcal{H}_n$.

Donc $\deg T_{n+2} = n+2$ et par linéarité :

$$[T_{n+2}]_{n+2} = [2XT_{n+1}]_{n+2} - [T_n]_{n+2} = 2 \times 1 \times [T_{n+1}]_{n+1} + 0 = 2 \times 2^{n+1} = 2^{n+2}$$

d'après $\mathcal{H}_n$ puis $\mathcal{H}_{n+1}$.

Ainsi $\mathcal{H}_{n+2}$ est vraie.

Le coefficient dominant de T_n est donc $2^n X^n$

3. Racines et extrema.

- (a) On considère donc, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $\theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{2n}$.

Il s'agit de n nombres distincts de $[0, \pi]$ or $\cos|_{[0, \pi]}$ est injective, donc $(\cos \theta_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$ est une famille de n nombres distincts. De plus, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $T_n(\cos \theta_k) = \cos(n\theta_k) = \cos(\frac{\pi}{2} + k\pi) = 0$.

Les nombres $(\cos \theta_k)_{1 \leq k \leq n}$ sont n racines deux à deux distinctes de T_n or le degré de T_n est n donc

★ ce sont LES n racines (distinctes) de T_n (il n'y en a pas d'autres!),

★ elles sont toutes simples.

Connaissant de plus la valeur du coefficient dominant de T_n , on en déduit la factorisation $T_n(x) = \lambda_n \prod_{k=1}^n (x - \cos \theta_k)$

où λ_n est le coefficient dominant de T_n .

$$T_n = 2^{n-1} \prod_{k=1}^n (X - \cos \theta_k)$$

- (b) Pour tout $x \in [-1, 1]$, $T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$, donc $\|T_n\|_\infty \leq 1$.

Puis pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$,

$$T_n(c_k) = \cos(n \frac{k\pi}{n}) = \cos(k\pi) = (-1)^k$$

Ce qui permet d'affirmer :

pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, $|T_n(c_k)| = \|T_n\|_\infty = 1$ et pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $T_n(c_k) = -T_n(c_{k-1}) (= (-1)^k)$

- (c)

FIG 1 : Graphe sur $[-1, 1]$ de $T_3 : x \mapsto 4x^3 - 3x$ et points de Tchebychev c_0, c_1, c_2 et c_3 .

II - Polynômes de Tchebychev et orthogonalité

Pour tout élément $f, g \in E$, on pose $\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(\cos \theta)g(\cos \theta)d\theta$.

- ★ Pour tout $(f, g) \in E^2$, $\theta \mapsto f(\cos \theta)g(\cos \theta)$ est continue sur $[0, \pi]$ donc $\langle f, g \rangle$ est bien défini et est un réel.
 - ★ $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est symétrique par commutativité du produit dans l'espace des fonctions continues sur $[0, \pi]$.
 - ★ $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est linéaire en son premier argument par distributivité du produit sur l'addition dans l'anneau des fonctions continues sur $[0, \pi]$ et par linéarité de l'intégrale. Par symétrie de $\langle \cdot, \cdot \rangle$, on en déduit la linéarité par rapport au deuxième argument d'où la bilinéarité de $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
 - ★ Pour tout $f \in E$, $\langle f, f \rangle = \int_0^\pi (f(\cos \theta))^2 d\theta \geq 0$ par positivité de l'intégrale donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est positive.
 - ★ Soit $f \in E$ telle que $\langle f, f \rangle = 0$.
Alors $\int_0^\pi (f(\cos \theta))^2 d\theta = 0$ donc $\theta \mapsto (f(\cos \theta))^2$ est une fonction continue sur $[0, \pi]$, positive ou nulle sur $[0, \pi]$ et d'intégrale nulle sur $[0, \pi]$ donc identiquement nulle sur $[0, \pi]$: $\forall \theta \in [0, \pi]$, $(f(\cos \theta))^2 = 0$.
Puisque $\cos([0, \pi]) = [-1, 1]$, $\forall x \in [-1, 1]$, $(f(x))^2 = 0$ si bien que f est identiquement nulle sur $[-1, 1]$.
Par conséquent, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est définie.

Ainsi, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E .

2. Soient $m, n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \langle T_n, T_m \rangle &= \int_0^\pi T_n(\cos \theta)T_m(\cos \theta)d\theta = \int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta)d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (\cos(n\theta + m\theta) + \cos(n\theta - m\theta)) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta)d\theta \end{aligned}$$

★ Si $m = n = 0$,

$$\langle T_0, T_0 \rangle = \frac{1}{2} \int_0^\pi (1+1)d\theta = \pi$$

★ Si $m = n \geq 1$,

$$\langle T_n, T_n \rangle = \frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos(2n\theta) + 1)d\theta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2n\theta)}{2n} + \theta \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

★ Si $m \neq n$,

$$\begin{aligned} \langle T_n, T_m \rangle &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta)d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((n+m)\theta)}{n+m} + \frac{\sin((n-m)\theta)}{n-m} \right]_0^\pi = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $\langle T_0, T_0 \rangle = \pi$ et pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, $\langle T_n, T_m \rangle = \delta_{m,n} \frac{\pi}{2}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

La famille $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est constituée de vecteurs deux à deux orthogonaux et tous non nuls (par définition des T_i pour $i \in \mathbb{N}$) donc c'est une famille libre.

De plus, pour tout $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, T_i est de degré i (I-2(c)) donc $T_i \in E_n$ donc $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une famille libre de cardinal $n+1$ dans E_n qui est un espace de dimension $n+1$ donc

la famille $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une base orthogonale de E_n .

Dans toute la suite de cette partie, f désigne un élément de E , n un entier naturel et $d_2(f, E_n) = \inf\{\|f - Q\|_2, Q \in E_n\}$.

3. (a) *Version 1.* Il s'agit du théorème de projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie. E_n est de dimension finie. On note p , la projection orthogonale sur E_n .

(p existe bien, on peut le construire à partir d'une base orthonormée).

On a alors :

$\exists ! t_n(f) \in E_n$ tel que $\|f - t_n(f)\| = d_2(f, E_n)$. Il s'agit de $t_n(f) = p(f)$

Version 2.

Soit E_n un sous-espace de dimension finie de l'espace préhilbertien réel $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Alors, pour tout vecteur f de E , la distance de f à E_n , définie par $d_2(f, E_n) = \inf\{\|f - Q\|_2, Q \in E_n\}$,

★ est un plus petit élément,

★ est atteinte pour un unique vecteur Q de E_n , il s'agit du projeté orthogonal de f sur E_n .

Ainsi, $\exists ! t_n(f) \in E_n$ tel que $\|f - t_n(f)\| = d_2(f, E_n)$ et $t_n(f) = p_{E_n}^\perp(f)$.

- (b) La famille $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une base orthogonale de E_n (question II-2) donc $\left(\frac{T_0}{\|T_0\|_2}, \frac{T_1}{\|T_1\|_2}, \dots, \frac{T_n}{\|T_n\|_2}\right)$ est une base orthonormée de E_n .
Donc pour tout $f \in E_n$,

$$t_n(f) = p(f) = \sum_{k=0}^n \left\langle f, \frac{T_k}{\|T_k\|_2} \right\rangle \frac{T_k}{\|T_k\|_2} = \sum_{k=0}^n \frac{\langle f, T_k \rangle}{\|T_k\|_2^2} T_k$$

Enfin, comme $\|T_0\|^2 = \pi$ et, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $\|T_k\|_2^2 = \langle T_k, T_k \rangle = \frac{\pi}{2}$, on a

$$\forall f \in E, \quad t_n(f) = \frac{\langle f, T_0 \rangle}{\pi} T_0 + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \langle f, T_n \rangle T_n$$

4. D'après la question II-3(a), $d_2(f, E_n)^2 = \|f - t_n(f)\|_2^2$. Or t_n est un projecteur orthogonal, donc $t_n(f)$ et $f - t_n(f)$ sont orthogonaux, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore : $\|f - t_n(f)\|_2^2 + \|t_n(f)\|_2^2 = \|f\|_2^2$ si bien que

$$\|f - t_n(f)\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|t_n(f)\|_2^2$$

Enfin, en reprenant l'expression de $t_n(f)$ établie à la question précédente et en utilisant l'expression de la norme d'un vecteur en fonction de ses coordonnées dans une base orthonormale, $\|t_n(f)\|_2^2 = \sum_{k=0}^n \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2}$, d'où,

$$d_2(f, E_n) = \sqrt{\|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2}}$$

5. (a) La série $\sum_{k \geq 0} \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2}$ est une série à termes positifs.

Pour montrer qu'elle est convergente, il suffit de démontrer qu'elle est majorée.
Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, (on élève au carré la relation précédente) :

$$\sum_{k=0}^n \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2} = \|f\|_2^2 - (d_2(f, E_n))^2 \leq \|f\|_2^2$$

$$\text{Donc la série } \sum_{k \geq 0} \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2} \text{ est convergente.}$$

- (b) La convergence de la série précédente implique que son terme général converge vers 0 donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\langle f, T_n \rangle}{\|T_n\|_2} = 0$.

Or pour $n \geq 1$, $\|T_n\|_2 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ donc $\langle f, T_n \rangle = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\langle f, T_n \rangle}{\|T_n\|_2}$ tend également vers 0 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \langle f, T_n \rangle = 0$.

Par ailleurs,

$$\langle f, T_n \rangle = \int_0^\pi f(\cos \theta) T_n(\cos \theta) d\theta = \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta$$

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta = 0$$

6. (a) Soit $h \in E$,

$$\forall x \in [-1, 1], h(x) \leq \|h\|_\infty \quad \implies \quad \forall \theta \in [0, \pi], h^2(\cos \theta) \leq \|h\|_\infty^2$$

On intègre, l'inégalité est conservée :

$$\|h\|_2^2 = \langle h, h \rangle = \int_0^\pi h^2(\cos \theta) d\theta \leq \int_0^\pi \|h\|_\infty^2 d\theta = \pi \|h\|_\infty^2$$

En prenant la racine carrée (tous les nombres sont positifs) :

$$\text{Pour tout élément } h \text{ de } E, \|h\|_2 \leq \sqrt{\pi} \|h\|_\infty.$$

- (b) On admet : $\forall f \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists T \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in [-1, 1], |f(x) - T(x)| < \varepsilon$.

Soit $\varepsilon > 0$.

Alors il existe $T \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $x \in [-1, 1], |f(x) - T(x)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{\pi}}$ i.e. $\|f - T\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{\pi}}$

Notons $N = \deg(T)$. Pour tout $n \geq N, T \in E_n \subset E_n$; donc :

$$\|f - t_n(f)\|_2 = d_2(f, E_n) = \inf\{\|f - Q\|_2, Q \in E_n\} \leq \underbrace{\|f - T\|_2}_{\text{quest. II-6(a) pour } h = f - T \in E} \leq \sqrt{\pi} \|f - T\|_\infty \leq \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - t_n(f)\|_2 = 0$$

7. (a) On sait que $d_2(f, E_n) = \sqrt{\|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2}}$ donc

$$\sum_{k=0}^n \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2} = \underbrace{d_2(f, E_n)^2}_{\text{tend vers 0 (quest. précèd.)}} + \|f\|_2^2$$

converge vers $\|f\|_2^2$ par comb. lin. de suites cv.

donc, la suite $\left(\sum_{k=0}^n \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et sa limite vaut $\|f\|_2^2$. Par ailleurs cette suite est la suite des sommes partielles d'une série convergente (quest. II-5(a)!) donc sa limite est aussi représentée par $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2}$ (somme de la série). Par unicité de la limite d'une suite convergente, on obtient après avoir pris la racine carrée,

$$\|f\|_2 = \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2}}$$

(b) Soit h de E telle que pour tout entier naturel n , $\int_0^\pi h(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta = 0$.

Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\langle h, T_n \rangle = 0$ et donc $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\langle h, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^2} = 0$. Donc $\|h\|_2 = 0$. Donc $h = 0$.

La réciproque est vraie et immédiate.

$$h = 0, \text{ si et seulement si, pour tout entier naturel } n, \int_0^\pi h(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta = 0.$$

(c) Notons $p = t_N(h)$, la projection orthogonale de h sur E_N . Donc $p \in E_N$ et $\bar{h} = h - p = h - \sum_{k=0}^N \frac{\langle h, T_k \rangle}{\|T_k\|_2^2} T_k \in E_N^\perp$.

Par linéarité :

$$\forall n > N, \int_0^\pi \bar{h}(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta = \int_0^\pi h(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta - \sum_{k=0}^N \frac{\langle h, T_k \rangle}{\|T_k\|_2^2} \langle T_k, T_n \rangle = 0 + 0 = 0$$

$$\text{et } \forall n \leq N, \int_0^\pi \bar{h}(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta = \langle \bar{h}, T_n \rangle = 0 \quad \text{car } \bar{h} \in E_N^\perp$$

Donc d'après la question précédente, $\bar{h} = 0$, donc $h = p \in E_N$.

Et réciproquement, si $h \in E_N$, alors, pour tout $n > N$, $\int_0^\pi h(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta = \langle h, T_n \rangle = 0$

$$h \in E_N, \text{ si et seulement si, pour tout entier } n > N, \int_0^\pi h(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta = 0.$$

III - Étude d'un endomorphisme

Dans cette partie, nous considérons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'application φ_n définie pour tout P dans E_n par

$$\forall x \in [-1, 1], \varphi_n(P)(x) = -xP'(x) + (1-x^2)P''(x)$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

Notons d'abord que la dérivation d'un polynôme donne un polynôme, ainsi que le produit par un autre polynôme.

Donc si P est un polynôme, il en est de même de $\varphi_n(P)$.

Plus précisément, si $\deg(P) \leq n$, $\deg P' \leq n-1$ et donc $\deg XP' \leq n$, puis $\deg(P'') \leq n-2$ et donc $\deg(1-X^2)P'' \leq n$.

Et donc par addition, $\deg \varphi(P) \leq n$. Ainsi $\varphi_n(P) \in E_n$.

Enfin, la dérivation (simple et double) est linéaire, le produit par $x \mapsto x$ ou $x \mapsto (1-x^2)$ également, ainsi que l'addition de deux applications linéaires. Donc φ_n est linéaire.

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \varphi_n \text{ est un endomorphisme de } E_n.$$

Pour obtenir M_2 , il suffit d'exprimer l'image des vecteurs de la base canonique de E_2 par φ_2 dans elle-même.

$$\varphi_2(1) = 0 \quad \varphi_2(X) = -X \quad \varphi_2(X^2) = -2X^2 + (1-X^2)2 = 2 - 4X^2$$

$$\text{Donc } M_2 = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. On sait que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$.

L'application $s : \theta \mapsto T_k(\cos \theta)$ est de classe $\mathcal{C}^2$, on peut donc la dériver deux fois :

$$\begin{aligned} \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad s'(\theta) &= -\sin \theta T_k'(\cos \theta) = -k \sin(k\theta) \\ s''(\theta) &= -\cos \theta T_k'(\cos \theta) + \sin^2 \theta T_k''(\cos \theta) = -k^2 \cos(k\theta) \\ s''(\theta) &= -\cos \theta T_k'(\cos \theta) + (1 - \cos^2 \theta) T_k''(\cos \theta) = -k^2 T_n(\theta) \end{aligned}$$

On a donc pour tout $x \in [-1, 1]$, $(x = \cos \theta) : \varphi_n(T_k)(x) = -x T_k'(x) + (1 - x^2) T_k''(x) = -k^2 T_k(x)$.

3. Ainsi, avec la question précédente, on peut écrire la matrice de φ_2 , dans la base orthogonale $\mathcal{B}' = (T_0, T_1, T_2)$:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\varphi_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} = D_2$$

Les deux matrices M_2 et D_2 sont donc semblables (matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes).

On note $P = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\text{id}) = \mathcal{P}(\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B})$, la matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ à la base $\mathcal{B}$, i.e. $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

car $T_0 = 1, T_1 = X$ et $T_2 = -1 + 2X^2 \iff X^2 = \frac{1}{2}T_2 + \frac{1}{2}T_0$.

La formule du changement de base donne $M_2 = P^{-1}D_2P$.

On a alors $M_2 = P^{-1}D_2P$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $H \in E_n$.

(a) Soit $P \in \text{Ker } \varphi_n$.

On écrit P dans la base $\mathcal{B}' = (T_0, \dots, T_n) : P = \sum_{i=0}^n a_i T_i$. Par linéarité : $\varphi_n(P) = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_n(T_i) = -\sum_{i=1}^n a_i i^2 T_i = 0$.

Donc par liberté de $(T_1, T_2, \dots, T_n)$, on a pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $a_i = 0$ et donc $P = a_0 T_0 = a_0$.

Réciproquement si P est un polynôme constant, $\varphi_n(P) = 0$.

$\ker \varphi_n = \mathbb{R}_0[X] = \text{vect}(1)$

(b) Soit $(P, Q) \in E_n^2$, toutes les fonctions qui agissent ici sont de classe $\mathcal{C}^1$.

Les intégrations par parties qui vont suivre sont donc licites.

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin^2 \theta P(\cos \theta) Q''(\cos \theta) d\theta &= \int_0^\pi \underbrace{\sin \theta P(\cos \theta)}_{u(\theta)} \times \underbrace{\sin \theta Q''(\cos \theta)}_{v'(\theta)} d\theta \\ &= \left[\sin \theta P(\cos \theta) \times (-Q'(\cos \theta)) \right]_0^\pi + \int_0^\pi (\cos \theta P(\cos \theta) - \sin^2 \theta P'(\cos \theta)) Q'(\cos \theta) d\theta \\ &= 0 + \int_0^\pi \cos \theta P(\cos \theta) Q'(\cos \theta) d\theta - \int_0^\pi \sin^2 \theta P'(\cos \theta) Q'(\cos \theta) d\theta \\ \langle P, \varphi_n(Q) \rangle &= \int_0^\pi P(\cos \theta) \times (-\cos \theta Q'(\cos \theta) + (1 - \cos^2 \theta) Q''(\cos \theta)) d\theta \\ &= -\int_0^\pi \cos \theta P(\cos \theta) Q'(\cos \theta) d\theta + \int_0^\pi \sin^2 \theta P(\cos \theta) Q''(\cos \theta) d\theta \\ &= -\int_0^\pi \sin^2 \theta P'(\cos \theta) Q'(\cos \theta) d\theta \end{aligned}$$

Or ce dernier résultat est invariant par la transformation : $P \leftrightarrow Q$. Donc $\langle P, \varphi_n(Q) \rangle = \langle Q, \varphi_n(P) \rangle$.

Puis par symétrie du produit scalaire :

$\forall (P, Q) \in E_n^2, \quad \langle P, \varphi_n(Q) \rangle = \langle \varphi_n(P), Q \rangle$

(c) Pour tout $P \in \text{Im } \varphi_n$, il existe R tel que $P = \varphi_n(R)$.

Et donc pour tout $Q \in \text{Ker } \varphi_n$:

$$\langle P, Q \rangle = \langle \varphi_n(R), Q \rangle = \langle R, \varphi_n(Q) \rangle = \langle R, 0 \rangle = 0$$

Ainsi $\text{Im } \varphi_n \subset \text{Ker } \varphi_n^\perp$.

Puis pour des raisons de dimension (E_n est de dimension finie, égale à $n + 1$) :

$$\dim(\text{Ker } \varphi_n^\perp) = \dim E_n - \dim \text{Ker } \varphi_n = \dim(\text{Im } \varphi_n)$$

d'après le théorème du rang.

Donc $\text{Im } \varphi_n = \text{ker } \varphi_n^\perp$

Ainsi, comme $\text{Ker } \varphi = \text{vect}(T_0)$

$$H \in \text{Im } \varphi_n \iff \langle H, T_0 \rangle = 0 \iff \int_0^\pi H(\cos \theta) 1 d\theta = 0$$

(d) On suppose que $P = \sum_{i=0}^n p_i T_i$, on a donc (par linéarité de φ_n)

$$\varphi_n(P) = H \iff \sum_{i=0}^n p_i \varphi(T_i) = \sum_{i=0}^n h_i T_i \iff - \sum_{i=0}^n p_i i^2 T_i = \sum_{i=0}^n h_i T_i$$

Et donc par écriture unique sur une base :

$$\begin{aligned} \varphi_n(P) = H &\iff \forall i \in \{0, \dots, n\}, -i^2 p_i = h_i \\ &\iff \begin{cases} 0 = h_0 \\ \forall i \in \{1, \dots, n\}, -i^2 p_i = h_i \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 0 = h_0 \\ \forall i \in \{1, \dots, n\}, p_i = -\frac{h_i}{i^2} \end{cases} \end{aligned}$$

- ★ Si $h_0 \neq 0$, l'équation obtenue pour $i = 0$ devient $0 = h_0$, c'est une condition de compatibilité du système linéaire qui n'est pas satisfaite donc l'équation n'admet aucune solution.
- ★ Si $h_0 = 0$, les inconnues $p_1, p_2, \dots, p_n$ sont déterminées de manière unique, en revanche il n'y a aucune contrainte sur p_0 donc l'ensemble des solutions est la droite affine

$$\sum_{i=1}^n \frac{-h_i}{i^2} T_i + \text{vect}\{T_0\}$$

- ★ Si $h_0 \neq 0$ ($\iff H \notin \text{Im } \varphi_n$), l'ensemble des solutions est vide.
- ★ Si $h_0 = 0$ ($\iff H \in \text{Im } \varphi_n$), l'ensemble des solutions est la droite affine

$$\sum_{i=1}^n \frac{-h_i}{i^2} T_i + \text{vect}\{T_0\} = \{\text{sol. partic.}\} + \text{ker } \varphi_n$$

IV - Calcul exact d'une intégrale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Pour tout $h \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, en évaluant (E) en X^h ,

$$\sum_{j=1}^n a_j t_j^h = \int_0^\pi X^h(\cos \theta) d\theta = \int_0^\pi \cos^h \theta dt = \overline{W_h}$$

On a donc le système matriciel

$$\begin{cases} a_1 & + & a_2 & + & \dots & + & a_n & = & \overline{W_0} \\ a_1 t_1 & + & a_2 t_2 & + & \dots & + & a_n t_n & = & \overline{W_1} \\ \vdots & & & & \vdots & & \vdots & & \\ a_1 t_1^{n-1} & + & a_2 t_2^{n-1} & + & \dots & + & a_n t_n^{n-1} & = & \overline{W_{n-1}} \end{cases} \iff V_n \times a_n = w_n$$

où $V_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ t_1 & t_2 & \dots & t_n \\ \vdots & & & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \dots & t_n^{n-1} \end{bmatrix}$, $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ (matrice inconnue) et $w_n = \begin{bmatrix} \overline{W_0} \\ \overline{W_1} \\ \vdots \\ \overline{W_{n-1}} \end{bmatrix}$. C'est un système de

Cramer qui admet une et une seule solution si et seulement si $\det V_n \neq 0$.

Or on reconnaît un déterminant de Vandermonde : $\det V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (t_j - t_i)$, non nul car les $t_i = \cos \theta_i$ sont tous distincts par injectivité de la fonction cosinus sur $[0, \pi]$.

(E) admet donc une unique solution pour $k = n - 1$

Et en exploitant les formules de Cramer, on a

$$\text{Pour tout } h \in \{1, 2, \dots, n\}, a_h = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & \overline{W_1} & 1 & \dots & 1 \\ t_1 & t_2 & \dots & t_{h-1} & \overline{W_2} & t_{h+1} & \dots & t_n \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \dots & t_{h-1}^{n-1} & \overline{W_{n-1}} & t_{h+1}^{n-1} & \dots & t_n^{n-1} \end{vmatrix}}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (t_j - t_i)}$$

2. Soient $P \in E_{2n-1}$, Q et R le quotient et le reste de la division euclidienne de P par T_n dans $\mathbb{R}[X]$.

(a) $E_{n-1} = \text{vect}(T_0, T_1, \dots, T_{n-1})$ donc pour tout $S \in E_{n-1}$, il existe $(s_0, \dots, s_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ tels que $S = \sum_{i=0}^{n-1} s_i T_i$.

Et donc, par linéarité du produit scalaire en son premier argument,

$$\langle S, T_n \rangle = \sum_{i=0}^{n-1} s_i \langle T_i, T_n \rangle = 0$$

(b) Sachant que $P = QT_n + R$, par linéarité de l'intégrale :

$$I(P) = \int_0^\pi (QT_n + R)(\cos \theta) d\theta = \int_0^\pi Q(\cos \theta) T_n(\cos \theta) d\theta + \int_0^\pi R(\theta) d\theta = \langle Q, T_n \rangle + \int_0^\pi R(\theta) d\theta = \langle Q, T_n \rangle + I(R)$$

Or, par définition de la division euclidienne, $P = QT_n + R$ et $\deg R \leq n-1$ donc $\deg(QT_n) = \deg(P - R) \leq \max(\deg P, \deg R) \leq \max(2n-1, n-1) \leq 2n-1$. Par multiplicativité du degré, $\deg(QT_n) = \deg Q + \deg T_n = \deg Q + n$ donc l'inégalité $\deg QT_n \leq 2n-1$ garantit que $\deg Q \leq n-1$. Par conséquent, $Q \in E_{n-1}$ si bien que la question précédente s'applique pour $S = Q$ et donne $\langle Q, T_n \rangle = 0$.

$$\text{Pour tout } P \in E_{2n-1}, I(P) = I(R).$$

3. Dans cette question, on suppose que $n = 3$.

(a) Donc $T_3 = 4X^3 - 3X = 4 \left(X + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) X \left(X - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$. On a $t_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $t_2 = 0$ et $t_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ si bien que

$$\det V_3 = (t_3 - t_2)(t_3 - t_1)(t_2 - t_1) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \times (-\sqrt{3}) \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{3\sqrt{3}}{4}$$

Puis

$$W_0 = \int_0^\pi 1 d\theta = \pi \quad W_1 = \int_0^\pi \cos \theta d\theta = 0 \quad W_2 = \int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta = \left[\frac{1}{2}(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta) \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

On a alors (avec la formule trouvée précédemment) :

$$a_1 = \frac{\begin{vmatrix} \pi & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\pi}{2} & 0 & \frac{3}{4} \end{vmatrix}}{\det V_3} = \frac{-\frac{\sqrt{3}\pi}{4}}{-\frac{3\sqrt{3}}{4}} = \frac{\pi}{3}, \quad a_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \pi & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{\pi}{2} & \frac{3}{4} \end{vmatrix}}{\det V_3} = \frac{\pi}{3}, \quad a_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & \pi \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{\pi}{2} \end{vmatrix}}{\det V_3} = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{On a pour tout } k \in \{1, 2, 3\}, a_k = \frac{\pi}{3}$$

Remarques !

Il est aussi possible de résoudre le système linéaire $V_3 a = w_3$ établi dans la question IV-1 :

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = w_0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} a_1 - \frac{\sqrt{3}}{2} a_3 = w_1 \\ \frac{3}{4} a_1 + \frac{3}{4} a_3 = w_2 \end{cases} \iff \begin{cases} a_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} a_1 - \frac{\sqrt{3}}{2} a_3 = \pi \\ \frac{3}{4} a_1 + \frac{3}{4} a_3 = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a_2 + a_1 + a_3 = \pi \\ a_1 - a_3 = 0 \\ a_1 + a_3 = \frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a_2 + a_1 + a_3 = \pi \\ a_1 - a_3 = 0 \\ a_3 = \frac{\pi}{3} \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

$$\iff \begin{cases} a_2 = \frac{\pi}{3} \\ a_1 = \frac{\pi}{3} \\ a_3 = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

- (b) Soit $P \in E_5$. D'après la question 2(b) appliquée pour $n = 3$, en notant (Q, R) le couple (quotient, reste) de la division euclidienne de P par T_3 , on a

$$I(P) = I(R) = \sum_{i=1}^3 a_i R(t_i) = \sum_{i=1}^3 a_i (P - QT_3)(t_i) = \sum_{i=1}^3 a_i P(t_i) - \sum_{i=1}^3 a_i Q(t_i) T_3(t_i)$$

Or t_1, t_2 et t_3 sont les racines de T_3 , donc $T_3(t_1) = T_3(t_2) = T_3(t_3) = 0$.

$$\forall P \in E_5, \quad I(P) = \sum_{i=1}^3 a_i P(t_i)$$

4. Nous revenons maintenant au cas général.

- (a) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \sin x \sum_{j=1}^n \cos((2j-1)x) &= \sum_{j=1}^n \sin x \cos((2j-1)x) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (\sin(x + (2j-1)x) + \sin(x - (2j-1)x)) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (\sin(2jx) + \sin(2(1-j)x)) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (\sin(2jx) - \sin(2(j-1)x)) \\ &= \frac{1}{2} (\sin(2nx) - \sin(0)) = \frac{1}{2} \sin 2nx \end{aligned}$$

après télescopage.

$$\text{Donc pour tout } x \text{ tel que } \sin x \neq 0 : \sum_{j=1}^n \cos((2j-1)x) = \frac{\sin 2nx}{2 \sin x}$$

- (b) Soit $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$,

$$s_k = \sum_{j=1}^n T_k(t_j) = \sum_{j=1}^n T_k(\cos \theta_j) = \sum_{j=1}^n \cos(k\theta_j) = \sum_{j=1}^n \cos((2j-1)x_k)$$

avec $x_k = \frac{k\pi}{2n}$ et donc $\sin x_k \neq 0$, sauf pour $k = 0$.

Donc, pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$

$$s_k = \frac{\sin(2nx_k)}{2 \sin(x_k)} = \frac{\sin(2k\pi)}{2 \sin(x_k)} = 0$$

et $s_0 = n$ ($T_0(x) = 1$)

$$\text{Donc } s_0 = n \text{ et pour tout } k \in \{1, \dots, n-1\}, s_k = 0.$$

- (c) On sait qu'il existe une unique famille $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que pour tout $P \in E_{n-1}$, $\int_0^\pi P(\cos \theta) d\theta = \sum_{j=1}^n a_j P(t_j)$.

Par unicité de $(a_1, \dots, a_n)$, il suffit de trouver un n -uplet satisfaisant l'égalité ci-dessus pour affirmer qu'il s'agit de celui que l'on cherche.

Pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, d'après la question IV-2,

$$\int_0^\pi T_k(\cos \theta) d\theta = \langle T_k, T_0 \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq 0 \\ \pi & \text{si } k = 0 \end{cases} = \pi \delta_{k,0}$$

Et par ailleurs, pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, la question précédente donne

$$\sum_{j=1}^n T_k(t_j) = s_k = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq 0 \\ n & \text{si } k = 0 \end{cases} = n \delta_{0,k}$$

donc, pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$:

$$\int_0^\pi T_k(\cos \theta) d\theta = \pi \delta_{k,0} = \frac{\pi}{n} \times n \delta_{k,0} = \frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n T_k(t_j).$$

Enfin, $(T_0, \dots, T_n)$ est une base de E_{n-1} et les deux membres des égalités ci-dessus sont linéaires en T_k donc, pour tout $P \in E_{n-1}$, en décomposant P dans la base $(T_0, \dots, T_n)$, on obtient

$$\int_0^\pi P(\cos \theta) d\theta = \frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n P(t_j). \quad (1)$$

Ainsi, par unicité des coefficients $(a_1, \dots, a_n)$, on peut affirmer que

$$\text{pour tout } j \in \{1, 2, \dots, n\}, a_j = \frac{\pi}{n}.$$

Il reste à étendre (E), établie pour $P \in E_{n-1}$ à $P \in E_{2n-1}$. Pour cela reprenons l'idée de la question IV-2. Soit $P \in E_{2n-1}$ fixé.

Notons Q et R le quotient et le reste de la division euclidienne de P par T_n . D'après la question IV-2(b),

$$I(P) = I(R) = \int_0^\pi R(\cos \theta) d\theta$$

Pa ailleurs, par définition du reste de la division euclidienne par un polynôme de degré n , $R \in E_{n-1}$ donc la formule (E) ci-dessus s'applique à R :

$$I(R) = \frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n R(t_j)$$

si bien que

$$I(P) = \frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n R(t_j)$$

Enfin, pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, t_j étant une racine de T_n , $P(t_j) = Q(t_j) \underbrace{T_n(t_j)}_{=0} + R(t_j) = R(t_j)$ donc

$$I(P) = \frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n R(t_j) = \frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n P(t_j)$$

Nous venons donc de prouver que

$$\text{pour tout } P \in E_{2n-1}, I(P) = \frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n P(t_j).$$

(d) On a, puisque $n \neq 0$ (dans cette partie $n \in \mathbb{N}^*$),

$$I(T_{2n}) = \int_0^\pi T_{2n}(\cos \theta) d\theta = \int_0^\pi \cos(2n\theta) d\theta = \left[\frac{1}{2n} \sin(2n\theta) \right]_0^\pi = 0$$

alors que (un peu comme précédemment en question IV-4(b)) :

$$\sum_{j=1}^n T_{2n}(t_j) = \sum_{j=1}^n \cos\left(2n \times \frac{(2j-1)\pi}{2n}\right) = \sum_{j=1}^n \cos((2j-1)\pi) = \sum_{j=1}^n (-1) = -n.$$

$$\text{Ainsi, } I(T_{2n}) \neq \frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n T_{2n}(t_j).$$

Ainsi l'équation (E) est vérifiée pour $k = 2n - 1$ mais il existe au moins un polynôme de E_{2n} (en l'occurrence T_{2n}) pour lequel elle n'est pas satisfaite.

Par conséquent,

$$\text{le plus grand entier } k \text{ tel que (E) est } k = 2n - 1. \text{ Et dans ce cas, pour tout } i \in \{1, 2, \dots, n\}, a_i = \alpha = \frac{\pi}{n}$$

En analyse numérique, on dit que la méthode qui consiste à approcher la valeur de l'intégrale $\int_0^\pi f(\cos \theta) d\theta$ (pour $f \in E$) par la quantité $\frac{\pi}{n} \sum_{j=1}^n f(t_j)$ est une méthode d'intégration approchée d'ordre $2n - 1$ (elle est exacte pour tous les polynômes de degré $\leq 2n - 1$ et inexacte pour au moins un polynôme de degré $2n$).

V - Polynômes de meilleure approximation au sens de Tchebychev

1. (a)

FIGURE 1 – Graphe sur $[-1, 1]$ de $x \mapsto \sin(2\pi x)$ qui équi oscille sur 4 points et a une norme infinie de 1.

(b) Dans la question I-3(b) appliquée pour $n \leftarrow n + 1$, nous avons prouvé qu'il existe $(c_0, \dots, c_{n+1})$ tels que

$$\forall k \in \{0, 1, \dots, n+1\}, |T_{n+1}(c_k)| = \|T_{n+1}\|_\infty \text{ et } \forall k \in \{1, \dots, n+1\}, T_{n+1}(c_k) = -T_{n+1}(c_{k-1})$$

De plus, pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n+1\}$, $c_k = \cos \frac{k\pi}{n+1}$ et la fonction $\cos$ est strictement décroissante sur $[0, \pi]$ donc

$$0 = \frac{0 \times \pi}{n+1} < \frac{\pi}{n+1} < \frac{2\pi}{n+1} < \dots < \frac{(n+1)\pi}{n+1} = \pi \Rightarrow 1 = c_0 > c_1 > c_2 > \dots > c_{n+1} = -1$$

Ainsi, le polynôme T_{n+1} de Tchebychev d'indice $n+1$ équi oscille sur $n+2$ points.

2. (a) Soit $i \in \{0, 1, \dots, n+1\}$ tel que $f(x_i) - P(x_i) > 0$.

★ D'une part le signe de $(f - P)(x_i)$ et l'hypothèse d'équi oscillation de $f - P$ en $n+2$ points parmi lesquels x_i donnent

$$f(x_i) - P(x_i) = |f(x_i) - P(x_i)| = \|f - P\|_\infty$$

★ D'autre part l'hypothèse $\|f - Q\|_\infty < \|f - P\|_\infty$ garantit que

$$f(x_i) - Q(x_i) \underbrace{\leq}_{\forall t \in \mathbb{R}, t \leq |t|} |f(x_i) - Q(x_i)| \leq \|f - Q\|_\infty < \|f - P\|_\infty$$

donc

$$f(x_i) - Q(x_i) < f(x_i) - P(x_i)$$

d'où

$$Q(x_i) - P(x_i) > 0.$$

(b) Par hypothèse dans le raisonnement suggéré par l'énoncé, $\|f - Q\|_\infty < \|f - P\|_\infty$ donc $\|f - P\|_\infty > 0$. L'hypothèse d'équi oscillation de $f - P$ en les $n+2$ points $x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1}$ garantit que

$$\forall k \in \{0, 1, \dots, n+1\}, |f(x_k) - P(x_k)| = \|f - P\|_\infty > 0$$

et impose que,

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, n+1\}, f(x_k) - P(x_k) = -(f(x_{k-1}) - P(x_{k-1}))$$

donc la fonction $f - P$ prend, pour tout $i \in \{1, \dots, n+1\}$, des valeurs non nulles de signes opposés en les extrémités du segment $[x_{i-1}, x_i]$. Or d'après la question précédente, le signe (au sens strict) en x_i de $Q - P$ est le même que celui (au sens strict) de $f - P$ en x_i donc $Q - P$ prend, pour tout $i \in \{1, \dots, n+1\}$, des valeurs non nulles de signes opposés en les extrémités du segment $[x_{i-1}, x_i]$. $Q - P$ est une fonction continue sur $[x_{i-1}, x_i]$ (car polynomiale sur $[-1, 1]$) donc le théorème des valeurs intermédiaires permet d'affirmer que $Q - P$ s'annule au moins une fois sur $[x_{i-1}, x_i]$ or ce n'est ni en x_{i-1} , ni en x_i donc

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n+1\}, \exists z_i \in]x_{i-1}, x_i[: (Q - P)(z_i) = 0.$$

Par conséquent, $Q - P$ est un polynôme de degré inférieur ou égal à n (différence de deux polynômes de E_n) qui s'annule en au moins $n + 1$ valeurs distinctes $z_1 < z_2 < \dots < z_n$ donc c'est le polynôme nul donc

$$\boxed{P = Q.}$$

Reprenons le raisonnement proposé par l'énoncé.

P est un élément de E_n tel que $f - P$ équioscille sur $n + 2$ points.

Supposons qu'il existe $Q \in E_n$ tel que $\|f - Q\|_\infty < \|f - P\|_\infty$ (*hyp*).

Alors nous venons de prouver que $P = Q$ donc $\|f - Q\|_\infty = \|f - P\|_\infty$ ce qui contredit l'hypothèse (*hyp*).

Par conséquent,

$$\forall Q \in E_n, \|f - Q\|_\infty \geq \|f - P\|_\infty$$

ce qui caractérise (propriété (ii) de la définition de l'énoncé) le fait que

$$\boxed{P \in E_n \text{ est un PMAT de } f \text{ d'ordre } n.}$$

3. ★ D'après la question I-2(c), T_{n+1} est un polynôme de degré $n + 1$ dont le coefficient dominant est 2^n donc $2^{-n}T_{n+1}$ est unitaire de degré $n + 1$ si bien que $q_n : x \mapsto x^{n+1} - 2^{-n}T_{n+1}(x)$ est polynomiale de degré inférieur ou égal à n : $q_n \in E_n$.

★ Dans cette question, fonction $f - q_n$ est la fonction $2^{-n}T_{n+1}$, or d'après la question V-1(b), T_{n+1} équioscille sur $(n + 2)$ points donc, en observant que la propriété d'équioscillation sur k points est préservée par multiplication du polynôme considéré par un scalaire, $f - q_n$ équioscille sur $(n + 2)$ points.

Le résultat de la question V-2 précédente s'applique :

$$\boxed{q_n \text{ est un PMAT d'ordre } n \text{ de } f.}$$

4. Soit P un polynôme unitaire de degré $n + 1$.

Posons $R = P - X^{n+1} \in E_n$ de sorte que $P = X^{n+1} + R$, et $a_n = X^{n+1} - 2^{-n}T_{n+1} + R = P - 2^{-n}T_{n+1}$.

★ Nous avons vu dans la question précédente que $q_n : x \mapsto x^{n+1} - 2^{-n}T_{n+1}(x)$ appartient à E_n , or $R \in E_n$ donc $a_n = q_n - R \in E_n$.

★ Dans cette question, fonction $P - a_n$ est la fonction $2^{-n}T_{n+1}$, donc (voir question précédente) $P - a_n$ équioscille sur $(n + 2)$ points.

Le résultat de la question V-2 précédente s'applique : a_n est un PMAT d'ordre n de P donc (propriété (ii) de la définition)

$$\forall Q \in E_n, \underbrace{\|P - a_n\|_\infty}_{= \|2^{-n}T_{n+1}\|_\infty} \leq \|P - Q\|_\infty$$

En particulierisant la relation ci-dessus pour $Q = 0 \in E_n$,

$$\|2^{-n}T_{n+1}\|_\infty \leq \|P\|_\infty$$

Par homogénéité de la norme uniforme, $\|2^{-n}T_{n+1}\|_\infty = 2^{-n}\|T_{n+1}\|_\infty$ et nous avons prouvé dans la question I-3(b) que $\|T_{n+1}\|_\infty = 1$ donc

$$\boxed{\text{pour tout polynôme } P \text{ unitaire de degré } n + 1, \text{ on a } \|P\|_\infty \geq \frac{1}{2^n}.$$

5. (a) Soit P est un polynôme de degré $n + 1$ fixé.

Notons $c \in \mathbb{R}^*$ son coefficient dominant.

$c^{-1}P$ est un polynôme unitaire de degré $n + 1$ donc le raisonnement mené dans la question précédente prouve que $c^{-1}P - 2^{-n}T_{n+1}$ est un PMAT d'ordre n de $c^{-1}P$.

Montrons que $P - c2^{-n}T_{n+1}$ est un PMAT d'ordre n de P .

★ Le degré de $P - c2^{-n}T_{n+1}$ est inférieur ou égal à n car P et $c2^{-n}T_{n+1}$ sont de degré $n + 1$ et ont le même coefficient dominant.

★ Soit $Q \in E_{n-1}$ fixé quelconque. Par homogénéité de la norme,

$$\|P - Q\|_\infty = \|cc^{-1}P - Q\|_\infty = |c|\|c^{-1}P - c^{-1}Q\|_\infty$$

or $c^{-1}P - 2^{-n}T_{n+1}$ est un PMAT de $c^{-1}P$ donc

$$\|P - Q\|_\infty = |c|\|c^{-1}P - c^{-1}Q\|_\infty \geq \underbrace{|c|\|c^{-1}P - (c^{-1}P - 2^{-n}T_{n+1})\|_\infty}_{\text{homogénéité de la norme}} = \|P - (P - 2^{-n}cT_{n+1})\|_\infty$$

$$\boxed{\text{Ainsi, un PMAT d'ordre } n \text{ de } f \text{ est } P - 2^{-n}cT_{n+1}.$$

(b) Appliquons le résultat de la question précédente pour $P = 5X^3 + 2X - 3$, $n = 2$, sachant que $T_3 = 4X^3 - 3X$,

$$\boxed{\text{Ainsi, un PMAT d'ordre } 2 \text{ de } f : x \mapsto 5x^3 + 2x - 3 \text{ est } x \mapsto \frac{23}{4}X - 3.$$