

Deuxième partie

Techniques analytiques, à travers l'histoire

Chapitre 6

Fonctions à la Euler

Résumé -

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux principales fonctions usuelles des mathématiques pré-eulerien (donc, jusqu'à la fonction Γ , exclue).

Nous reprenons les constructions historiques qui conduisent à ces fonctions, en espérant qu'ainsi, les propriétés caractéristiques de chacune seront mieux mémorisées.

Pour préparer le cours sur la dérivation des fonctions usuelles, nous donnerons une série d'inégalités localisées suffisantes pour calculer les dérivées.

Enfin, nous terminons ce chapitre en donnant une liste d'évaluations numériques des fonctions usuelles sous forme de somme infinies (convergentes). Nous en reparlerons (beaucoup) plus tard.

— Kahn Académie - Qu'est-ce qu'une fonction exponentielle?. <https://www.youtube.com/watch?v=pBeGfLoId4I>

— Micmath - Merveilleux logarithmes. <https://www.youtube.com/watch?v=rWfl7Pw8YVE>

Sommaire

1. Problèmes	100
2. Généralités sur les fonctions	100
2.1. Définition et opérations sur les fonctions	100
2.2. Représentation d'une fonction	102
2.3. Vocabulaire d'analyse de fonctions	103
2.4. Bijections et réciproques	105
2.5. Etude des branches infinies en ∞	107
3. Fonctions trigonométriques	108
3.1. Fonctions circulaires	108
3.2. Fonctions circulaires réciproques	109
4. Fonctions polynomiales et puissances rationnelles	111
4.1. Fonction puissance entière relative	111
4.2. Fonctions polynomiales	113
4.3. Fonction puissance rationnelle	114
5. Exponentielles et logarithmes	115
5.1. ExponentielleS	115
5.2. LA fonction exponentielle	117
5.3. LogarithmeS	120
5.4. Retour sur les fonctions puissances, avec un exposant non rationnel	121
5.5. Croissances comparées	122
5.6. Fonctions hyperboliques directes	123
6. Sommes numériques infinies	124
7. Bilan	125

1. Problèmes

Histoire - Evolution de la notion de fonction

Pour Leibniz puis Euler, qui a été le premier à utiliser le mot de « fonction » et pour les mathématiciens du XVIII^e-ième siècle, l'idée de relation fonctionnelle était plus ou moins assimilée à l'existence d'une formule mathématique simple exprimant la nature exacte de cette relation. Cette conception s'est révélée trop étroite pour les exigences de la physique mathématique, et l'idée de fonction, ainsi que la notion de limite qui lui est associée, ont subi un long processus de clarification et de généralisation.

Par exemple : $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ n'est pas une fonction pour Euler; mais pour nous (et vous?) c'est bien une fonction!

? Problème 26 - Fonction par morceaux

L'application $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ est-elle bien une fonction (à la « Euler »)?

? Problème 27 - Comment calculer π^e ?

Pour l'étude des fonctions usuelles, il est très important pour chacun d'être en mesure de savoir comment faire le calcul des valeurs, sans raccourci avec la calculatrice.

Il faudra néanmoins faire ces calculs pour les nombres rationnels (et pour les nombres réels, on verra plus loin...).

Les nombres π et e sont des nombres réels bien définis.

Comment faire ce calcul? Les nombres réels sont approchés par des nombres rationnels.

On va donc commencer par essayer de calculer $\left(\frac{22}{7}\right)^{\frac{8}{3}}$, puis de manière générale de r^z où $r, z \in \mathbb{Q}$.

Deux temps d'analyse :

1. On fixe $z \in \mathbb{Q}$ et on étudie $t \mapsto t^z$, pour $t \in \mathbb{R}$. Ce sont les fonctions puissances.
2. On fixe $r \in \mathbb{Q}$ puis $r \in \mathbb{R}$ et on étudie $t \mapsto r^t$, pour $t \in \mathbb{R}$. Ce sont les fonctions exponentielles.

? Problème 28 - Interpolation de la suite géométrique

Existe-t-il une fonction simple (polynomiale) qui interpole la suite géométrique de raison r ($= 2$ par exemple)?

Comment l'étudier?

? Problème 29 - De la multiplication à l'addition

Additionner deux nombres de tailles n se fait en gros en $2n$ calculs. Pour les multiplier l'algorithme classique nécessite n^2 multiplications de chiffres, puis une addition de n nombres...

Peut-on trouver un moyen simple qui transmute les multiplications en additions? Une fonction telle que : $f(a \times b) = f(a) + f(b)$?

2. Généralités sur les fonctions

2.1. Définition et opérations sur les fonctions

Définition - Fonction

Une fonction d'une variable réelle, à valeurs réelles, est un "procédé" qui à chaque élément x d'un sous-ensemble $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$ associe un réel $f(x)$ parfaitement déterminé. Une telle fonction est notée

$$\begin{aligned} f: \mathcal{D} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

$f(x)$ est appelé image de x par f .

Si $y \in \mathbb{R}$, tout élément x de $\mathcal{D}$ vérifiant $f(x) = y$ est appelé un antécédent de y .



Remarque - Ensemble de définition

Le fait d'écrire $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ sous-entend que $f(x)$ est parfaitement défini si $x \in \mathcal{D}$.

Il est toutefois fréquent en pratique que l'ensemble $\mathcal{D}$ ne soit pas connu a priori. À partir de l'expression de $f(x)$, il faut déterminer l'ensemble des réels x pour lesquels elle a un sens. Cet ensemble est appelé domaine de définition de f (généralement noté $\mathcal{D}_f$). Il est souvent constitué d'une réunion d'intervalles.

Définition - Ensemble des applications

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, non vide et non réduit à un point.

On note $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions définies sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$ (on parle aussi d'applications de I dans $\mathbb{R}$)

Définition - Opérations classiques

Dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ on définit les opérations suivantes :

- Addition : si $(f, g) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})^2$, la fonction $f + g$ est définie sur I par

$$\forall x \in I, (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- Multiplication par un réel : si $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction λf est définie sur I par

$$\forall x \in I, (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

- Produit de deux fonctions : si $(f, g) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})^2$, la fonction fg est définie sur I par

$$\forall x \in I, (fg)(x) = f(x) \times g(x)$$

- Valeur absolue d'une fonction : si $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ la fonction $|f|$ est définie sur I par

$$\forall x \in I, |f|(x) = |f(x)|$$



Remarque - Lois internes...

Addition et multiplication de deux applications sont des lois internes sur $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, commutatives, associatives, l'application nulle est élément neutre pour l'addition et toute application f admet un opposé : l'application $-f$, l'application constante égale à 1 est élément neutre pour la multiplication, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. (On parle d'anneau pour décrire un ensemble ayant deux telles lois internes).

Définition - Composée

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f(I) \subset J$. On définit la composée $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\forall x \in I, (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

En général, même lorsque les deux fonctions $g \circ f$ et $f \circ g$ ont un sens, elles sont différentes.

Exercice

Définir proprement les deux composées (si cela est possible) des fonctions suivantes (ou de leurs restrictions) :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^2 - 1 \quad \text{et} \quad g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \frac{1}{x}$$

2.2. Représentation d'une fonction

Graphe - sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$

Définition - Graphe dans $\mathbb{R}^2$

Soit $H : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.


On note $\Gamma_H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid H(x, y) = 0\}$, une sous-partie de $\mathbb{R}^2$.

On dit que $H(x, y) = 0$ est une équation du graphe Γ .

Sans condition supplémentaire sur H , Γ peut être très varié.

Exemple - Folium de Descartes

Représentation - Folium



$\mathcal{F}$ d'équation $x^3 + y^3 - 3xy = 0$

Définition - Exemple. Graphe d'une fonction

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on appelle représentation graphique de f (ou graphe de f), la courbe $\mathcal{C} = \{(x, f(x)); x \in \mathcal{D}_f\}$.

On dit que $\mathcal{C}$ a pour équation $y = f(x)$ (car $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$).

On appelle aussi représentation graphique ou courbe représentative de f la représentation de cet ensemble dans le plan. La courbe représentative a pour équation $y = f(x)$.


Dans ce cas $H : (x, y) \mapsto y - f(x)$. Une telle courbe ne peut « revenir en arrière ». En effet, cela signifierait qu'un nombre x_0 aurait deux images.

Définition - Image de $\mathcal{D}$ par une fonction. Fonction restreinte

Si $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}_f$ ($\mathcal{D}'$ sous ensemble de $\mathcal{D}_f$), on note $f(\mathcal{D}')$ l'ensemble des images des éléments de $\mathcal{D}' : f(\mathcal{D}') = \{f(x); x \in \mathcal{D}'\}$. $f(\mathcal{D}')$ s'appelle l'ensemble image (ou image directe) de $\mathcal{D}'$ par f .

Soit $f : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et I un intervalle inclus dans $\mathcal{D}_f$. On appelle restriction de f à I la fonction g définie sur I par : $\forall x \in I, g(x) = f(x)$. On la note $f|_I$.

Représentation - Fonction



Pour tracer on commence bien par tous les points en noir : $x_i, f(x_i)$, on en déduit $A_i(x_i, f(x_i))$. Puis on relie tous ces points A_i , une courbe apparaît!

L'image de f est ici donné en rouge : c'est le segment $[1, 5]$.

Remarque - Restriction de sin. Et même à l'arrivée

L'application $\sin$ est définie sur $\mathbb{R}$, a priori à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On peut vouloir la restreindre à $[-\pi, \pi]$, pour obtenir une fonction injective : $\sin|_{[-\pi, \pi]}$.

Si l'on veut rendre cette fonction bijective, on peut aussi vouloir restreindre l'ensemble arrivée à $[-1, 1]$ pour gagner la surjectivité.

On note alors $\sin|_{[-\pi, \pi]}^{[-1, 1]}$, bijective. Sa réciproque est la fonction $\arcsin$.

Transformations graphiques

On commence par un travail d'analyse essentiel.

Analyse - Symétrie

Heuristique - Lieu des transformations

Pour les transformations suivantes, on notera qu'il peut y avoir un impact sur $\mathcal{C}$ d'équation

$y = f(x)$:

- sur l'axe des abscisses, lorsque la transformation g est du type $f \circ g$
- sur l'axe des ordonnées, lorsque la transformation g est du type $g \circ f$

Proposition - Translations

Le graphe de la fonction $x \mapsto f(x+a)$ s'obtient à partir de celui de f par une translation du vecteur $-a\vec{j}$. Le graphe de la fonction $x \mapsto f(x) + a$ s'obtient à partir de celui de f par une translation du vecteur $a\vec{j}$.

Représentation - Translation



$$y = f(x+2)$$

$$y = f(x) + 2$$


$y = f(x)$ est la courbe épaisse

Proposition - Symétries

Le graphe de la fonction $x \mapsto f(-x)$ s'obtient à partir de celui de f par une symétrie par rapport à (Oy) .

Le graphe de la fonction $x \mapsto -f(x)$ s'obtient à partir de celui de f par une symétrie par rapport à (Ox) .

Représentation - Symétrie



$$y = f(-x)$$

$$y = -f(x)$$

Pour la transformation suivante, on parle habituellement d'affinité (nom officiel des ces transformations), car il s'agit de dilatation/contraction selon une seule dimension (abscisse ou ordonnée) et non de deux dimensions (sinon ce serait une homothétie).


Proposition - Dilatation/contraction

Soit $\lambda > 0$.

Le graphe de la fonction $x \mapsto f(\lambda \cdot x)$ s'obtient à partir de celui de f par une contraction horizontale de rapport λ (si $\lambda > 1$) et une dilatation horizontale de rapport $\frac{1}{\lambda}$ (si $\lambda < 1$).

Le graphe de la fonction $x \mapsto \lambda \cdot f(x)$ s'obtient à partir de celui de f par une dilatation verticale de rapport λ (si $\lambda > 1$) et une contraction verticale de rapport $\frac{1}{\lambda}$ (si $\lambda < 1$).

Représentation - Dilatation/contraction



Savoir faire - Transformation sur le graphe

Soient $f : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$.

Comment obtient-on les domaines de définition ainsi que les graphes (ou représentations graphiques) des fonctions $x \mapsto f(x) + a$, $x \mapsto f(x+a)$, $x \mapsto f(a-x)$, $x \mapsto af(x)$?

$x \mapsto f(x) + a : \mathcal{D}_1 = \mathcal{D}$ et translation de $a\vec{j}$,

$x \mapsto f(x+a) : \mathcal{D}_2 = \{x \mid x+a \in \mathcal{D}\} = \mathcal{D} - a$ et translation de $-a\vec{i}$,

$x \mapsto f(a-x) : \mathcal{D}_3 = \{x \mid a-x \in \mathcal{D}\}$ (ex : si $\mathcal{D} = [c, d]$, alors $\mathcal{D}_3 =]a-d, a-c]$) et réflexion (symétrie) d'axe d'équation $x = \frac{a}{2}$ $x \mapsto af(x) : \mathcal{D}_4 = \mathcal{D}$ et homotétie-axiale de rapport a et de « centre » l'axe des abscisses.

Exercice

Tracer $y = \sin x$.

Puis les représentations de $y = \sin(2x)$, $y = \frac{1}{2} \sin(x + \pi)$, $y = 3 \sin(x) + \pi$

2.3. Vocabulaire d'analyse de fonctions

Parité, périodicité

Définition - Vocabulaire (et propriétés)

Soit $f : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction

- On dit que f est paire si

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = f(x)$$

$\mathcal{C}_f$ est alors symétrique par rapport à Oy

- On dit que f est impaire si

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = -f(x)$$


$\mathcal{C}_f$ est alors symétrique par rapport à O .

- $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est dite périodique s'il existe $T > 0$ tel que

$$\forall x \in D_f, x + T \in D_f, x - T \in D_f \text{ et } f(x + T) = f(x).$$


T est une période de f . $\mathcal{C}_f$ est alors invariante par translation de vecteur $T\vec{i}$.

On laisse les démonstrations au lecteur.

✱ **Représentation - Fonction paire****Fonctions monotones****Définition - Fonction croissante, décroissante et monotone**

On dit qu'une fonction f

- est croissante sur I si $\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
- est décroissante sur I si $\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.
- est monotone sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I .
- est strictement croissante sur I si $\forall (x, y) \in I^2, x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.
- est strictement décroissante sur I si $\forall (x, y) \in I^2, x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$.

✱ **Représentation - Fonction impaire****Proposition - Composition et monotonie**



La composée de deux applications monotones de même sens de variation (respectivement de sens contraire) est une application croissante (respectivement décroissante).

La démonstration est simple...

Démonstration**Fonctions convexes/concaves****Définition - Fonction convexe, concave**

On dit qu'une fonction f

- est convexe sur I si $\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1] f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- est strictement convexe sur I si $\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in]0, 1[f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- est concave sur I si $\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1] f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- est strictement concave sur I si $\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in]0, 1[f(\lambda x + (1 - \lambda)y) > \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.

✱ **Représentation - Fonction périodique de période T** ✱ **Représentation - Fonction strictement croissante**

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in]0, 1[\quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) > \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Fonctions (ou applications) bornées

Définition - Fonctions majorées, minorées, bornées

On dit qu'une fonction f :


- est majorée s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \leq M$.
- est minorée s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathcal{D}_f, m \leq f(x)$.
- est bornée si elle est majorée et minorée.

Proposition - Bilan

Une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est bornée

si et seulement si il existe $M > 0$ tel que $\forall x \in I, |f(x)| \leq M$.

*Représentation - Fonction majorée, minorée?



Fonction (a priori) majorée et non minorée, donc non bornée.

Extremums

Définition - Maximum, minimum et extremum

On dit que $M \in \mathbb{R}$ est un maximum sur I de f si

- $\forall x \in I, f(x) \leq M$
- et il existe $a \in I$ tel que $f(a) = M$
on dit que f présente un maximum en a .

On dit que $m \in \mathbb{R}$ est un minimum sur I de f si

- $\forall x \in I, f(x) \geq m$
- et il existe $a \in I$ tel que $f(a) = m$
on dit que f présente un minimum en a .

On parle d'extremum lorsque l'on a un maximum ou un minimum. On note

$$M = \max_{x \in I} f(x) \text{ et } m = \min_{x \in I} f(x)$$

Définition - Maximum local

On dit que $M = f(a)$ est un maximum local (maximum ou minimum)

s'il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout $x \in]a - \epsilon, a + \epsilon[\cap \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(a)$.

On parle de maximum strict, lorsque pour $x \in]a - \epsilon, a + \epsilon[\cap \mathcal{D}_f$ et $x \neq a$, $f(x) < f(a)$.



Remarque - Voisinage de a (dans $\mathbb{R}$)

Pour décrire un tel ensemble V , on parle souvent de voisinage de a .

Ainsi la restriction de f à $V =]a - \epsilon, a + \epsilon[\cap \mathcal{D}_f$ présente en a un extremum (stricte) respectivement).



Remarque - Extension de définition

La définition s'étend à minimum local et minimum local strict et à maximum local et maximum local strict.

*Représentation - Exemple

Sur la représentation de la fonction majorée non minorée, on peut voir trois maximums (maxima) locaux, tous stricts et deux sont aussi maximum global...

2.4. Bijections et réciproques

On commence par rappeler ce qu'est une fonction bijective avant de voir le rôle joué ici par la dérivée.

Bijection

Définition - Bijection

Soit f une fonction définie sur un sous-ensemble D de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $J \subset \mathbb{R}$.

On dit que f est bijective de D sur J (ou réalise une bijection de D sur J)

- si tout élément de D a son image dans J
- et si tout élément de J admet un unique antécédent par f dans D

Formellement :

$$\forall x \in D, f(x) \in J \quad \text{et} \quad \forall y \in J, \exists! x \in D, y = f(x).$$

**Remarque - Si, par convention $J = f(D)$**

Si l'on pose $J = f(D) = \{f(x); x \in D\} = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in D, y = f(x)\}$,

alors f est une bijection de D sur $J = f(D)$ si et seulement si $\forall y \in J, \exists! x \in D, y = f(x)$.

**Exemple - Application exponentielle****Définition - Application (bijection) réciproque**

Si f est bijective de D sur J , on définit une fonction g par

$$g : J \rightarrow D \\ y \mapsto x \quad | \quad y = f(x) \text{ (unique antécédent de } y \text{ par } f)$$

Cette fonction g est elle-même bijective et appelée bijection réciproque de f , et notée f^{-1} .

**Exemple - Application logarithmique****Proposition - Application directe**

Si f est une bijection de D sur J , on a

$$\forall x \in D, (f^{-1} \circ f)(x) = x;$$

$$\forall y \in J, (f \circ f^{-1})(y) = y;$$

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y).$$

Théorème - Réciproque et représentation graphique

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection et $f^{-1} : J \rightarrow I$ sa bijection réciproque. Alors

- dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice (droite d'équation $y = x$).
- Si f est monotone sur I alors f^{-1} est monotone sur J , de même sens de variations.

On verra des exemples plus loin.

Démonstration

On admet les théorèmes qui suivent et qui seront démontrés ultérieurement :

Théorème - Théorème de la bijection

Soit f une fonction définie sur I , continue, strictement monotone sur I (intervalle de $\mathbb{R}$),

alors f est bijective de I sur $J = f(I)$.

Sa bijection réciproque f^{-1} est continue sur J .

2.5. Etude des branches infinies en ∞

Le but est de préciser l'allure de la courbe représentative de f au voisinage de $(+ \text{ ou } -) \infty$.

 Savoir faire - Etude des branches infinies (et définition)

Soit f une fonction définie au voisinage de $\pm\infty$.

1. si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell$ avec $\ell \in \mathbb{R}$, la courbe admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = \ell$.
2. si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, on calcule $\frac{f(x)}{x}$.
 - (a) si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, il y a une **branche parabolique horizontale** (ou de direction Ox).
 - (b) si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, il y a une **branche parabolique verticale** (ou de direction Oy).
 - (c) si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$, $a \in \mathbb{R}^*$, il faut calculer $f(x) - ax$.
 - i. si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - ax = b \in \mathbb{R}$, la courbe admet une **asymptote oblique** d'équation $y = ax + b$.
 - ii. si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - ax = \infty$ il y a une **branche parabolique oblique de direction** $y = ax$.


Exercice

Énoncer des fonctions présentant :

1. une asymptote horizontale (on donnera l'équation de cette asymptote)
2. une branche parabolique horizontale
3. une branche parabolique verticale
4. une asymptote oblique (on donnera l'équation de cette asymptote)
5. une branche parabolique oblique (on donnera la direction), mais pas d'asymptote oblique

Exercice

Indiquer sous chacun des quatre graphiques suivants lesquels présentent des branches paraboliques, des asymptotes...




Remarque - Courbe asymptote

Plus généralement on dit que la courbe représentative de f admet au voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$ ou un réel a) admet pour courbe asymptote la courbe d'équation $y = g(x)$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - g(x) = 0$.

3. Fonctions trigonométriques

On reprend, de manière analytique (où le paramètre x devient une variable) les fonctions trigonométriques vues précédemment.

Représentation - Fonction cosinus



3.1. Fonctions circulaires


Proposition - Aspect analytique

Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques.
sin est une fonction impaire alors que cos est une fonction paire.

Savoir faire - Transférer un problème trigonométrique « en a », vers « en 0 »

Il faut exploiter les formules trigonométriques : $\sin(a + h) = \sin a \cos h + \cos a \sin h$ et $\cos(a + h) = \cos a \cos h - \sin a \sin h$, à connaître par cœur.

Représentation - Fonction sinus




Analyse - Inégalité fondamentale

Proposition - Inégalité

On a pour tout $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$,

$$|\sin x| \leq |x| \leq |\tan x| = \frac{|\sin x|}{\cos x}$$

Et en particulier $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Démonstration***Représentation - Cercle trigonométrique**

 **Exemple - Calculatrice.** Calculer $\sin(0,01234)$


Exercice

En majorant le module de $e^{ix} - 1$, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin^2 x + (\cos x - 1)^2 \leq x^2$.

Proposition - Fonction tangente - Aspect analytique

La fonction tangente est ainsi définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ ($\mathbb{R}$ privé des points de la forme $\frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$).

$\tan$ est impaire, π -périodique

***Représentation - Fonction tangente****Démonstration**Exercice

Etudier et représenter la fonction $\tan$

3.2. Fonctions circulaires réciproquesFonction arcsin

Définition - Arcsinus

La fonction sinus est continue et strictement croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ donc réalise une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$.
La bijection réciproque s'appelle arcsinus, $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
Elle est impaire, strictement croissante. On a donc :

$$t = \arcsin x \Leftrightarrow \left(\sin t = x \text{ et } t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \right)$$

Proposition - Rappels

- On a :
- $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \quad \arcsin(\sin x) = x$
 - $\forall x \in [-1, 1], \quad \sin(\arcsin x) = x$
 - $\forall x \in [-1, 1], \quad \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$
 - $\forall x \in]-1, 1[, \quad \tan(\arcsin x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

Analyse - Questions

Il faut connaître les valeurs remarquables suivantes :

x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

Exercice
Comparer $\arcsin x$ et x , à partir de la double inégalité fondamentale du sinus.

Fonction arccos

Définition - Arccosinus

La fonction cosinus est continue et strictement décroissante sur $[0, \pi]$ donc réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$.
La bijection réciproque s'appelle arccosinus, $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$.
Elle est strictement décroissante et on a donc :

$$t = \arccos x \Leftrightarrow \left(\cos t = x \text{ et } t \in [0, \pi] \right)$$


Proposition - Rappels

- On a :
- $\forall x \in [0, \pi], \quad \arccos(\cos x) = x$
 - $\forall x \in [-1, 1], \quad \cos(\arccos x) = x$
 - $\forall x \in [-1, 1], \quad \sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$
 - $\forall x \in [-1, 1], x \neq 0, \quad \tan(\arccos x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$
 - $\forall x \in [-1, 1], \quad \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$


Il faut connaître les valeurs remarquables suivantes :

x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0

Représentation - Fonction arcsin



Représentation - Fonction arccos



Fonction $\arctan$ **Définition - Arctangente**

La fonction tangente est continue et strictement croissante sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ donc réalise une bijection de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ sur $\mathbb{R}$.

La bijection réciproque s'appelle arctangente, $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$.


Elle est impaire, strictement croissante et on a donc :

$$t = \arctan x \Leftrightarrow \left(\tan t = x \text{ et } t \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [\right)$$

Proposition - Rappels

On a :

- $\forall x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$, $\arctan(\tan x) = x$
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan x) = x$
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$

***Représentation - Fonction** $\arctan$ 

Il faut connaître les valeurs remarquables suivantes :

x	0	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\arctan x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$

4. Fonctions polynomiales et puissances rationnelles

On reprend, de manière analytique (où le paramètre x devient une variable) les fonctions puissances et polynomiales vues précédemment.

4.1. Fonction puissance entière relative

Définition**Définition - Puissance entière > 0**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on qualifie de fonction puissance entière l'application $x \mapsto x^n$, i.e. définie par récurrence par $x \mapsto x \times x^{n-1}$ et $x^0 = 1$.

Son ensemble de définition est $\mathbb{R}$. C'est une fonction continue (nous le verrons plus tard).

Cette application est paire si n est pair, et impaire si n est impair.

Pour aller plus loin - Besoin d'inégalités

Pour étudier les limites variées (à l'infini, ou calculer des dérivées), on a toujours besoin d'encadrement.

Dans chaque partie, on trouvera des inégalités importantes

Il faut savoir représenter ces fonctions.

Définition - Puissance entière < 0

Soit $m \in \mathbb{Z}_-$, on qualifie de fonction puissance entière négative l'application $x \mapsto x^m = \frac{1}{x^{-m}}$, i.e. définie par récurrence par $x \mapsto \frac{1}{x} \times x^{m+1}$ et $x^0 = 1$.

Son ensemble de définition est $\mathbb{R}^*$. C'est une fonction continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et

Histoire - Notation des puissances et puissances négatives

Cette notation émerge petit à petit chez Bombelli (1572), Simon Stevin (1585), Descartes puis Newton.

sur $\mathbb{R}_+^*$.

Cette application est paire si n est pair, et impaire si n est impair.

Il faut savoir représenter ces fonctions, en particulier l'hyperbole $\mathcal{C}$ associé à $x \mapsto \frac{1}{x}$ ($m = -1$).

Proposition - Morphisme

On a pour tout $m, n \in \mathbb{Z}$ et $x \in \mathbb{R}^*$, $x^m \times x^n = x^{m+n}$.

Vrai également en $x = 0$, si $n, m > 0$.

Exercice

A démontrer

Inégalités de croissance

Fixons $n \in \mathbb{N}$.

Pour la croissance de $x \mapsto x^n$, on exploite le binôme de Newton, par exemple :

Proposition - Binôme de Newton. Croissance

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $(a+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} x^k$.

Avec $a, x > 0$, on a donc $x < x' \Rightarrow x^n < x'^n$, soit la croissance de $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}_+$.

Démonstration

Exercice

Faire la démonstration par récurrence.

On fera bien attention aux variables fixées et celles qui sont libres

Inégalités de Bernoulli

Proposition - Inégalités de Bernoulli

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in]-1, +\infty[$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in]-1, \frac{1}{n}[$, $(1+x)^n \leq \frac{1}{1-nx}$

Démonstration

L'exercice suivant permet de montrer la continuité des fonctions puissances.

Exercice

On fixe $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^n = 1$, puis la continuité à droite de $t \mapsto t^n$ en 1 et en tout $x \in \mathbb{R}$.

4.2. Fonctions polynomiales

Définition - Fonction polynomiale

On appelle fonction polynomiale une fonction de la forme :

$$f : x \mapsto a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k$$

où $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $a_k \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) ;

Il s'agit d'une combinaison linéaire finie de puissances entières de la variable x . On parle de polynôme simple ou de polynôme à une variable.

On dit que $f(x) = b$ est une équation polynomiale si f est une fonction polynomiale.

Remarque - Notations

On remarque que les lettres de fin d'alphabet sont en générale associées à des inconnues. Les lettres de début d'alphabet aux variables connues.

On comprend pour les inconnues : on ne peut pas faire autrement. Mais pourquoi associer des lettres à des nombres connus ?

Par propriétés calculatoires sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$:

Proposition - Propriété de l'ensemble des fonctions polynomiales

Si f et g sont deux fonctions polynomiales, alors :

- $f + g$ est une fonction polynomiale
- $f \times g$ est une fonction polynomiale
- $f \circ g$ est une fonction polynomiale.

Démonstration

Rappelons :

Théorème - Factorisation multiple

Soit f une fonction polynomiale de degré n . Soit $p \leq n$

Si $x_1, x_2, \dots, x_p$, p solutions différentes de l'équation $f(x) = 0$ (racines de f).

Alors il existe g_p , fonction polynomiale de degré $n - p$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_p) \times g_p(x)$$

Corollaire - Nombre maximal de solution

Une équation polynomiale de degré n admet au plus n solutions différentes

4.3. Fonction puissance rationnelle

Définition

🔍 Analyse - Bijection de $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}_+$

Définition - Racine n -ième

On note $\sqrt[n]{}$ la bijection réciproque de $x \mapsto x^n$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \text{si } n \text{ est pair} \quad \sqrt[n]{x} &= x^{1/n} && \text{pour } x \geq 0 \\ \text{si } n \text{ est impair} \quad \sqrt[n]{x} &= \begin{cases} x^{1/n} & \text{pour } x \geq 0 \\ -|x|^{1/n} = -(-x)^{1/n} & \text{pour } x \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Pour n impair on a donc $\sqrt[n]{-x} = -\sqrt[n]{x}$.

Définition - Puissance rationnelle

Soit $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}^*$ (avec $q \in \mathbb{N}^*$, $p \in \mathbb{Z}$), on qualifie de fonction puissance rationnelle l'application $x \mapsto x^r$ où x^r vérifie $(x^r)^q = x^p$.

Son ensemble de définition est $\mathbb{R}_+^*$. C'est une fonction croissante et continue (nous l'admettons à ce stade).

🍃 Exemple - $5^{2/3}$

Inégalités complémentaires

🔍 Analyse - Image de $[0, 1[$ et image de $]1, +\infty[$ par $x \mapsto x^r$

Proposition - Comparaison des fonctions puissances

Soient $r < r' \in \mathbb{Q}$.

Alors pour tout $x > 1$, $x^r < x^{r'}$. Et si $x < 1$, $x^r > x^{r'}$.

Démonstration**⚠ Attention - Ne pas confondre les variables x et n**

Dès maintenant, on fait bien attention lorsqu'on compare à x fixé x^r et

x^s ,

et lorsqu'on compare à r fixé x^r et $x^{r'}$.

5. Exponentielles et logarithmes**↗ Heuristique - Histoire**

Les mathématiciens ont d'abord rencontré les fonctions logarithmiques (STEVIN, BRIGGS, NEPER) au XVI^{ème} siècle.

Ils cherchaient un processus pour transformer multiplication (complexe) en addition (plus simple).

Il s'agissait d'interpoler la réciproque des suites géométriques : $n \mapsto a^n$, vérifiant $a^{n+m} = a^n \times a^m$.

Pour faciliter les démonstrations du cours, nous remonterons l'histoire (d'abord exponentielles avant logarithmes).

5.1. Exponentielles**↗ Heuristique - Equation fonctionnelle**

Soit $a \in \mathbb{R}$, si $n, m \in \mathbb{N}$, $a^{n+m} = a^n \times a^m$.

Cette relation est centrale si l'on s'intéresse à $x \mapsto a^x$.

Considérons donc $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant pour tous nombres réels $x, y \in \mathbb{R}$: $f(x+y) = f(x) \times f(y)$.

Est-ce qu'une telle relation est suffisante pour définir parfaitement aucune (non car $t \mapsto 2^t$ semble bien aller, au moins pour $t \in \mathbb{Q}$), une fonction f , ou plusieurs? Et dans ce cas, que rajouter pour différencier ces différentes fonctions?

🔍 Pour aller plus loin - Notation

Dans Quadrature n°137, on trouve les notations $\cdot$ pour $+$, $\cdot$ pour $\times$ et $^{\cdot}$ pour une puissance.

On trouve alors $a^p \cdot a^q = a^{(p,q)}$ ce qui s'interprète comme $a^p \times a^q = a^{p+q}$ et autres relations automatisées du même genre.

On notera le pluriel :

Définition - Fonctions exponentielles

On qualifie de fonctions exponentielles les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, non nulles vérifiant :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : f(x+y) = f(x) \times f(y).$$

Proposition - Propriété commune à toutes les exponentielles

Si f est une fonction vérifiant : $f(x + y) = f(x) \times f(y)$, alors f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

Puis : ou bien $f : x \mapsto 0$, ou bien $f(0) = 1$.

Donc une fonction exponentielle est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et $f(0) = 1$.

Démonstration**Proposition - Base**

Si f est une fonction exponentielle non nulle, alors il existe un nombre $a \in \mathbb{R}_+$, tel que pour tout $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = a^x$

✂ Savoir faire - Etude d'une équation fonctionnelle de $\mathbb{N}$ à $\mathbb{R}$

L'étude d'une équation fonctionnelle se fait souvent de la façon suivante :

1. Par récurrence, en étudiant $f(sn)$ pour $n \in \mathbb{N}$ et s quelconque.
2. Par imparité/parité (ou autre symétrie), on étudie $f(sm)$ pour $m \in \mathbb{Z}$.
3. On retrouve ensuite le résultat pour $m \in \mathbb{Q}$.
4. Ensuite, on exploitera (plus tard) un argument de continuité ou bien un argument de croissance

Démonstration

Proposition - Variations

Soi f une fonction exponentielle est non nulle,
 f est strictement croissante sur $\mathbb{Q}$ si $f(1)(=a) > 1$
 et elle est décroissante sur $\mathbb{Q}$ si $f(1)(=a) < 1$

Démonstration **Pour aller plus loin - Suite décimale**

Prenons un exemple pour mieux comprendre ici.
 Considérons le nombre π , on a alors $\pi = 3,1415\dots$
 Dans ce cas : $d_0 = 3$, $d_1 = 3,1$, $d_2 = 3,14$, $d_3 = 3,141\dots$

 Analyse - Comment définir $f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$ Exercice

On note $a = f(1)$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{Q}$, $f(rx) = f(x)^r$.
 Quelle formule obtient concernant les puissances de a ?

On résume et admet les derniers résultats (il nous manque la continuité) :

 Pour aller plus loin - Définition de a^x

Il faudrait démontrer que cette valeur ne dépend pas de la suite (d_n) choisie, convergente vers x .

Théorème - Fonctions exponentielles. Bilan

Les fonctions exponentielles non nulles sont continues.
 Elles vérifient : $f(0) = 1$ et pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $f(x+y) = f(x) \times f(y)$ et $f(x \times y) = f(x)^y$ ($y \in \mathbb{Q}$, puis $\mathbb{R}$ par densité et continuité).
 Il existe $a (= f(1)) \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = a^x$ (par définition de a^x si $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).
 Si $a > 1$, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = 0$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.
 Si $a < 1$, alors f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = +\infty$ et $\lim_{+\infty} f = 0$.

Exercice

Soit $a > 0$ et f une fonction exponentielle de base a .

1. Soit $h > 0$ et $x \in \mathbb{R}$, montrer que $f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) \geq 0$
2. Montrer que pour tout $x < y \in \mathbb{R}$, $\lambda = \frac{1}{2}$,

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

3. Montrer que le résultat reste vrai pour tout λ de la forme $\frac{r}{2^n}$ avec $r \in \llbracket 0, 2^n \rrbracket$.
 On dit alors que f est convexe

5.2. LA fonction exponentielle

Nous verrons que ces fonctions sont dérivables. L'une a la propriété essentielle de vérifier $f'(0) = 1$. C'est LA fonction exponentielle avec $a = e$ (LE « e »). Prenons une autre définition.

Définition - La fonction exponentielle naturelle

Soit $x \in \mathbb{R}$. La suite $(x_n) = (1 + \frac{x}{n})^n$ est majorée, croissante à partir d'un certain rang, donc convergente.

Notons $\exp(x)$ la limite de (x_n) .

Il faut démontrer la convergence de la suite :

Démonstration**Pour aller plus loin - Critère de convergence pour une suite réelle**

Nous verrons, sans cercle vicieux, que toute suite de nombres réelles, majorée et croissante (à partir d'un certain rang) est convergente.

C'est une propriété caractéristique de $\mathbb{R}$.


Proposition - Inégalités

On a pour tout $x \in]-1, 1[$, $1 + x \leq \exp x \leq \frac{1}{1-x}$.

Remarque - Elargissement de l'intervalle

En fait, le résultat est vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$ pour la première inégalité et sur $]-\infty, 1[$ pour la seconde.

Mais en réalité, elles nous serviront surtout pour x proche de 0, où les trois termes valent 1...

Représentation - Inégalités**Démonstration****Théorème - exp est une fonction exponentielle.**

La fonction $x \mapsto \exp x$ est une fonction exponentielle appelée LA fonction exponentielle.

On a donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) = e^x$ où $e = \exp(1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

Elle vérifie donc : $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $\exp(x+y) = e^{x+y} = e^x e^y = \exp(x) \times \exp(y)$ et $\exp(x \times y) = e^{xy} = (e^x)^y = (\exp(x))^y$.

Histoire - D'où vient la notation e ?

Leonard Euler (1707-1783) est le mathématicien le plus prolifique de l'histoire (avec Cauchy?).

C'est un calculateur de génie, doté d'une mémoire prodigieuse (hypemnésique).

**Démonstration****Application - Evaluation approchée de $(1 + \frac{1}{30})^{100}$**

🔍 Analyse - Binôme de Newton pour $(1 + \frac{1}{n})^n$ et une approximation d'Euler

Proposition - Formules d'Euler (1746)

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$$

Et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$

5.3. Logarithmes

Les fonctions exponentielles non constante égale à 0 ou 1 sont continues et strictement monotone, elles admettent donc une fonction réciproque.

Histoire - Neper

L'écossais John Napier (1550-1617) (ou Neper) cherche au XVI^e siècle une fonction qui faciliterait les calculs : elle transformerait le produit (compliqué car beaucoup de calculs) en addition (moins de calculs).

Il trouve le logarithme.

On a donc $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

L'histoire peut être un moyen mnémotechnique.



Définition - Fonctions logarithmes

On appelle fonctions logarithmes toute fonctions g réciproques de fonctions exponentielles f non constantes.

Si cette dernière est $x \mapsto a^x$ (avec $a \notin \{0, 1\}$), alors la fonction logarithme est qualifiée « de base a ». On note souvent $g = \log_a$ ou $\ln_a$.

Elle est définie sur $\mathbb{R}_+$, à valeurs dans $\mathbb{R}$ et vérifie alors

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, g(x \times y) = g(x) + g(y).$$



Exemple - Différents logarithmes bien connus

Démonstration

Théorème - Fonctions logarithmes. Bilan

Les fonctions logarithmes sont continues, définies sur $\mathbb{R}_+^*$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Elles vérifient : $g(1) = 0$ et pour tout $x, y, t \in \mathbb{R}_+$, $g(x \times y) = g(x) + g(y)$ et $g(x^t) = t \times g(x)$.

Il existe $a (= f(1)) \in \mathbb{R}$ tel que $g(a) = 1$.

Si $a > 1$, alors g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{x \rightarrow 0} g = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g = +\infty$.

Si $a < 1$, alors g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{x \rightarrow 0} g = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g = -\infty$.

$$\lim_{+\infty} f = -\infty.$$

Démonstration

Savoir faire - Calculer « à la main » le logarithme en base a de x ?

On n'a pas d'autre solution (pour le moment) mais cela est suffisant (compte-tenu de la contrainte que l'on s'est donné) de procéder par dichotomie.

On regarde la suite (a^n) et l'on trouve $n \in \mathbb{N}$ tel que $a^n \leq x < a^{n+1}$.

Puis, on sélectionne $a_0 = n$ et $b_0 = n + 1$. Puis on peut (par exemple), considérer $c = \frac{a_0 + b_0}{2} \in \mathbb{Q}$, évaluer a^c .

Si $a^c < x$, on prend $a_1 = c$ et $b_1 = b_0$, sinon on prend $a_1 = a_0$ et $b_1 = c \dots$

On a deux suites adjacentes (a_n) et (b_n) convergente vers y avec $a^y = x$, donc $y = \log_a(x)$.

Définition - Le logarithme naturel

La fonction logarithme réciproque de la fonction exponentielle, donc le logarithme en base $e = \exp 1$ est appelé logarithme naturel.

On le note $\ln$.

$\ln$ est définie, continue et croissante sur $\mathbb{R}_+$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Numériquement : $\ln(1) = 0$, $\ln e = 1$, $\lim_{0} \ln = -\infty$ et $\lim_{+\infty} \ln = +\infty$.

On a les propriétés algébrique : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(a^b) = b \ln a \dots$

On a pour tout $u \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln u \leq u - 1$.

Tout est immédiat, sauf l'inégalité qu'on démontre :

Démonstration

Proposition - Ecriture en fonction du logarithme naturel


Soit g la fonction logarithme de base a , réciproque de $f : x \mapsto a^x$.

Alors on a :


$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a^x = \exp(x \times \ln a) \quad \forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Démonstration

Représentation - Exponentielles et logarithmes selon la valeur de a



Représentation - Exponentielle et logarithme naturels



5.4. Retour sur les fonctions puissances, avec un exposant non rationnel

Histoire - Logarithme naturel

Il y a un abus historique ici.

On a démontré historiquement qu'il s'agit bien du logarithme naturel en le définissant comme primitive de $1/x$ dont on a démontré qu'il s'agissait d'un logarithme (Fermat - 1636). C'est le naturel car $\ln'(1) = 1$.

La définition donnée ici vient de Euler (un siècle plus tard)


Définition - Fonction puissance réelle

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on définit sur $]0, +\infty[$ la fonction puissance α par :

$$g_\alpha :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$$

✱ **Représentation - Fonctions puissances réelles (différentes valeurs de a)**

On en déduit les variations et la courbe représentative suivant les valeurs de a :

**Proposition - Fonction puissance réelle**

Elle vérifie les propriétés suivantes :

$$\forall (x, y) \in]0, +\infty[^2, \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2,$$

- $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$
- $x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$
- $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$
- Si $\alpha = 0$, g_α est constante égale à 1.
- Si $\alpha > 0$, g_α est croissante et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g_\alpha(x) = 0$
- Si $\alpha < 0$, g_α est décroissante et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g_\alpha(x) = +\infty$

Pour $\alpha > 0$, on étudie l'existence d'une demi-tangente en 0 :

- Si $\alpha < 1$, la courbe $y = g_\alpha(x)$ admet une tangente verticale en 0.
- Si $\alpha = 1$, la courbe $y = g_\alpha(x)$ admet une tangente de pente 1 en 0.
- Si $\alpha > 1$, la courbe $y = g_\alpha(x)$ admet une tangente horizontale en 0.

5.5. Croissances comparées✱ **Heuristique - Logarithme comme nombre de chiffres**

Commençons par une remarque, avec $x = 10^n$, on a $\frac{\ln(x)}{x} = n 10^{-n} \ln 10 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Notons que $\ln 10 \approx 2,302$, donc $\ln x = \ln(10) \times \log_{10}(x)$ et que $\log_{10}(x)$ est en première approximation le nombre de chiffres de x , alors pour x grand, $\ln x$ est le nombre de chiffres de x multiplié par un peu plus de 2.

Exemple : $\ln(123456789) \approx 2,3 \times \log(1,23 \times 10^9) = 2,3 \times (9 + \ln(1,23)) \approx 20$, ce qui est petit

Il s'agit, a priori, de formes indéterminées. Elles sont levées :

Théorème - Croissance comparée

Soient a et b deux réels strictement positifs. On a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^b}{x^a} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a |\ln x|^b = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^b} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^b e^{ax} = 0.$$

Démonstration

Exercice

Fixons $a, b \in \mathbb{R}_+^*$.

Montrer que pour x grand : $e^{\frac{a}{b+1}x} \geq \frac{a}{b+1}x$, en déduire $\frac{e^{ax}}{x^b} \geq \left(\frac{a}{b+1}\right)^{b+1}x$.

Conclure sur la valeur de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^b}$.

5.6. Fonctions hyperboliques directes**Définition - Fonctions hyperboliques**

Les fonctions ch (cosinus hyperbolique), sh (sinus hyperbolique) et th (tangente hyperbolique) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \text{th } x = \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Proposition - Fonctions hyperboliques

La fonction ch est paire, les fonctions sh et th sont impaires.

$$\text{ch}(-x) = \text{ch } x$$

$$\text{sh}(-x) = -\text{sh } x$$

$$\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$$


$$\text{ch } x + \text{sh } x = e^x$$

$$\text{ch } x - \text{sh } x = e^{-x}$$

$$\text{ch}(a+b) = \text{ch } a \text{ch } b + \text{sh } a \text{sh } b$$

$$\text{sh}(a+b) = \text{sh } a \text{ch } b + \text{ch } a \text{sh } b$$

$$\text{th}(a+b) = \frac{\text{th } a + \text{th } b}{1 + \text{th } a \text{th } b}$$

*** Représentation - Fonctions hyperboliques**

Démonstration

6. Sommes numériques infinies

On commence par une extension de notation :

Définition - Extension du coefficient binomial

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}$, on note :

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$$

La section suivante donne des résultats connus pour l'essentiel depuis le XVIII^e siècle, au moins.

Mais les démonstrations satisfaisantes sont plus tardives (ABEL et successeurs du XIX^e).

Pour vous, elles auront officiellement lieu l'année prochaine lorsque vous verrez le cours sur les séries entières.

Proposition - Egalités sommatoires			
On a les égalités suivantes :			
$x \in ?$	fonction	somme	Auteur (Année)
$\mathbb{R}$	$\sin(x)$	$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$	NEWTON(1669), LEIBNIZ(1691)
$\mathbb{R}$	$\cos(x)$	$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$	NEWTON(1669), LEIBNIZ(1691)
$\mathbb{R}$	$\tan(x)$	$= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \dots$	JAC. BERNOULLI(1702)
$[-1, 1]$	$\arctan(x)$	$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}$	GREGORY(1671), LEIBNIZ(1674)
$[-1, 1]$	$\arcsin(x)$	$= x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \dots$	NEWTON(1669)
$\mathbb{R}$	$(1+x)^n$	$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$	PASCAL(1654)
$] -1, 1[$	$(1+x)^\alpha$	$= \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$	NEWTON(1666)
$\mathbb{R}$	$\exp(x)$	$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} x^k$	EULER(1748)
$] -1, 1[$	$\ln(1+x)$	$= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$	MERCATOR(1668)
$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh}(x)$	$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1}$	EULER(1748)
$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch}(x)$	$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{2k}$	EULER(1748)

Exercice

Donner l'expression formalisée de $\arcsin(x)$.

Exercice

On rappelle la formule de MACHIN : $\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$.

Combien de calcul pour obtenir 10 décimales de π satisfaisantes ? Faites les à la calculatrice

Pour aller plus loin - Produit infini

Euler démontre également (1748) :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sin x = x \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2} \right)$$

7. Bilan**Synthèse**

- ↪ On s'intéresse aux fonctions dont le domaine est dans $\mathbb{R}$. Beaucoup de définitions : images, restrictions, ou additions, multiplications et compositions de fonctions. Des adjectifs pour les fonction : périodiques, paires ou impaires, majorées, minorées, bornées, monotone, strictement croissante...
- ↪ Plusieurs fonctions de référence sont à connaître : exponentielle(s) et logarithme(s) en toute base; les fonctions puissances; les fonctions circulaires ($\sin$, $\arccos$...) et hyperboliques directes. On doit savoir comment comparer ces fonctions lorsqu'elles sont en compétition au voisinage de point problématique.
- ↪ Les fonctions complexes de la variables réelles s'étudient de la même façon (même si la représentation est plus complexe). En fait, ce qui compte, c'est la nature de la variable « de départ ».

Plusieurs inégalités sont apparues. Il est bon de s'en souvenir :

$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \quad \sin x \leq x \leq \tan x = \frac{ \sin x }{\cos x}$	Inégalité de fondamentale de trigonométrie
$\left\{ \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]-1, +\infty[, \quad 1 + nx \leq (1+x)^n \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]-1, \frac{1}{n}[\quad (1+x)^n \leq \frac{1}{1-nx} \end{array} \right.$	Inégalité de Bernoulli
$\left\{ \begin{array}{l} \forall x \in]-1, 1[\quad 1+x \leq \exp(x) \leq \frac{1}{1-x} \forall x > 0 \quad \ln x \leq x-1 \end{array} \right.$	Inégalité de l'exponentielle/logarithme
$x < y (x \in \mathbb{R}_+^*) \implies x^\alpha < y^\alpha$	strictes croissances des fonctions puissances ($\alpha > 0$)
$\alpha < \beta \implies x^\alpha < x^\beta$	strictes croissances des fonctions exponentielles ($x > 1$)
$\forall x, y \in \mathcal{D}_f \forall \lambda \in [0, 1], \quad f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$ $\exp, x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1}{x} \quad x \mapsto x^\alpha \ (\alpha > 1), \ x \in [0, \pi] \mapsto \sin x$ sont convexes	Inégalité de convexité
$\forall x, y \in \mathcal{D}_f \forall \lambda \in [0, 1], \quad \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \leq f(\lambda x + (1-\lambda)y)$ $\ln, x \mapsto x^\alpha \ (\alpha \in]0, 1]), \ x \in [-\pi, \pi] \mapsto \cos x$ sont concaves	Inégalité de concavité

Savoir-faire et Truc & Astuce du chapitre

- Savoir-faire - Transformation sur le graphe
- Savoir-faire - Etude des branches infinies (et définition)
- Savoir-faire - Transférer un problème trigonométrique « en a », vers « en 0 »
- Savoir-faire - Etude d'une équation fonctionnelle de $\mathbb{N}$ à $\mathbb{R}$
- Savoir-faire - Calculer « à la main » le logarithme en base a de x ?

Retour sur les problèmes

- 26. Elle est bien continue, mais elle n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$. Euler ne l'aurait probablement pas considérée comme une fonction.
- 27. C'est l'application $x \mapsto 2^x u_0 = u_0 e^{x \ln 2}$
- 28. Les seules applications de cette forme sont les applications $x \mapsto A \ln(x)$ (où A est constante).
Elles sont définie sur $\mathbb{R}_+$. Peut-on les étendre sur $\mathbb{R}$ en entier?
Si $x > 0, \ln(-x) = \ln(e^{i\pi} x) = \ln x + i\pi [2\pi] \dots$
- 29. On vient de terminer ce chapitre en répondant à cette question.