


Leçon 27 - Fonctions primitives et équations différentielles




⇒Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒Propriétés « analytique »de l'intégrale

1. Problèmes


2. Primitives
   - 2.1. Définitions
   - 2.2. Primitives usuelles
   - 2.3. Quelques cas particuliers



Problèmes

Problème Lien primitive/intégrale.


Quel lien entre l'optimisation et le calcul global ?



Problèmes

Problème Lien primitive/intégrale.
Quel lien entre l'optimisation et le calcul global ?

Problème Problèmes historiques.
L'horloge de Claude Perrault




Problèmes

Problème Lien primitive/intégrale.
Quel lien entre l'optimisation et le calcul global ?

Problème Problèmes historiques.
L'horloge de Claude Perrault

Problème Primitivisation des opérations alégébriques.
Intégrale d'une somme ? Facile !
Et pour un produit ? Et une composition ?




Problèmes

Problème Lien primitive/intégrale.
Quel lien entre l'optimisation et le calcul global ?

Problème Problèmes historiques.
L'horloge de Claude Perrault

Problème Primitivisation des opérations alégébriques.
Intégrale d'une somme ? Facile !
Et pour un produit ? Et une composition ?


Problème Fraction rationnelle.
Une méthode pour trouver une primitive à toute fraction rationnelle imaginable !



Problèmes

Problème Implication.


Lien : être continue et admettre une primitive ?



Problèmes

Problème Implication.
Lien : être continue et admettre une primitive ?

Problème Problème de M. Lagoute.
Le fameux oscillateur harmonique




Problèmes

Problème Implication.
Lien : être continue et admettre une primitive ?

Problème Problème de M. Lagoute.
Le fameux oscillateur harmonique

Problème Existence. Unicité
Problème de Cauchy




Problèmes

Problème Implication.
Lien : être continue et admettre une primitive ?

Problème Problème de M. Lagoute.
Le fameux oscillateur harmonique

Problème Existence. Unicité
Problème de Cauchy

Problème Linéarisation.
Que faire si l'équation n'est pas linéaire ?



⇒Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒Propriétés « analytique »de l'intégrale


1. Problèmes

2. Primitives

2.1. Définitions


2.2. Primitives usuelles

2.3. Quelques cas particuliers



Primitive


I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$.



Primitive

I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$.

On commence par se concentrer sur les primitives, bien qu'il ne s'agit que d'un cas particulier d'une équation différentielle.




Primitive

I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$.
On commence par se concentrer sur les primitives, bien qu'il ne s'agit que d'un cas particulier d'une équation différentielle.

Définition - Primitives


Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ (resp. à valeurs dans $\mathbb{C}$). On appelle primitive de f sur I toute fonction F **dérivable** sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$ (resp. à valeurs dans $\mathbb{C}$) telle que, sur I, $F' = f$.



Propriétés

Propriété - CNS de primitive sur $\mathbb{C}$

$F : I \to \mathbb{C}$ est une primitive de $f : I \to \mathbb{C}$
si et seulement si $\mathbf{Re}F$ et $\mathbf{Im}F$ sont des primitives de $\mathbf{Re}f$ et $\mathbf{Im}f$ (resp.).



Propriétés

Propriété - CNS de primitive sur $\mathbb{C}$


$F : I \to \mathbb{C}$ est une primitive de $f : I \to \mathbb{C}$
si et seulement si $\mathbf{Re}F$ et $\mathbf{Im}F$ sont des primitives de $\mathbf{Re}f$ et $\mathbf{Im}f$ (resp.).

Propriété - Définition à constante additive près

Deux primitives de f sur l'intervalle I diffèrent d'une constante.
C'est-à-dire que si F est une primitive de f sur I alors l'ensemble des primitives de f sur I est

$$\left\{x \mapsto F(x) + C; C \in \mathbb{K}\right\}$$

où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) si f est à valeurs dans $\mathbb{R}$ (resp. dans $\mathbb{C}$).



Propriétés

Propriété - CNS de primitive sur $\mathbb{C}$

$F : I \to \mathbb{C}$ est une primitive de $f : I \to \mathbb{C}$
si et seulement si $\mathbf{Re}F$ et $\mathbf{Im}F$ sont des primitives de $\mathbf{Re}f$ et $\mathbf{Im}f$ (resp.).


Propriété - Définition à constante additive près

Deux primitives de f sur l'intervalle I diffèrent d'une constante.
C'est-à-dire que si F est une primitive de f sur I alors l'ensemble des primitives de f sur I est

$$\left\{x \mapsto F(x) + C; C \in \mathbb{K}\right\}$$

où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) si f est à valeurs dans $\mathbb{R}$ (resp. dans $\mathbb{C}$).

$\frac{1}{2}$ Démonstration



Propriétés

Propriété - CNS de primitive sur $\mathbb{C}$

$F : I \to \mathbb{C}$ est une primitive de $f : I \to \mathbb{C}$
si et seulement si $\mathbf{Re}F$ et $\mathbf{Im}F$ sont des primitives de $\mathbf{Re}f$ et $\mathbf{Im}f$ (resp.).


Propriété - Définition à constante additive près

Deux primitives de f sur l'intervalle I diffèrent d'une constante.
C'est-à-dire que si F est une primitive de f sur I alors l'ensemble des primitives de f sur I est

$$\left\{x \mapsto F(x) + C; C \in \mathbb{K}\right\}$$

où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) si f est à valeurs dans $\mathbb{R}$ (resp. dans $\mathbb{C}$).

$\frac{1}{2}$ Démonstration
Analyse Interprétation en terme de relation d'équivalence/classe



⇒Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒Propriétés « analytique »de l'intégrale

1. Problèmes

2. Primitives

2.1. Définitions

2.2. Primitives usuelles

2.3. Quelques cas particuliers




Tableau (1)

En reprenant simplement le tableau de dérivations des fonctions usuelles, on trouve :




Tableau (1)

Proposition - Tableau des primitives usuelles des fonctions à valeurs réelles (1)

fonction	primitives	fonction	primitives
x^α où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$	$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$	$e^{\beta x}$ où $\beta \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$	$\frac{e^{\beta x}}{\beta} + C$
$\mathrm{sh}\beta x$ où $\beta \neq 0$	$\frac{\mathrm{ch}\beta x}{\beta} + C$	$\mathrm{ch}\beta x$ où $\beta \neq 0$	$\frac{\mathrm{sh}\beta x}{\beta} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$\cos x$	$\sin x + C$
$\sin \beta x$ où $\beta \neq 0$	$-\frac{\cos \beta x}{\beta} + C$	$\cos \beta x$ où $\beta \neq 0$	$\frac{\sin \beta x}{\beta} + C$
$1 + \tan^2 x$	$\tan x + C$	$\ln x$	$x \ln x - x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$


(C est une constante réelle)



Tableau (2)


Proposition - Tableau des primitives usuelles des fonctions à valeurs réelles (2)

fonction f de la forme :	**primitive F**
$u'(x)u(x)^\alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	$\dfrac{u(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\dfrac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln\lvert u(x)\rvert + C$
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$



Remarques

Ces formules sont valables sur tout **intervalle** I où f (ou u) est continue.




Remarques

Ces formules sont valables sur tout **intervalle** I où f (ou u) est continue.

Attention. Primitive sur deux intervalles

Si f admet des primitives sur la réunion de deux intervalles disjoints, on peut avoir des constantes différentes sur chacun des deux intervalles. On rencontrera particulièrement cette situation dans le chapitre sur les équations différentielles.



⇒Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒Propriétés « analytique »de l'intégrale


1. Problèmes

2. Primitives

2.1. Définitions

2.2. Primitives usuelles


2.3. Quelques cas particuliers



Exponentielles et trigonométrie

Savoir-faire. $e^{\alpha x}\cos\beta x$ ou $e^{\alpha x}\sin\beta x$

Pour $f(x) = e^{\alpha x}\cos\beta x$ ou $f(x) = e^{\alpha x}\sin\beta x$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, il suffit de primitver $e^{(\alpha+i\beta)x}$ et récupérer partie réelle ou imaginaire.



Exponentielles et trigonométrie

Savoir-faire. $e^{\alpha x}\cos\beta x$ ou $e^{\alpha x}\sin\beta x$


Pour $f(x) = e^{\alpha x}\cos\beta x$ ou $f(x) = e^{\alpha x}\sin\beta x$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, il suffit de primitver $e^{(\alpha+i\beta)x}$ et récupérer partie réelle ou imaginaire.

Savoir-faire. $\sin^n x \cos^m x$

Pour $f(x) = \sin^n x \cos^m x$, on peut linéariser.

Rappelons que pour cela on utilise les formules de de Moivre :

$\sin^n x = \left(\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right)^n \dots$



Exponentielles et trigonométrie

Savoir-faire. $e^{\alpha x}\cos\beta x$ ou $e^{\alpha x}\sin\beta x$

Pour $f(x) = e^{\alpha x}\cos\beta x$ ou $f(x) = e^{\alpha x}\sin\beta x$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, il suffit de primitver $e^{(\alpha+i\beta)x}$ et récupérer partie réelle ou imaginaire.

Savoir-faire. $\sin^n x \cos^m x$

Pour $f(x) = \sin^n x \cos^m x$, on peut linéariser.


Rappelons que pour cela on utilise les formules de de Moivre :

$\sin^n x = \left(\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right)^n \dots$

Exercice

Déterminer des primitives des fonctions suivantes :

$f_1(x) = e^{3x}\sin(2x)$; $f_2(x) = \sin^3(x)\cos^4(x)$



Exponentielles et trigonométrie

Savoir-faire. $e^{\alpha x}\cos\beta x$ ou $e^{\alpha x}\sin\beta x$

Pour $f(x) = e^{\alpha x}\cos\beta x$ ou $f(x) = e^{\alpha x}\sin\beta x$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, il suffit de primitver $e^{(\alpha+i\beta)x}$ et récupérer partie réelle ou imaginaire.

Savoir-faire. $\sin^n x \cos^m x$

Pour $f(x) = \sin^n x \cos^m x$, on peut linéariser.

Rappelons que pour cela on utilise les formules de de Moivre :


$\sin^n x = \left(\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right)^n \dots$

Exercice

Déterminer des primitives des fonctions suivantes :

$f_1(x) = e^{3x}\sin(2x)$; $f_2(x) = \sin^3(x)\cos^4(x)$

Remarque Si on a un doute...




Fractions rationnelles (table)

Proposition - Tableau de primitives de certaines fonctions rationnelles (fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$)

fonction	primitives
$\frac{1}{x-a}$	$\ln\lvert x-a\rvert + C$
$\frac{1}{(x-a)^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{-1}{n-1}\frac{1}{(x-a)^{n-1}} + C$
$\frac{1}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$
$\frac{2x+p}{x^2+px+q}$	$\ln\lvert x^2+px+q\rvert + C$
$\frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n}$ où $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$	$\frac{-1}{n-1}\frac{1}{(x^2+px+q)^{n-1}} + C$

(C est une constante réelle)



Fractions rationnelles (table)


Proposition - Tableau de primitives de certaines fonctions rationnelles (fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$)

fonction	primitives
$\frac{1}{x-a}$	$\ln\lvert x-a\rvert + C$
$\frac{1}{(x-a)^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{-1}{n-1}\frac{1}{(x-a)^{n-1}} + C$
$\frac{1}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$
$\frac{2x+p}{x^2+px+q}$	$\ln\lvert x^2+px+q\rvert + C$
$\frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n}$ où $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$	$\frac{-1}{n-1}\frac{1}{(x^2+px+q)^{n-1}} + C$

(C est une constante réelle)


Exercice

A démontrer



Fractions rationnelles (savoir-faire)

Remarque Division euclidienne



Fractions rationnelles (savoir-faire)

Remarque Division euclidienne


Savoir-faire. Fractions rationnelles $\dfrac{1}{ax^2+bx+c}$

Pour les fractions rationnelles de la forme $f(x) = \dfrac{1}{ax^2+bx+c}$ $((a,b,c) \in \mathbb{R}^3, a \neq 0)$:

- si $\Delta > 0$, le trinôme a deux racines réelles distinctes α et β.

  On cherche $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = \dfrac{\lambda}{x-\alpha} + \dfrac{\mu}{x-\beta}$ et on primitive :

  $F(x) = \lambda \ln|x-\alpha| + \mu \ln|x-\beta| = \ln|(x-\alpha)^\lambda (x-\beta)^\mu|$



Fractions rationnelles (savoir-faire)

Remarque Division euclidienne

Savoir-faire. Fractions rationnelles $\dfrac{1}{ax^2+bx+c}$

Pour les fractions rationnelles de la forme $f(x) = \dfrac{1}{ax^2+bx+c}$ $((a,b,c) \in \mathbb{R}^3, a \neq 0)$:

- si $\Delta > 0$, $F(x) = \lambda \ln|x-\alpha| + \mu \ln|x-\beta| = \ln|(x-\alpha)^\lambda (x-\beta)^\mu|$
- si $\Delta = 0$, on a alors $f(x) = \dfrac{1}{a(x-\alpha)^2}$.
  On primitive directement avec la fraction rationnelle :
  $F(x) = \dfrac{1}{a(x-\alpha)}$




Fractions rationnelles (savoir-faire)

Remarque Division euclidienne

Savoir-faire. Fractions rationnelles $\dfrac{1}{ax^2+bx+c}$

Pour les fractions rationnelles de la forme $f(x) = \dfrac{1}{ax^2+bx+c}$ $((a,b,c) \in \mathbb{R}^3, a \neq 0)$:

- si $\Delta > 0$, $F(x) = \lambda \ln|x-\alpha| + \mu \ln|x-\beta| = \ln|(x-\alpha)^\lambda (x-\beta)^\mu|$
- si $\Delta = 0$, $F(x) = \dfrac{1}{a(x-\alpha)}$
- si $\Delta < 0$, on met sous forme canonique $f(x) = \dfrac{1}{(x+\alpha)^2+\beta^2}$.
  On reconnaît une fonction composée qui se primitive avec $\arctan$:
  $F(x) = \dfrac{1}{\beta} \arctan\left(\dfrac{x+\alpha}{\beta}\right)$



Fractions rationnelles (savoir-faire)

Remarque Division euclidienne


Savoir-faire. Fractions rationnelles $\dfrac{1}{ax^2+bx+c}$

Pour les fractions rationnelles de la forme $f(x) = \dfrac{1}{ax^2+bx+c}$ $((a,b,c) \in \mathbb{R}^3, a \neq 0)$:

- si $\Delta > 0$, $F(x) = \lambda \ln|x-\alpha| + \mu \ln|x-\beta| = \ln|(x-\alpha)^\lambda (x-\beta)^\mu|$
- si $\Delta = 0$, $F(x) = \dfrac{1}{a(x-\alpha)}$
- si $\Delta < 0$, $F(x) = \dfrac{1}{\beta} \arctan\left(\dfrac{x+\alpha}{\beta}\right)$

Exercice

Déterminer des primitives des fonctions : $f_1(x) = \frac{1}{(x^2-x-2)}$; $f_2(x) = \frac{1}{x^2+x+1}$; $f_3(x) = \frac{2x-1}{x^2+x+1}$; $f_4(x) = \frac{2x+1}{x^2+4x+4}$




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒ Propriétés « analytique »de l'intégrale




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

- $f \to f' \Longleftrightarrow f \leftarrow F$: primitivisation




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

- $f \to f' \iff f \leftarrow F$: primitivisation
- Tableau de correspondance (**A APPRENDRE**)




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

- $f \to f' \iff f \leftarrow F$: primitivisation
- Tableau de correspondance (**A APPRENDRE**)
- Et une première série de savoir-faire (exponentielle et trigonométrie)




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

- $f \to f' \iff f \leftarrow F$: primitivisation
- Tableau de correspondance (**A APPRENDRE**)
- Et une première série de savoir-faire (exponentielle et trigonométrie)
- $\int_a^b (f)\mathrm{d}t = F(b) - F(a).$




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒ Propriétés « analytique »de l'intégrale




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒ Propriétés « analytique »de l'intégrale

- Intégrale d'une fonction à valeurs complexes.




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒ Propriétés « analytique »de l'intégrale

- Intégrale d'une fonction à valeurs complexes.
- Le calcul intégral est bien l'inverse de celui de la dérivation.




Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒ Propriétés « analytique »de l'intégrale

- Intégrale d'une fonction à valeurs complexes.
- Le calcul intégral est bien l'inverse de celui de la dérivation.
- Question remise à plus tard : quelles sont les fonctions qui admettent une primitive, finalement.
  C'est un ensemble qui contient strictement l'ensemble des fonctions continues.



Conclusion

Objectifs

⇒ Définir la démarche inverse de la dérivation. Propriétés « géométriques »de l'intégrale

⇒ Propriétés « analytique »de l'intégrale

Pour la prochaine fois

- Lecture du cours : chapitre 6
  3.2. Quelques propriétés
  3.3 et 3.4. Techniques
- Exercice n° 181 & 188
- TD de jeudi :
  8h-10h : n°180 impair, 182 pair, 183, 185 impair, 186
  10h-12h : n°180 pair, 182 impair, 184, 185 pair, 187
- Contrôle de calcul : fiches 10 & 11

